

MATÉRIEL PROMOTIONNEL 25-1 C
(Janvier-Juin 2025)

FWA

Profil patient adulte Tricef



Tricef
Céfixime

PATIENT ADULTE ATTEINT D'UNE PNEUMONIE COMMUNAUTAIRE

Large spectre de confiance^{1,2}

DANSO 33 ANS

Comptable depuis 12 ans, Danso est marié et père de cinq enfants. Il aime les promenades en famille sur la plage.

La semaine dernière, l'un de ses enfants a contracté une infection respiratoire. Au cours des derniers 48 heures, Danso a une toux productive intense, des douleurs thoraciques, de la fièvre, des frissons et parfois un essoufflement, en particulier lorsqu'il joue un peu plus avec ses enfants.

Pneumonie Communautaire

Infection aiguë du parenchyme pulmonaire, associée à des infiltrats visibles à la radiographie, fièvre, expectorations, toux et signes locaux tels de l'auscultation thoracique¹. C'est la principale cause de mortalité infantile jusqu'à 5 ans et la 5ème cause la plus fréquente de décès chez l'adulte².

TAUX DE GUÉRISON OU D'AMÉLIORATION:³



Tricef[®] présente un taux élevé de guérison de la pneumonie communautaire : 98,9 % chez les adultes.

Qu'est-ce que Tricef[®]?¹⁻²

Antibiotique β -lactamine.

Bactéricide, il agit en inhibant la synthèse de la paroi bactérienne.

Capulosporine de 3ème génération.

Administration orale.

Haute résistance à l'inhibition causée par les β -lactamases.

Activité superposable aux bactéries sensibles.

Large spectre d'action.

Efficace contre les principaux agents pathogènes des voies respiratoires.

Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis



Tricef
Céfixime

Large spectre de confiance^{1,2}

ADOLESCENTS ET ADULTES
à partir de 12 ans (50-100 kg)

1 comprimé par jour

COMPRIMÉS PELLIULÉS¹

Tricef 400 mg

1) Présentation du patient

Docteur, je vous présente aujourd'hui le cas d'un patient adulte atteint de PC. Je vous présente Danso, un comptable de 33 ans. L'un de ses enfants a contracté une infection respiratoire et, depuis quelques jours, Danso présente des symptômes tels qu'une toux intense, des douleurs thoraciques, de la fièvre et un essoufflement.

2) Diagnostic et traitement

Après une visite aux urgences et une radiographie du thorax, on lui a diagnostiqué une pneumonie. Un traitement par **Tricef 400 mg** a été suggéré, car le taux de guérison avec du céfixime dans des cas similaires est de 98,9 % chez les adultes.

3) Avantages Tricef et conclusion

Doté d'une remarquable efficacité dans le traitement de la pneumonie, Tricef est un antibiotique de la famille des β -lactamines, en l'occurrence une céphalosporine de 3^e génération, très résistant à l'inhibition par les β -lactamases et qui possède donc un large spectre d'action. Il se distingue par sa posologie simple de 1 comprimé, 1x/jour, ce qui facilite le traitement de Danso.

Pour les patients comme Danso, choisissez Tricef 400.

Profil de patient de Rantudil 60



JEUNE ADULTE SOUFFRANT DE DOULEURS LOMBAIRES

Aujourd'hui, en famille à nouveau

FATOU, 26 ANS Docteur Christine et son fils

CONTEXTE PERSONNEL :
- Femme mariée, sans historique d'intoxications, d'alcoolisme ou de maladies chroniques
- Mère au foyer qui s'occupe de ses enfants
- Marche à pied de nombreuses par jour

ANCRAGE DE LA CONSULTATION :
- Douleur à lumbago intense, qui empêche tous les mouvements de flexion de la colonne vertébrale et qui l'empêche de réaliser ses tâches normales à la maison
- Douleur aggravée quand, 2 jours auparavant, elle revenait à la maison avec ses enfants et a senti une douleur violente et aiguë au bas du dos.
- Elle a été automédiquée avec du diclofénac.

Impact positif sur les maladies rhumatismales et musculo-squelettiques : **
- Amélioration de la qualité de vie
- Diminution accrue de l'usage de médicaments
- Pas d'interaction avec d'autres médicaments
- Impact positif sur la santé mentale

LES AINS SONT LE TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE DE 1^{er} CHOIX CONTRE LA LOMBALGIE, AIGÜE OU CHRONIQUE.³

Efficacité et rapidité du Rantudil vs diclofénac dans le traitement de la lombalgie aigüe.⁴



Un pourcentage de patients satisfaits de l'efficacité du traitement est plus élevé avec Rantudil (44%) que avec du diclofénac (32%).

CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT DE DOULEUR LOMBAIRE AIGÜE, RANTUDIL A PRIS LE DERNIER RANG EN TERME DE TOLÉRABILITÉ ET SUPÉRIEUR AU DICLOFÉNAC.⁴

COMMENT UTILISER RANTUDIL® 60⁴



2x3 x jour

Le traitement dure 7 jours (dose maximale de 180 mg par jour) pour les douleurs aiguës.

Les capsules doivent être avalées avec un peu de liquide, de préférence après avoir mangé un aliment.
Une prise orale doit être évitée chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et rénale sévère à modérée.⁴

AVANTAGES RANTUDIL® 60

Efficacité analgésique et anti-inflammatoire⁴

Bonne tolérance gastro-intestinale⁴

Bon profil de sécurité rénale et hépatique⁴

Moindre risque d'interactions médicamenteuses⁴



Situations Aiguës⁴



LOMBALGIE | MIGRAINE | TENDINITE | SCIATIQUE | OSTÉOARTROSE | BURSITE | GOUTTE | OSTÉOPOROSE | TENDONITE

2x3 x jour

1) Présentation du patient

Docteur, je vous présente aujourd'hui le cas de Fatou, une jeune femme de 26 ans qui se plaint de douleurs lombaires. Fatou est femme au foyer et souffre d'intenses douleurs lombaires, qui se sont aggravées il y a deux jours lorsqu'elle a ressenti une violente douleur dans le bas du dos alors qu'elle portait des sacs de courses. Elle déclare que sa qualité de vie s'est dégradée, car elle ne peut plus prendre ses enfants dans ses bras ou accomplir ses tâches quotidiennes à la maison. Elle s'est automédiquée avec du diclofénac mais n'a pas encore ressenti d'amélioration.

2) Diagnostic et traitement

On lui a diagnostiqué une lombalgie et le médecin qui l'a examinée a suggéré de remplacer le diclofénac par Rantudil 60 mg, 2-3x/jour, car le taux de guérison clinique (% de patients sans douleur) est plus élevé avec Rantudil (44%) qu'avec du diclofénac (32%). De plus, Rantudil agit rapidement et présente un bon profil de tolérabilité, supérieur à celui du diclofénac.

3) Avantages Rantudil et conclusion

La dose recommandée de Rantudil a été de 60 mg (idéale pour les cas aigus), 2 à 3 fois par jour, ingérée idéalement avec de la nourriture. Rantudil 60 est efficace en tant qu'analgésique et anti-inflammatoire, avec une bonne tolérabilité gastro-intestinale, rénale et hépatique et un moindre risque d'interactions médicamenteuses, ce qui a permis à Fatou de reprendre le cours de sa vie de tous les jours.

Pour les patients comme Fatou, choisissez Rantudil 60.

Rantud'il
ACROMBIOACTIVE

Vivre sans douleur

ADULTE SOUFFRANT DE DOULEURS
ARTICULAIRES CHRONIQUES

Après tout, je recommence à courir !


Pharmacie de la Vallée de la Mayenne

selon les recommandations de l'American College of Rheumatology, les AINS sont
soit le traitement de la douleur, soit l'indicateur d'une inflammation [24].

ROYALTY-FREE EST LIBRE RECOMMANDATION CONTRE L'ÉPIDÉMIOLOGIE
ET QUI ATTEND LE PLUS BONNE MISE EN ŒUVRE DES ANIMÉS.

Rantidil go Rantidil
gélule à libération prolongée

1 à 2 x jour



OSTEOPOROZUL ÎN TRATAMENTUL
 ALTEI AFECȚIUNI DE OSTEOPOROZĂ
 ÎN TRATAMENTUL
 ALTEI AFECȚIUNI DE OSTEOPOROZĂ

Pour les patients comme Mohamed, choisissez Rantudil 90 retard.

Dépliant : « Connaissez-vous le PAF ? »



1) Présentation du matériel

Docteur, connaissez-vous le PAF ? Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques informations pertinentes sur le facteur d'activation plaquettaire, un médiateur pro-inflammatoire libéré par divers types de cellules.

2) PAF – Qu'est-ce que le Rinialer et quels sont ses avantages ?

La réponse allergique est divisée en 2 phases : la phase précoce, qui se produit immédiatement après le contact avec l'allergène, et la phase tardive, qui se produit 2 à 4 heures après la réaction allergique. Dans les deux phases, divers médiateurs sont libérés, notamment l'histamine et le PAF, ce dernier étant l'un des principaux médiateurs de la phase tardive. Le PAF est responsable de l'augmentation de la perméabilité vasculaire, de l'infiltration des neutrophiles et des éosinophiles et de l'obstruction nasale et de la rhinorrhée.

Parmi les différents antihistaminiques disponibles sur le marché, nous constatons **que Rinialer est le seul à avoir un effet anti-PAF considérable, avec une inhibition de 75 % de son effet.**

3) Avantages Rinialer et conclusion

Indiqué pour les adultes et les enfants dans le traitement de la rhinite allergique et de l'urticaire, Rinialer est la prescription qu'il faut pour une vie sans allergie. Avec une seule prise quotidienne, Rinialer agit en 15 minutes et a une double action : antihistaminique et anti-PAF, à la fois dans la phase précoce et la phase tardive de l'allergie. Il a également un profil non sédatif (2^e génération) et peut être ingéré avec ou sans nourriture.

Rinialer est le seul médicament ayant une action anti-PAF significative !

Nouvelle étude Melex



1) Présentation du matériel

Dans cette nouvelle section, nous résumons les principales données et conclusions d'une étude publiée en 2022 qui analyse la pharmacodynamique du mexazolam et la compare à celle de l'alprazolam, du bromazépam et du zolpidem.

2) Détails et objectifs de l'étude

Cette étude est axée sur les sous-unités du récepteur GABA-A et l'affinité de chaque BZD pour chaque sous-unité. Les récepteurs GABA-A contenant différentes sous-unités possèdent des caractéristiques différentes :

- Sous-unité alpha-1 : importante dans la régulation du sommeil et, à ce titre, davantage associée aux BZD hypnotiques/sédatives qui ont un profil de dépendance élevé.
- Sous-unités alpha-2 et alpha-3 : importantes dans la régulation de l'anxiété et avec une affinité supérieure pour les BZD anxiolytiques.

(nous ne détaillons pas la sous-unité alpha-5, car elle est moins importante pour l'étude)

Les médicaments choisis pour cette analyse ont été le **mexazolam** (évalué à travers son principal métabolite actif, le chloronordiazépam), l'alprazolam, le bromazépam et le zolpidem (ce dernier étant un hypnotique uniquement apparenté aux BZD, c'est-à-dire un inducteur de sommeil). L'objectif principal est d'évaluer l'affinité de chaque médicament pour les différentes sous-unités du récepteur GABA-A.

3) Résultats

Nous observons que :

- Le CND (MEX) a un effet majoritairement sur les récepteurs GABA-A contenant les sous-unités alpha-2 et alpha-3, qui sont les principaux médiateurs de l'effet anxiolytique, et aucun effet sur l'alpha-1 (fortement associé à des effets sédatifs).
- D'autre part, tant l'ALZ que le BRZ ont un effet sur alpha-1 (effets sédatifs) et alpha-3, et aucun effet sur alpha-2, donc un profil compatible avec un effet sédatif et un certain effet anxiolytique.
- Comme on peut s'y attendre, car c'est un inducteur de sommeil, le ZLP a un effet important sur alpha-1, qui est responsable de l'effet sédatif.

Il est à noter que le CND est le seul médicament dépourvu d'effets sur alpha-1.

Suite →

Nouvelle étude Melex



4) Conclusions

Ce que nous savions déjà dans la pratique clinique a été confirmé une fois de plus : le mexazolam est un médicament à fort effet anxiolytique, sans effet sédatif ni impact sur les performances psychomotrices. En revanche, l'ALZ et le BRZ ont des effets sur la sous-unité alpha-1, responsable de l'effet sédatif, et sont associés à une somnolence et à une possible interférence au niveau psychomoteur.

Par ailleurs, en matière de puissance anxiolytique, le CND agit à la fois sur les sous-unités alpha-2 et alpha-3 (toutes deux responsables de l'effet anxiolytique), tandis que l'ALZ et le BRZ n'ont d'effets que sur une seule de ces sous-unités. Nous concluons donc que le MEX a une efficacité anxiolytique supérieure.

Melex a un bon profil anxiolytique, sans effets sédatifs, et il est idéal pour les patients adultes actifs.

mis@far
HELP POSTNATAL

**Signifie
vie**

Guidelines Internationales
pour déclencher le travail

Obstetrix



Avec un taux de fertilité moyen supérieur à 4 enfants par femme dans les pays d'Afrique Francophone, les recommandations des organisations mondiales de la santé concernant l'induction du travail sont un sujet très important pour les professionnels de santé comme vous.

Les organisations mondiales de la santé comme FIGO, WHO et ACOG sont unanimes et recommandent l'utilisation de **Misoprostol par voie vaginale** pour déclencher le travail.

Misofar 25 est la solution idéale, efficace et pré-qualifiée par l'OMS avec une double action : maturation cervicale et induction du travail chez les femmes enceintes à terme, avec un col de l'utérus immature. Misofar 25 permet un accouchement plus contrôlé, avec des avantages aussi bien pour le professionnel de santé que la patiente, qui sentira des contractions moins intenses et moins de douleurs. Misofar 25 est efficace parce qu'il a la dose recommandée (pas besoin de couper et peser le comprimé) et permet de diminuer le nombre de césariennes.

PARACÉTAMOL + IBUPROFÈNE

25 + 20 mg/ml

Profil l'enfant avec fièvre persistante



Pourquoi choisir Biparfen dans ce cas ?

Fièvre

La fièvre est une réponse physiologique de l'organisme qui a des effets bénéfiques sur la lutte contre l'infection.¹ Cependant, lorsque des conditions fébriles provoquent un mal-être, un mal-être général et sont associées à de la DOULEUR, il faut le traiter avec UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ.^{2,3}

L'association du paracétamol et de l'ibuprofène chez les enfants fébriles est plus rapide et plus efficace pour réduire la température corporelle que le paracétamol et l'ibuprofène seuls.^{2,3}



Comment l'utiliser ?



Avantages Biparfen

1. DIVERGENCE

Parce que le paracétamol et l'ibuprofène associés agissent en synergie.^{1,2,3}

2. SIMPLICITÉ

Parce que l'association fixe est simple et assure le dose efficace.¹

3. DOULEUR - FIÈVRE - INFLAMMATION

Parce que l'association fixe joue un rôle clé dans le confort et le bien-être général de l'enfant.^{1,2}

4. TOLÉRABILITÉ

Parce que l'association fixe est bien tolérée.^{1,2}



1) Présentation du patient

Docteur, je vous présente aujourd'hui le cas de Zuri, une petite fille de 6 ans. Après avoir reçu ses vaccins, elle est prostrée, a de la fièvre et son bras enflé lui fait mal.

2) Diagnostic et traitement

La fièvre est une réponse physiologique normale de l'organisme en réponse au vaccin. Cependant, si elle provoque un mal-être et un inconfort, il faut la traiter.

Zuri a reçu du **Biparfen**, car l'association de paracétamol et d'ibuprofène chez les enfants fébriles est plus rapide et plus efficace pour réduire la fièvre que le paracétamol ou l'ibuprofène seul. Le lendemain, Zuri s'est sentie beaucoup mieux et a pu jouer à la récréation.

3) Avantages Biparfen et conclusion

Biparfen était le choix idéal, car sa seringue graduée en ml/kg a permis à sa mère de doser facilement le médicament en fonction du poids de Zuri. Ça a été assez facile pour la maman et Zuri a adoré son goût d'orange.

Biparfen est une association fixe de paracétamol et d'ibuprofène, axée sur le bien-être des plus petits.

Pour les patients comme Zuri, choisissez Biparfen.

PARACÉTAMOL + IBUPROFÈNE

25 + 20 mg/ml

Profil d'enfant avec douleur et fièvre



Pourquoi choisir Biparfen dans ce cas ?

Douleur

La douleur est un important mécanisme de défense et le signe d'un processus de guérison. Le traitement de la douleur étant l'une des principales causes de souffrance chez les enfants, elle peut avoir des conséquences négatives sur la croissance et le développement de l'enfant.^{1,2}

Fièvre

Compte des conditions fébriles provoquant un mal-être, un malaise général et sont associées à de la douleur, il faut le traiter avec **BIP**. **PUS GRANDE EFFICACITÉ**^{3,4}

L'association du paracétamol et de l'ibuprofène fournit, dans divers contextes de douleur, une efficacité analgésique supérieure, avec un début d'action plus rapide et une durée plus longue.^{5,6} Un meilleur contrôle de la douleur permet d'apporter plus de confort à l'enfant.^{7,8}



Comment l'utiliser ?

L'intervalle entre les prises est de 6 à 8 heures.
3x par jour
INNOVATION Inclut une seringue graduée en ml/kg.
0,5 ml/kg
Chaque graduation de 1 kg correspond à 0,5 ml de suspension orale, correspondant à 12,5 mg de paracétamol et 10 mg d'ibuprofène.



Avantages Biparfen

- 1. SYNERGIE**
Parce que le paracétamol et l'ibuprofène associés agissent en synergie.^{9,10}
- 2. SIMPLICITÉ**
Parce que l'association fixe est simple et assure la dose efficace.¹¹
- 3. DOULEUR - FIÈVRE - INFLAMMATION**
Parce que l'association fixe joue un rôle clé dans le confort et le bien-être général de l'enfant.¹²
- 4. TOLÉRABILITÉ**
Parce que l'association fixe est bien tolérée.¹³



1) Présentation du patient

Docteur, je vous présente Akin, un garçon de 9 ans qui s'est blessé au genou en jouant au football. Suite à sa chute, il a eu de la fièvre et des douleurs constantes.

2) Diagnostic et traitement

Le pédiatre d'Akin lui a prescrit du **Biparfen**, l'association fixe de paracétamol et d'ibuprofène, avec une efficacité analgésique supérieure, un début d'action plus rapide et une durée plus longue, pour plus de confort et de soulagement.

3) Avantages Biparfen et conclusion

Biparfen était le choix idéal, car sa seringue graduée en ml/kg a permis de doser facilement le médicament en fonction du poids d'Akin.

Biparfen est une association fixe de paracétamol et d'ibuprofène, ayant une triple action sur la fièvre, la douleur et l'inflammation.

Pour les patients comme Akin, choisissez Biparfen.