

GUIÃO PARA MATERIAIS PROMOCIONAIS DIVERSOS

25-1 C

(Jan-Jun 2025)

AO/MZ

Perfil doente Adulto Tricef



PACIENTE ADULTO COM PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE

Ampla espectro de confiança



OTCHALI 33 ANOS

Contabilista há 12 anos, Otchali é casado, tem 5 filhos e gosta de passar tempo com a família.

Na semana passada um dos seus filhos esteve doente com uma infecção respiratória. Nos últimos 48 horas tem sentido tosse intensa produtiva, dores no tórax, febre, anorexia e, por vezes, falta de ar, em particular quando se encontra com os filhos.

Pneumonia adquirida na comunidade

Infecção aguda do parênquima pulmonar, associada a infiltrados no raio-X torácico, tosse, expectoração, febre e sinais anormais na auscultação.*
É a 4ª causa mais comum de morte em adultos e a principal causa de mortalidade infantil até aos 5 anos.†

TAXA DE CURA OU MELHORIA:‡



Tricef® apresenta uma elevada taxa de cura da **Pneumonia Adquirida na Comunidade de 98,9%** em adultos.

O que é Tricef?¹,²

Antibiótico β-lactâmico.

Bactericida, atua por inibição da síntese da parede bacteriana.

Cefalosporina de 3ª geração.

Administração oral.

Gravada resistência à todos os β-lactâmicos.

Actividade sintérmica sobre as bactérias sensíveis.

Ampla espectro de acção.

Eficaz contra os principais patógenos do trato respiratório:
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis



Ampla espectro de confiança

ADOLESCENTES E ADULTOS (12 ANOS OU +)

COMPRIMIDOS REVESTIDOS




1) Apresentação do Doente

Doutor, hoje trago-lhe um caso de um paciente adulto com PAC. Apresento-lhe o Otchali, um contabilista com 33 anos. Um dos seus filhos esteve com uma infecção respiratória e nos últimos dias o Otchali tem tido sintomas como tosse intensa, dores no tórax, febre e falta de ar.

2) Diagnóstico e Tratamento

Após uma visita às urgências seguida de taio-X torácico, o paciente foi diagnosticado com Pneumonia. O tratamento sugerido foi **Tricef 400 mg**, já que a taxa de cura da cefixima em casos semelhantes é de 98,9%, em adultos.

3) Vantagens Tricef e Fecho

Tricef, além da sua excelente eficácia no tratamento da pneumonia, é um antibiótico beta-lactâmico, neste caso uma cefalosporina de 3ª geração, com elevada resistência à inibição pelas beta-lactamases e, por isso, com amplo espectro de acção. Distingue-se pela sua posologia simples de 1 comprimido, 1x/dia, facilitando o tratamento do Otchali.

Em pacientes como o Otchali, escolha Tricef 400.

Perfil doente criança Tricef



Tricef
cefixima

CRANÇA COM OTITE MÉDIA AGUDA

Ampla espectro de confiança

KIEZA 3 ANOS

É uma menina saudável, alegre e bem disposta, que passa os seus dias a brincar com outras crianças pequenas.

Nos dois últimos dias tem-se apresentado com **prostração, dorres, febre**, frequentemente a acordar ao **ouvido direito**, com um **comportamento agitado**, apresentando **febre** 38,5°C de temperatura.

Otite Média Aguda

É a patologia infecciosa bacteriana mais comum na infância.¹
Presença de líquido no ouvido médio, acompanhada por sinais e sintomas de inflamação.²

TAXA DE CURA OU MELHORIA:³



Tricef[®] é eficaz no tratamento da OMA em crianças, com uma elevada taxa de susceptibilidade a *H. influenzae*.^{3,4}

Fonte: 1. Catálogo de antibióticos. OMA, tratamento de primeira linha. 2. Manual de pediatria. 3. Tricef. 4. Tricef. 5. Tricef.



O que é Tricef?^{1,2}

Antibiótico β-lactâmico.
Bactericida, atua por inibição da síntese da parede bacteriana.

Cefalosporina de 3ª geração.
Administração oral.

Elevada resistência à inibição pelas β-lactamases.
Atividade sintérmica sobre as bactérias sensíveis.

Ampla espectro de ação.
Eficaz contra os principais patógenos do trato respiratório:
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis

Ampla espectro de confiança

CRANÇAS (de 6 meses até 3 anos)
2 e 3 ANOS: 1 colher de chá (5 ml) 4 vezes ao dia
3 e 4 ANOS: 1 colher de chá (5 ml) 4 vezes ao dia
5 e 6 ANOS: 1 colher de chá (5 ml) 4 vezes ao dia

PO PARA SUSPENSÃO ORAL
PO PARA SUSPENSÃO ORAL

ADOLESCENTES E ADULTOS (de 12 anos até 18 anos)
1 colher de chá (5 ml) 4 vezes ao dia

CONFORMAÇÃO RECOMENDADA
CONFORMAÇÃO RECOMENDADA

1) Apresentação do Doente

Doutor, hoje trago-lhe um caso de um criança com otite, a Kieza. Tem apenas 3 anos e, apesar de ser saudável, nos últimos dias tem andado mais prostrada, queixando-se de dores no ouvido direito e apresentando febre.

2) Diagnóstico e Tratamento

Após uma visita ao seu pediatra, a Kieza foi diagnosticada com otite média aguda, já que apresentava sinais de inflamação e líquido no ouvido médio. O tratamento sugerido foi **Tricef 20 mg/ml, 1 colher de medida por dia**, já que Tricef é eficaz no tratamento da OMA em crianças, com uma taxa de cura de 98%.

3) Vantagens Tricef e Fecho

Tricef, além da sua excelente eficácia, é um antibiótico beta-lactâmico, neste caso uma cefalosporina de 3ª geração, com elevada resistência à inibição pelas beta-lactamases e, por isso, com amplo espectro de ação. Distingue-se pelo seu sabor agradável a morango e pela sua posologia simples 1x/dia, facilitando o tratamento da Kieza e permitindo-lhe regressar à brincadeira.

Em pacientes como a Kieza, escolha Tricef Suspensão Oral.

Perfil de paciente de Rantudil 60



Viver sem dor

**ADULTO JOVEM
COM DOR LOMBAR**



Hoje voltamos a divertir-nos

CASSINDA, 26 ANOS

CONTEXTO PESSOAL:
- Saudável, sem história de internamentos, cirurgias ou doenças crónicas
- É dona de casa e toma conta dos seus filhos
- Realiza uma caminhada de 30 minutos diariamente

ANÁLISE DA CONSULTA:
- Dor lombar intensa, que piora com movimentos de flexão da coluna vertebral, e que a impede de realizar o trabalho normal em casa
- Dor agravada quando há 2 dias regressou a casa com as compras e sentiu uma dor violenta no fundo das costas
- Automedicou-se com Diclofenac, mas ainda não sentiu melhorias.

Adicional Impacto das doenças reumáticas e musculares agudas:
- Redução da qualidade de vida
- Piora do estado de saúde
- Piora do estado de saúde
- Impacto negativo no estado mental

OS AINE SÃO 1ª LINHA DE TRATAMENTO FARMACOLÓGICO NA LOMBALGIA AGUDA OU CRÓNICA?

Eficácia e rapidez de Rantudil[®] vs Diclofenac no tratamento da lombalgia aguda.*



*Estudo de eficácia e rapidez de Rantudil[®] vs Diclofenac no tratamento da lombalgia aguda. O estudo demonstrou que Rantudil[®] é mais eficaz e rápido do que Diclofenac no tratamento da lombalgia aguda, com uma melhoria da dor mais rápida e significativa.

EM DOENTES COM DOR LOMBAR AGUDA, RANTUDIL[®] DEMONSTROU RAPIDEZ DE AÇÃO E UM BOM PERFIL DE TOLERABILIDADE, É SUPERIOR A DICLOFENAC.

COMO UTILIZAR RANTUDIL[®] 60?



2x3 x dia

O tratamento com doses superiores a 100 mg não deve exceder os 7 dias.

As crianças devem ser ingeridas enteras, com um pouco de líquido, de preferência após ingestão de algum alimento.

Em caso de insuficiência hepática e renal, ligar-se a um médico.

VANTAGENS RANTUDIL[®] 60

Eficácia analgésica e anti-inflamatória**

Bom perfil de tolerabilidade gastrointestinal**

Bom perfil de segurança renal e hepática**

Menor risco de interações medicamentosas**



Indicação para Situações Agudas*



2x3 x dia

Indicações e contraindicações (consultar o folheto informativo)

1) Apresentação do Doente

Doutor, hoje apresento-lhe o caso da Cassinda, uma jovem de 26 anos com queixas de dor lombar. A Cassinda é dona de casa e tem sentido dor lombar intensa, agravada desde há 2 dias, quando carregava sacos com compras e sentiu uma dor violenta no fundo das costas. Diz que tem tido pior qualidade de vida, não conseguindo pegar nos filhos ao colo, nem fazer as suas tarefas diárias em casa. Automedicou-se com Diclofenac mas ainda não sentiu melhorias.

2) Diagnóstico e Tratamento


A Cassinda foi diagnosticada com lombalgia e o médico que a avaliou sugeriu substituir o Diclofenac por Rantudil 60 mg, 2-3x/dia, já que a taxa de cura clínica (% pacientes sem dor) foi superior com Rantudil (44%) vs Diclofenac (32%). Além disso Rantudil é rápido a actuar e apresenta um bom perfil de tolerabilidade, superior a diclofenac.

3) Vantagens Rantudil e Fecho

A dose recomendada de Rantudil foi 60 mg (ideal para situações agudas), 2 a 3x/dia, ingerida idealmente com alimentos. Rantudil 60 é eficaz como analgésico e anti-inflamatório, apresentando uma boa tolerabilidade GI, renal, hepática e baixo risco de interações medicamentosas, permitindo que a Cassinda volte a aproveitar o seu dia-a-dia.

Em pacientes como a Cassinda, escolha Rantudil 60.

Perfil de paciente de Rantudil 90



Rantudil
acetaminofeno

Viver sem dor

ADULTO COM DOR ARTICULAR CRÔNICA

Hoje volto a correr!

MARCOS, 49 ANOS

CONTEXTO PESSOAL:
Trabalha na construção civil.
Pratica exercício físico de intensidade moderada de forma regular.

HISTÓRICO DA DOENÇA:
Descreve dor moderada no joelho direito desde há 5 meses.
O nível de dor tem-se agravado e tornou incapacitante.
Tive de abandonar a prática do exercício e enfrentar muitas limitações quando brinco com os netos, sobretudo ao subir e descer escadas.
Rigidez matinal e após repouso de curta duração.
Inflamação marcada dos joelhos, com agudização.

De acordo com as guidelines do American College of Rheumatology, os AINEs são a 1ª opção de tratamento farmacológico na Osteoartrite (OA) independentemente da localização articular, ou seja, para doentes com OA de joelho, anca ou tornozelo.

DIAGNÓSTICO ORTODONTOLÓGICO

1) Apresentação do Doente

Doutor, na visita de hoje gostava de partilhar consigo o caso do Marcos. O Marcos tem 49 anos e adora correr. Porém, lesionou-se num joelho durante o seu trabalho na construção civil há cerca de 5 meses e diz que "a dor não passa", estando cada vez mais incapacitante. Refere rigidez matinal após repouso e já nem consegue brincar com os netos.

2) Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico do Marcos foi de Osteoartrite do joelho e, tal como recomendado pelas guidelines do American College of Rheumatology, o médico medicou-o com um AINE oral: **Rantudil 90 Retard, 1 a 2 x/dia**. A escolha foi simples, já que Rantudil é rápido e eficaz na osteoartrite, apresentando um perfil de segurança favorável e uma capacidade de concentrar-se nos tecidos inflamados 4x superior à concentração no plasma. Quando comparado com outros AINEs, Rantudil apresenta o maior volume de distribuição, ou seja, tem uma capacidade superior de sair do plasma e concentrar-se nos tecidos inflamados, e, consequentemente, maior rapidez de ação.

RANTUDIL[®] 90 RETARD É RÁPIDO E EFICAZ NA OSTEODARTROSE

Evidências sugerem que alguns AINEs podem ter perfil de segurança mais favorável do que outros.¹
O volume de distribuição representa a capacidade do fármaco para sair do plasma e distribuir-se rapidamente nos tecidos. Quanto maior o volume de distribuição do AINE, maior a sua rapidez de ação.²

CONCENTRAÇÃO DE RANTUDIL[®]

Na concentração de 4x superior à concentração no plasma.

Na concentração de 2x superior à concentração no plasma.

RANTUDIL[®] É O AINE RECOMENDADO NA OSTEODARTROSE E QUE ATUVA MAIS RAPIDAMENTE NOS TECIDOS INFLAMADOS.³

COMO UTILIZAR RANTUDIL[®] 90 RETARD?

VANTAGENS DE RANTUDIL[®] 90 RETARD

Eficácia analgésica e anti-inflamatória¹

Alta tolerabilidade gastrointestinal²

Bom perfil de segurança renal e hepática³

Menor risco de interações medicamentosas^{4,5}

Situações Crônicas⁶

OSTEOARTROSE (ESPECIALMENTE ANQUILOSANTE) | ARTRITE REUMATÓIDE | ARTRITE PSORIÁTICA

1 a 2 x/dia

O tratamento com doses superiores a 900 mg não deve exceder os 7 dias.

1 a 2 x/dia

3) Vantagens Rantudil e Fecho

A dose recomendada de Rantudil foi 90 mg Retard, já que se trata de uma patologia crónica. Rantudil 90 é uma cápsula de libertação prolongada que possui 2 tipos de partículas: 30 mg de partículas de rápida absorção (para um alívio rápido da dor) e 60 mg de partículas de absorção lenta (para um efeito prolongado durante 12 horas). Além disso, Rantudil 90 é eficaz como analgésico e anti-inflamatório, apresentando uma boa tolerabilidade GI, renal, hepática e baixo risco de interações medicamentosas, devolvendo ao Marcos o seu estilo de vida activo.

Em pacientes como o Marcos, escolha Rantudil 90 Retard.

Díptico: “Conhece o PAF?”



1) Apresentação do Material

Doutor, conhece o PAF? Hoje gostava de apresentar-lhe informação relevante sobre o Factor de Activação Plaquetária, um mediador pró-inflamatório libertado por diversos tipos de células.

2) PAF – O que é e vantagens de Rinialer

A resposta alérgica divide-se em 2 fases: a fase precoce, que se dá imediatamente após o contacto com o alérgeneo; e a fase tardia, que ocorre 2-4 horas após a reacção alérgica. Em ambas as fases, há a libertação de diversos mediadores, entre eles a histamina e o PAF, sendo este último um dos principais mediadores da fase tardia. O PAF é responsável por aumentar a permeabilidade vascular, induzir a infiltração de neutrófilos e eosinófilos e por causar obstrução nasal e rinorreia.

Quando observamos diversos anti-histamínicos disponíveis no mercado, vemos **que Rinialer é o único com um efeito anti-PAF considerável, com uma inibição do seu efeito de 75%.**

3) Vantagens Rinialer e Fecho

Rinialer é a receita para uma vida sem alergias, indicado para adultos e crianças, no tratamento da Rinite Alérgica e Urticária. Com apenas 1 toma diária, Rinialer actua em 15 minutos e tem dupla acção: anti-histamínica e anti-PAF, actuando tanto na fase precoce, como tardia da alergia. Além disso, apresenta um perfil não sedativo (2ª geração) e pode ser tomado com ou sem alimentos.

Tríplico Tabela Benzodiazepinas_Sedoxil



Propriedades farmacocinéticas das Benzodiazepinas:

	Nome/Breve	Propriedades Ansiolíticas	Propriedades Sedativas	Dose Equivalente	Semi-vida	Comentários
Acção Curta	Alprazolam	++	++	2mg	1-4h	Indicado para crises de ansiedade aguda, com efeitos anxiolíticos e sedativos moderados.
	Lorazepam	++	++	0,5-1mg	12-15h	Activa a produção de GABA em neurónios anxiogénicos, com efeitos anxiolíticos e sedativos moderados.
Acção Intermédia	Alprazolam	++	+	0,5-1mg	6-10h	Activa a produção de GABA em neurónios anxiogénicos, com efeitos anxiolíticos e sedativos moderados.
	Clonazepam	++	+	1mg	10-20h	Activa a produção de GABA em neurónios anxiogénicos, com efeitos anxiolíticos e sedativos moderados.
	Clonazepam	++	+	1mg	10-20h	Activa a produção de GABA em neurónios anxiogénicos, com efeitos anxiolíticos e sedativos moderados.
Acção Longa	Clonazepam	++	+	0,5-1mg	18-20h	Activa a produção de GABA em neurónios anxiogénicos, com efeitos anxiolíticos e sedativos moderados.
	Bromazepam	++	+	1mg	6-10h	Activa a produção de GABA em neurónios anxiogénicos, com efeitos anxiolíticos e sedativos moderados.
	Flurazepam	+	++	30mg	7-10h	Activa a produção de GABA em neurónios anxiogénicos, com efeitos anxiolíticos e sedativos moderados.
	Mexazolam (Sedoxil)	++	+	1mg	10-20h	Activa a produção de GABA em neurónios anxiogénicos, com efeitos anxiolíticos e sedativos moderados.



1) Apresentação do Material

Doutor, sabemos que as benzodiazepinas não são todas iguais e, por isso, trago-lhe uma tabela comparativa, que pode trazer consigo no bolso da bata e consultar sempre que necessário.

Este material foi desenvolvido com base num livro lançado em 2021, escrito por um psiquiatra Português, o Prof. Dr. Pedro Morgado, intitulado "Manual de tratamento da ansiedade".

2) Propriedades Farmacocinéticas das Benzodiazepinas

As benzodiazepinas classificam-se de acordo com a sua semi-vida em 3 tipos principais: BZD de acção curta, intermédia ou longa. A sua semi-vida impacta também a sua acção ansiolítica e sedativa, ou seja:

- BZD acção curta: - propriedades ansiolíticas e + propriedades sedativas;
- BZD acção intermédia: + propriedades ansiolíticas e + propriedades sedativas;
- BZD acção longa: + propriedades ansiolíticas e - propriedades sedativas;

Esta tabela permite ainda consultar a dose equivalente entre as diversas BZD, útil aquando da descontinuação ou switch, e características específicas de cada fármaco.

O **Sedoxil (Mexazolam)** é uma BZD de acção longa, com ótimo perfil ansiolítico e baixo perfil sedativo. A sua eficácia é equivalente a Alprazolam e superior a Bromazepam e não apresenta impacto na performance cognitiva nem psicomotora. Além disso, apresenta baixa propensão para abuso e dependência, com maior facilidade de descontinuação.

3) Vantagens Sedoxil e Fecho

Sedoxil está indicado no tratamento da ansiedade, especialmente em adultos activos, e é eficaz, rápido a actuar, com uma semi-vida longa (+ propriedades ansiolíticas e - propriedades sedativas) e sem efeitos sedativos major, sendo geralmente bem tolerado.

Novo estudo Sedoxil



1) Apresentação do Material

Nesta nova separata resumimos os principais dados e conclusões de um estudo publicado em 2022 que analisa a farmacodinâmica do Mexazolam e compara com Alprazolam, Bromazepam e Zolpidem.

2) Detalhes e objectivos do estudo



O foco deste estudo são as sub-unidades do receptor GABA-A e a afinidade de cada BZD a cada subunidade. Receptores GABA-A contendo diferentes sub-unidades possuem características distintas:

- Sub-unidade alfa-1: relevante na regulação do sono e, como tal, mais associada a BZD hipnóticas e sedativas, com alto perfil de adição.
- Sub-unidades alfa-2 e alfa-3: relevantes para a regulação da ansiedade e com maior afinidade para BZD ansiolíticas.

(não detalhamos a subunidades alfa-5 por ser menos relevante para o estudo)

Os fármacos escolhidos para esta análise foram o **Mexazolam** (avaliado através do seu principal metabolito activo Cloronordiazepam), o Alprazolam, o Bromazepam e o Zolpidem (sendo este último, um hipnótico não-BZD, ou seja, um indutor do sono). O principal objectivo é avaliar a afinidade de cada fármaco para as diferentes sub-unidades do receptor GABA-A.

3) Resultados

No que respeita aos resultados, observamos o seguinte:

- O CND (MEX) apresenta efeito maioritariamente nos receptores GABA-A contendo as subunidades alfa-2 e alfa-3, que são os principais mediadores do efeito ansiolítico, sem qualquer efeito em alfa-1 (fortemente associado a efeitos sedativos).
- Por outro lado, tanto o ALZ como BRZ possuem efeito em alfa-1 (ef. sedativos) e alfa-3, sem qualquer efeito em alfa-2, tendo um perfil compatível com efeito sedativo e algum efeito ansiolítico.
- O ZLP, como seria de esperar por ser um indutor do sono, apresenta um forte efeito em alfa-1, responsável pelo efeito sedativo.

Importa ressaltar que o único fármaco sem efeito em alfa-1 foi o CND.

Novo estudo Sedoxil



4) Conclusões

Confirma-se novamente o que já sabíamos da prática clínica: o Mexazolam é um fármaco com elevado efeito ansiolítico, sem perfil sedativo nem impacto no desempenho psicomotor. Pelo contrário, o ALZ e BRZ apresentam efeitos na sub-unidade alfa-1, responsável pelo efeito sedativo, estando associados a sonolência e a possível interferência a nível psicomotor.

Além disso, no que respeita à potência ansiolítica, o CND actua sobre as duas sub-unidades alfa-2 e alfa-3 (ambas responsáveis sobre o efeito ansiolítico), enquanto que ALZ e BRZ actuam apenas sobre uma destas sub-unidades. Desta forma, concluímos que o MEX tem superior eficácia ansiolítica.

Sedoxil apresenta bom perfil ansiolítico, sem efeitos sedativos, ideal para pacientes adultos activos.

Díptico_Fases enxaqueca_Migrétil



1) Apresentação do Material

Doutor, como sabe, a enxaqueca é mais que uma simples dor de cabeça. É um complexo distúrbio neurológico, recorrente, multifactorial, doloroso e altamente incapacitante. Os sintomas vão da cefaleia à fotofobia, fonofobia, náuseas e vômitos. Para uma patologia tão complexa, precisamos de um medicamento completo, como é o caso de Migrétil, com um alívio rápido 4 em 1.

2) Fases da enxaqueca

Além da complexidade de sintomas, a enxaqueca é uma doença que pode ter um impacto durante várias horas ou até dias, dividindo-se em 4 fases distintas, apesar de nem todos os doentes passarem por todas as fases.

- **PRÓDROMO:** é uma fase que pode iniciar-se algumas horas a dias antes do início da cefaleia e que geralmente é reconhecida apenas por 50% dos doentes (como uma "previsão" da chegada da enxaqueca). É caracterizado por sintomas comportamentais (ansiedade, dificuldade de concentração...), neurológicos (bocejos, tonturas...), sistémicos (fadiga, mialgias...) e alimentares (náuseas, fome...).
- **AURA:** é a 2ª fase da enxaqueca, com uma duração média de 5-60 minutos e que afecta cerca de 1/3 dos pacientes. Trata-se de uma disfunção neurológica focal e transitória, caracterizada por sintomas reversíveis, maioritariamente visuais, como manchas brancas, flashes/luzes brilhantes e intermitentes, linhas coloridas em zig-zag ou perda parcial de visão. Além destes sintomas, a aura pode ainda apresentar sintomas sensoriais (picadas, formigueiro...), alterações na linguagem, vertigens, entre outros. **Migrétil pode ser tomado durante a aura.**
- **DOR DE CABEÇA:** é a 3ª (e principal) fase da enxaqueca. Caracteriza-se por uma dor de cabeça intensa, unilateral, latejante e agravada pelo movimento, com duração de 4-72 horas. A dor é acompanhada de outros sintomas como náuseas ou vômitos e sensibilidade/intolerância à luz (fotofobia), ao ruído (fonofobia), a cheiros intensos e ao movimento. **Migrétil pode ser tomado no início da cefaleia.** Deve ser tomado o mais precocemente possível para evitar o agravamento dos sintomas.
- **PÓS-DOR:** é a 4ª (e última) fase da enxaqueca, sendo muitas vezes apelidada de fase resolutive. Esta fase pode demorar 24 a 48 horas e é caracterizada por cansaço, irritabilidade, sensação de resaca entre outros.

Migrétil é eficaz no tratamento da crise de enxaqueca e recomendado nas fases da aura e cefaleia.

Folheto Folicil (Este folheto substitui a literatura)



1) Apresentação do Material

Doutor, como sabe, o ácido fólico é um nutriente essencial, com um papel importantíssimo durante a gravidez. Está em volvido tanto no crescimento como no desenvolvimento fetal e a suplementação é essencial uma vez que o nosso organismo não consegue sintetizá-lo sozinho.

Folicil contém 5 mg de ácido fólico, ideal para prevenir défice de AF e as complicações associadas.

2) Importância ácido fólico e complicações da sua carência

A carência de ácido fólico pode trazer consequências muito graves durante a gravidez, principalmente anomalias congénitas como é o caso das Malformações do Tubo Neural (MTN). Podem ainda surgir outras complicações, como aborto espontâneo, parto pré-termo, descolamento da placenta, baixo peso à nascença ou pré-eclâmpsia.

Os 5 mg de Ácido Fólico presentes em Folicil são essenciais para uma boa prevenção das MTN (85%) já que doses inferiores têm também uma proteção inferior da mãe e do bebé.

Uma vez que o ácido fólico é uma vitamina hidrossolúvel, caso a sua ingestão ultrapasse a necessidade, o excesso é eliminado por via renal, não se acumulando no organismo, tornando Folicil seguro e com baixo risco de toxicidade.

3) Vantagens Folicil e Fecho

Folicil é essencial para o desenvolvimento do SNC do embrião, prevenindo complicações associada à gravidez, nomeadamente malformações do tubo neural. Distingue-se pela sua dosagem de 5mg, que permite uma redução do risco de MTN até 85%. Além disso, a posologia de Folicil é simples, 1/2 a 1 comprimido por dia, especialmente antes da concepção e no 1º trimestre da gravidez.

Folicil previne eficazmente as MTN.

Perfil criança com febre persistente



Porquê Biparfen neste caso?

Febre

A febre é uma resposta fisiológica do organismo com efeitos benéficos no combate à infecção.
Porém, quando os sintomas febris provocam **ma-estar, desconforto geral e até associados a DOR**, é necessário tratar com **MAIOR EFICÁCIA**.

A combinação de paracetamol e ibuprofeno em crianças febris é **mais rápida e mais eficaz** a diminuir a temperatura corporal que o paracetamol e o ibuprofeno isoladamente.^{1,2,3}



Como utilizar?



Vantagens Biparfen



1) Apresentação do Doente

Doutor, hoje quero apresentar-lhe o caso da Lueji, uma menina de 6 anos. Após a toma das vacinas, apresenta-se prostrada, com febre e com inchaço e dor no braço.

2) Diagnóstico e Tratamento

A febre é uma resposta normal e fisiológica do organismo, em resposta à vacina. Porém, estando a causar mal-estar e desconforto, deve ser tratada.

A Lueji foi medicada com **Biparfen**, já que a combinação de paracetamol e ibuprofeno em crianças febris é mais rápida e eficaz a baixar a febre do que o paracetamol ou o ibuprofeno isolados. No dia seguinte, a Lueji sentiu-se muito melhor e já conseguiu brincar na escola.

3) Vantagens Biparfen e Fecho

Biparfen foi a escolha ideal, já que a sua seringa graduada em ml/kg permitiu que a sua mãe doseasse facilmente o medicamento, com base no peso da Lueji. Foi bastante fácil para a mãe, e a Lueji adorou o sabor a laranja.

Biparfen é uma combinação fixa de paracetamol e ibuprofeno, focada no bem estar dos mais pequenos.

Em pacientes como a Lueji, escolha Biparfen.

Perfil criança com dor e febre



Biparfen®
PARACETAMOL + IBUPROFENO
66 + 20 mg/ml

CRANÇA COM DOR E FEBRE

Kambami, 9 anos
É um menino cujo sonho é ser jogador de futebol. Quando, depois de regressar da escola, estava a jogar futebol na rua com os amigos, trocou num movimento de apoiar o pé de forma errada sobre o joelho. Tem estado anormalmente quieto, sempre agarrado ao joelho onde é visível um hematoma, acompanhado de inchaço, e apresenta um estado febril.

Porquê Biparfen neste caso?

Dor

A dor é um importante mecanismo de defesa e o 1º sinal vital. Sendo assim, das principais causas de sofrimento na criança, o tratamento insuficiente da dor pode ter consequências nefastas para o crescimento e desenvolvimento infantil.^{1,2}

Febre

Porém, quando os quadros febris provocam mal-estar, desconforto geral e estão associados a DOR, é necessário tratar com **MAIOR EFICÁCIA**.^{3,4}

A combinação de paracetamol e ibuprofeno proporciona, em vários contextos de dor, uma eficácia analgésica superior, com um início de ação mais rápido e com uma duração superior.^{5,6} O melhor controlo da dor permite maior conforto da criança.^{1,2}



Como utilizar?



INOVAÇÃO
Inclui uma seringa graduada em ml/kg⁷

3x
O intervalo entre as doses é de 6 a 8 horas.

0,5
Cada graduação da seringa representa 0,5 ml de suspensão (ml = equivalente a 10 mg de paracetamol e 3 mg de ibuprofeno).

Vantagens Biparfen

- 1. ENERGIA**
Porque a paracetamol e o ibuprofeno combinados actuam sinergicamente.^{1,2,3,4}
- 2. SIMPLICIDADE**
Porque a associação fixa é simples, segura e é mais eficaz!
- 3. DOR - FEBRE - INFLAMAÇÃO**
Porque a associação fixa proporciona um papel fundamental no conforto e bem-estar geral da criança.^{1,2}
- 4. TOLERABILIDADE**
Porque a associação fixa é bem tolerada.^{1,2}



1) Apresentação do Doente

Doutor, apresento-lhe o Kambami, um menino com 9 anos, que se lesionou no joelho a jogar futebol. Após a queda, tem tido febre e dores constantes.

2) Diagnóstico e Tratamento

O pediatra do Kambami receitou-lhe **Biparfen**, a combinação fixa de Paracetamol e Ibuprofeno, com uma eficácia analgésica superior, um início de acção mais rápido e uma duração superior, para um maior conforto e alívio.

3) Vantagens Biparfen e Fecho

Biparfen foi a escolha ideal, já que a sua seringa graduada em ml/kg permitiu o fácil doseamento do medicamento, com base no peso do Kambami.

Biparfen é uma combinação fixa de paracetamol e ibuprofeno, com tripla acção na febre, dor e inflamação.

Folheto Retilyv vs corticosteroides



1) Apresentação do Material

Doutor, as hemorroidas são muitas vezes um tabu entre os pacientes, mas sabemos que atingem cerca de 85% da população adulta. Porém, o seu tratamento adequado é essencial para um alívio rápido e eficaz dos sintomas.

2) DH e alternativas ao tratamento

Os principais sintomas da Doença Hemorroidária são rectorragias, prurido, exsudação, incontinência, obstipação e prolapso. Para o seu tratamento, há várias opções disponíveis no mercado, algumas delas contendo corticosteroides. Porém, o uso de corticosteroides tópicos apresenta alguns riscos, entre eles: dermatite de contacto, hipo ou hiperpigmentação da pele, atrofia dérmica ou epidérmica, efeito de recaída e resistência ao tratamento.

Retilyv é uma opção terapêutica **sem corticosteróides**. Trata-se de uma pomada rectal, com acção 5 em 1, composta por poliresuleno e cloridrato de cinchocaína. Retilyv apresenta uma eficácia de +80%, tanto em hemorroidas internas como externas. Além disso, e por não conter corticosteroides, Retilyv pode ser utilizado por longos períodos de tempo, sem efeitos secundários sistémicos.

3) Posologia e Fecho

Retilyv deve ser aplicado 2 a 3x/dia, e contém um práctico aplicador para tratamento das hemorroidas internas.