

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO

RETILYV 50 mg/g + 10 mg/g pomada rectal

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada grama de pomada contém 50 mg de Policresuleno e 10 mg de Cloridrato de Cinchocaína.

Excipiente com efeito conhecido:

Butil-hidroxitolueno (E321) - 1 mg/g

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Pomada rectal.

Pomada branca a acastanhada.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

RETILYV está indicado para o tratamento de: hemorroidas não complicadas, fissuras, prurido e eczema anal, após diagnóstico médico prévio.

4.2 Posologia e modo de administração

Posologia

Aplicar a pomada sobre as lesões, 2-3 vezes por dia.

Em caso de persistência de sintomas ao fim de sete dias de aplicação do medicamento, consulte o seu médico.

Modo de administração

Via rectal.

Para aplicação interna:

Adaptar o aplicador à bisnaga, remover a tampa do aplicador e introduzi-lo no recto. Com uma ligeira pressão sobre a bisnaga, a pomada sai pelos orifícios laterais do aplicador e espalha-se de forma uniforme sobre a zona afectada. Girando o aplicador, a pomada distribui-se em toda a volta. Em caso da aplicação interna de RETILYV é aconselhável uma evacuação prévia e higiene cuidada da zona afectada.

4.3 Contraindicações

Hipersensibilidade às substâncias activas ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Em caso de hipersensibilidade à Cinchocaína, RETILYV só deve ser utilizado com autorização expressa do médico.

Este medicamento contém butil-hidroxitolueno (E321). Pode causar reacções cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto) ou irritação ocular e das membranas mucosas.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interacção

Não convém aplicar na mesma lesão qualquer outro medicamento tópico, dado que não se pode excluir a possibilidade de interacção entre medicamentos.

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento

Gravidez

O policresuleno só deve ser administrado durante a gravidez, por expressa indicação médica, se os benefícios para a mãe justificarem os possíveis riscos para o feto.

Não se dispõe de ensaios clínicos relativamente à segurança da utilização do policresuleno em mulheres grávidas. Os estudos realizados em animais não evidenciaram quaisquer indícios de efeitos teratogénicos.

Amamentação

Desconhece-se se o policresuleno é excretado no leite materno. Consequentemente, a utilização de RETILYV em mulheres a amamentar não é aconselhável, excepto se os benefícios justificarem os possíveis riscos para o recém-nascido.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Não foram estudados os efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

4.8 Efeitos indesejáveis

No início do tratamento podem surgir efeitos secundários locais, sob a forma de sensação de queimadura e prurido, relacionados com o mecanismo de acção do medicamento, mas geralmente desaparecem em pouco tempo, não sendo necessário suspender a terapêutica.

Notificação de suspeitas de reacções adversas

A notificação de suspeitas de reacções adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reacções adversas diretamente ao Responsável pela Colocação no Mercado.

4.9 Sobredosagem

Não foram descritos casos de sobredosagem.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: 6.7 - Aparelho digestivo. Anti-hemorroidários, código ATC: CO5A

A principal substância activa de RETILYV, o Policresuleno, é um ácido orgânico de elevado peso molecular com propriedades selectivas de precipitação de proteínas. O pH é 4.0. O policresuleno coagula o tecido necrótico ou patologicamente alterado, expelindo-o do organismo. O tecido adjacente

à área afectada não é afectado pelo policresuleno. O policresuleno actua como hemostático local, coagulando as proteínas sanguíneas e originando a contracção dos pequenos vasos sanguíneos. Deste modo, as hemorragias do canal anal e da região perianal são rapidamente controladas. Simultaneamente, o policresuleno induz a hiperemização reactiva da zona afectada, estimulando a cicatrização e promovendo a reepitelização.

O efeito antisséptico do policresuleno impede a infecção secundária da região ferida anorrectal. Deste modo, é prevenida a inflamação. As propriedades adstringentes de policresuleno impedem o aparecimento de exsudação, que é um sintoma frequentemente associado às hemorroidas.

A Cinchocaína, um anestésico local, restringe de modo reversível e localmente a sensibilidade e o volume dos nervos sensoriais. Deste modo, são eliminados a dor e o prurido, sintomas frequentes de afecções anorrectais.

A associação das duas substâncias activas policresuleno e cinchocaína elimina rapidamente a hemorragia, dor, prurido e exsudação, impede a inflamação e promove a regeneração do tecido afectado.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

- Farmacocinética geral

Em experiências com animais, após a administração oral de policresuleno, foi absorvida cerca de 10% da dose. A absorção após aplicação intravaginal ou intrarrectal local foi ligeiramente inferior, sendo cerca de 6-8%. Os constituintes de policresuleno absorvidos foram eliminados com semivida entre 4 e 5 horas. Não foi detectada qualquer biotransformação. O policresuleno administrado por via intravenosa foi eliminado principalmente através da urina, e menos de 10% foi excretado nas fezes, enquanto o fármaco administrado por via oral ou via rectal foi excretado principalmente nas fezes, devido à sua fraca absorção, e menos de 10% foi eliminado através da urina.

Não existem dados disponíveis sobre o perfil farmacocinético da cinchocaína provenientes de experiências com animais. Com base na prolongada experiência no Homem, prevê-se que apenas sejam absorvidas pequenas quantidades de cinchocaína após administração local na pele e nas membranas mucosas.

- Características em doentes/grupos especiais de indivíduos

Não aplicável

5.3 Dados de segurança pré-clínica

O policresuleno foi essencialmente não-tóxico após administração oral em ratos e ratinhos e moderadamente tóxico após administração intravenosa em ensaios de toxicidade aguda. A toxicidade de dose repetida de policresuleno caracterizou-se por efeitos irritantes locais após aplicação intrarrectal ou intravaginal. Não se observaram sinais que indicassem toxicidade sistémica, provavelmente devido à fraca absorção do policresuleno. Obtiveram-se resultados semelhantes após a administração oral do fármaco, que originou apenas efeitos gastrointestinais, como vómitos e diarreia, mas sem toxicidade sistémica. Não existem dados disponíveis sobre a toxicidade de dose repetida da cinchocaína.

Em ensaios de toxicidade na reprodução, o policresuleno não afectou a fertilidade feminina e não foi embriotóxico ou teratogénico. Observaram-se ligeiros efeitos fetotóxicos com dose igual ou superior a 300 mg/kg de peso corporal. Não existem disponíveis dados sobre os efeitos na reprodução mediados pela cinchocaína.

O policresuleno não foi mutagénico no Teste de Ames *in vitro*. Não existem disponíveis dados sobre os possíveis efeitos mutagénicos da cinchocaína. Para nenhuma destas substâncias se observaram sinais de carcinogenicidade nos ensaios disponíveis em animais.

A aplicação local de polícresuleno originou ligeiros efeitos irritantes locais na pele e nas membranas mucosas do recto e da vagina. Para a cinchocaína, foram descritos casos únicos de sensibilização de contacto no Homem, indicando algum potencial sensibilizante do fármaco.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1. Lista dos excipientes

Butil-hidroxitolueno (E 321)
Edetato dissódico
Sílica coloidal anidra
Éter cetosteárilico de macrogol
Macrogol 300
Macrogol 1500
Macrogol 400
Hidróxido de sódio
Água purificada

6.2 Incompatibilidades

Não aplicável.

6.3 Prazo de validade

3 anos.

6.4 Precauções especiais de conservação

Não conservar acima de 25°C.

Possíveis alterações na cor da pomada não têm qualquer influência na eficácia do produto.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

Este medicamento é fornecido em bisnagas de alumínio de 30 g de pomada com aplicador.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento

Não existem requisitos especiais.

7. RESPONSÁVEL PELA COLOCAÇÃO NO MERCADO

BIAL - Portela & C^a, S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado · Portugal
E-mail: info@bial.com

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Não aplicável.

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Não aplicável.

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO

03/2023