



Biparfen[®]

FEVEREIRO '21

BF/ABR23/EM/015

Bial



BIAL-Portela & Cª SA. Copyright.

Esta apresentação destina-se apenas ao uso exclusivo da Bial para efeitos de formação a profissionais de saúde pelo que fica proibida a sua reprodução ou transmissão por qualquer meio.

O que é Biparfen®?

[Bi]parfen®



Bial

Duas moléculas

O que é Biparfen®?

Bi [par] fen®



Paracetamol

O que é Biparfen®?

Bipar[fen][®]



Ibuprofeno

O que é Biparfen®?

Biparfen®

PARACETAMOL + IBUPROFENO

25 + 20 mg/ml

**Associação fixa
composta por
Paracetamol
+ Ibuprofeno
(25+20 mg/ml)**



Bial



ASSOCIAÇÃO FIXA


PARACETAMOL
E IBUPROFENO NAS **DOSES
RECOMENDADAS.**²


Bial lançou...

...uma **suspensão oral**, com aroma a laranja, que contém paracetamol e ibuprofeno.

É adequada para o **uso em Pediatria**.

Cada ml de suspensão oral contém **25 mg** de paracetamol e **20 mg** de ibuprofeno.





INOVAÇÃO

SERINGA GRADUADA
EM **KG** QUE **FACILITA**
A CORRECTA
ADMINISTRAÇÃO
DA DOSE.¹

A terapêutica alternada com paracetamol e ibuprofeno é confusa para os pais, levando a **erros de dosagem** uma vez que são necessários **cálculos usando o peso da criança**.

A **seringa doseadora em Kg** promove a administração da **dose certa, de forma simples e fácil**, diminuindo a probabilidade de erros.



3 PASSOS SIMPLES

AGITAR

Antes de cada utilização, o frasco deverá ser vigorosamente agitado.

DOSEAR

A embalagem inclui uma seringa para uso oral graduada em ml e em Kg, correspondendo ao volume de suspensão oral e ao peso corporal da criança, respectivamente.



ADMINISTRAR e LAVAR

Não administrar mais de **3 doses** em 24 horas.

O **intervalo** entre as doses deve ser de, **pelo menos, 6 horas**.

Lavar a seringa com água no final da utilização.

SÓ **3X**
POR DIA



Bial

A **adesão terapêutica** é **chave** para garantir a máxima eficácia dos medicamentos prescritos.

Entre os factores relevantes que podem afectar a adesão terapêutica em Pediatria estão:

- a **formulação farmacêutica**, que deve responder às necessidades em cada idade na criança, características clínicas;
- as **características organolépticas** do fármaco, particularmente importantes no caso de formulações orais;
- o **volume de fármaco** e o **número de doses a administrar** por dia, que deve ser limitado.



**COMODIDADE
E ADEÇÃO
TERAPÊUTICA**
1 TOMA ÚNICA,
APENAS 3X/DIA.¹



AGRADÁVEL
SABOR A LARANJA,
SEM AÇÚCAR.¹





TRIPLA ACÇÃO
DOR MODERADA AGUDA,
FEBRE PERSISTENTE, INFLAMAÇÃO.¹



[DOR MODERADA AGUDA]

As causas de dor aguda são os principais motivos de procura de cuidados de saúde. A dor na criança é frequentemente mal avaliada, sub-diagnosticada e **mal controlada**.

A dor é uma das **principais causas de sofrimento na criança** e o seu tratamento insuficiente tem **consequências nefastas para o crescimento e desenvolvimento infantil**.

O melhor controlo da dor traz vantagens a vários níveis, proporcionando um **maior conforto** à criança, ajudando a **prevenir potenciais complicações**, favorecendo a precocidade da alta e contribuindo para a **humanização dos cuidados**.





[FEBRE PERSISTENTE]

Os quadros febris **provocam mal-estar** à criança e estão frequentemente associados a dor. Na criança a fazer monoterapia que **ainda assim demonstra sinais de desconforto geral**, incluindo choro prolongado, irritabilidade, actividade reduzida, perda de apetite e distúrbios do sono, é necessário **tratar com maior eficácia passando da monoterapia para a associação fixa**.

A associação fixa tem um melhor perfil de segurança, porque **reduz significativamente o risco de sobredosagem** por alternância dos dois princípios activos.

INFLAMAÇÃO

No decorrer de uma infecção, bacteriana ou vírica, a inflamação evolui com edema, dor e **profundo mal-estar para a criança**. Controlar a inflamação é um passo importante para gerir o quadro clínico e proporcionar conforto à criança. Os quadros inflamatórios mais comuns em Pediatria e aos quais deve estar particularmente atento são:

- Otite média aguda
- Faringite/laringite/amigdalite
- Bronquite
- Infecções dentárias
- Dor de crescimento
- Anemia falciforme



**RÁPIDO
E EFICAZ**
COM CONTROLO
ADEQUADO DA DOR
MODERADA AGUDA
E FEBRE PERSISTENTE.^{3,4}





SEGURANÇA

SEM EFEITOS
INDESEJÁVEIS ALÉM
DOS REFERENTES
À MONOTERAPIA.¹

O paracetamol e o ibuprofeno estão entre os **fármacos mais estudados em Pediatria**. A **confiança** na sua eficácia e segurança é uma realidade.

A evidência publicada mostra que a associação de paracetamol e ibuprofeno **não altera o bom perfil de segurança** destes fármacos.

Sabemos que, quando usados correctamente, a **ocorrência de efeitos adversos é rara**. Isto é muito mais óbvio com a associação fixa porque ela torna possível **reduzir significativamente os riscos** associados à hipermedicação que ocorre frequentemente quando o paracetamol e ibuprofeno são usados alternadamente e com necessidade de calcular doses.



MENOR RISCO DE SOBREDOSAGEM

VS. A TERAPÊUTICA
ALTERNADA.^{5,6}

**A associação fixa, com uma seringa
doseada em Kg,
reduz os erros de dosagem e o risco de
toxicidade por hipermedicação.**

Usar apenas em crianças
com mais de 2 anos de idade.



A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS ACIMA DE TUDO

- Crianças com sinais de **desidratação**
- Crianças com sinais de **desnutrição**
- Crianças com **doença hepática ou gástrica** coexistente
- Crianças **polimedicadas (>5 medicamentos)**

... NÃO DEVEM USAR A ASSOCIAÇÃO FIXA

Um gesto, todos os cuidados



Biparfen[®]

PARACETAMOL + IBUPROFENO

25 + 20 mg/ml



Bial



OBRIGADA!

Biparfen[®]

Bial