

Produit: Folicil 5 mg comprimés

Date: 2014.03.27

Auteur: IA/DAR

Page 1/5

CONFIDENTIEL

III. Fiche de Renseignements

III. Fiche de Renseignements

1. Nom et Adresse et Raison Sociale du Demandeur

BIAL – Portela & C^a., S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

2. Nom et Adresse du Laboratoire Pharmaceutique Fabricant

- **Fabricant, lieu de contrôle et conditionnement, libération du lot:**

BIAL – Portela & C^a., S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

3. Nom et Adresse du Représentant au Cameroun

Pierre FANDJA
BP 20377, Yaoundé, Cameroun

4. Nom et Adresse du Pharmacien Interlocuteur au Cameroun

Dr EYONG OROCK HANNY OROCK
heyongorock@yahoo.com
Résidant à Yaoundé, Cameroun, diplômé de la Faculté de PORT HARCOURT et
inscrit à l'Ordre National des Pharmaciens du CAMEROUN sur le titre n° 515.

5. Nom du Produit

FOLICIL 5 mg, comprimés

6. Dénomination Commune Internationale

Acide folique.

7. Nom Chimique et Famille Pharmacologique

Acide folique, Ludipress® [lactose monohydraté, povidone (Kollidon® K30),
crospovidone (Kollidon® CL)] et stéarate de magnésium.

8. Numéro d'autorisation de mise sur le marché au Portugal, valide, et date d'obtention dans le pays fabricant et le pays demandeur

4257895. Date d'obtention: 1950-03

Produit: Folicil 5 mg comprimés
Date: 2014.03.27
Auteur: IA/DAR

Page 2/5
CONFIDENTIEL

III. Fiche de Renseignements

9. Lieu de Fabrication et de Conditionnement

BIAL – Portela & C^a., S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

10. Liste des substances vénéneuses

Non applicable.

11. Form et Présentation

Comprimés. Boîte de 20 comprimés sous blisters de PVC/Aluminium.

12. Classe thérapeutique

Code ATC : B03B B01 – Acide folique.

13. Composition unitaire détaillée

<u>Nom générique</u>	<u>Quantité (mg/comprimé)</u>
Acide folique.....	5,00
Ludipress *.....	213,00
Stéarate de magnésium.....	2,00

*Composition du Ludipress

Lactose monohydraté	93,4 ± 2%-----diluant
Kollidon K30 (povidone)	3,2 ± 0,3%-----liant
Kollidon CL (crospovidone)	3,4 ± 0,3%-----désintégrant

14. Propriétés

Propriétés pharmacodynamiques:

Code ATC : B03B B01 – Acide folique.

L'acide folique est une coenzyme importante pour le métabolisme cellulaire. Après l'absorption par le tractus digestif, l'acide folique est rapidement réduit, donnant lieu à des formes actives qui participent à de nombreuses réactions métaboliques essentielles pour la vie, telles que la synthèse des purines, la synthèse de nucléotides pyrimidiques et l'inter-conversion des acides aminés (de la sérine en glycine, de l'histidine en acide glutamique, de l'homocystéine en méthionine).

Produit: Folicil 5 mg comprimés
Date: 2014.03.27
Auteur: IA/DAR

Page 3/5
CONFIDENTIEL

III. Fiche de Renseignements

Propriétés pharmacocinétiques:

Par voie orale, l'acide folique est rapidement absorbé dans le tractus gastrointestinal, principalement dans la partie proximale de l'intestin grêle. Avant d'être absorbés, les polyglutamates, formes naturelles de l'acide folique, sont hydrolysés sous l'action des enzymes dans le tractus gastrointestinal et transformés en formes monoglutamiques d'acide folique. La muqueuse du duodénum et la partie supérieure du jéjunum sont riches en dihydrofolate réductase, substance capable de procéder à la méthylation des folates réduits qui sont absorbés. Suite à l'administration orale, le pic plasmatique maximal est atteint entre 30 et 60 minutes. La concentration plasmatique normale des folates varie entre 0,005 et 0,015 mcg/ml. Généralement, les concentrations plasmatiques inférieures à 0,005 mcg/ml indiquent une déficience en folates et les concentrations inférieures à 0,002 mcg/ml entraînent une anémie mégaloblastique.

L'acide tétrahydrofolique et ses dérivés sont distribués dans tous les tissus corporels. Le foie contient près de la moitié de l'ensemble des réserves de folates. Les folates sont activement concentrés dans le LCR, sachant que les concentrations normales sont situées entre 0,016 et 0,021 mcg/ml. L'acide folique est une vitamine hydrosoluble du complexe B. Compte tenu que sa principale voie d'élimination est la voie rénale, il ne se produit pas d'accumulation dans le corps. Suite à l'administration orale d'une dose unique de 0,1 à 0,2 mg d'acide folique chez des adultes en bonne santé, seulement une très petite quantité d'acide folique apparaît dans les urines. Lorsque la réabsorption tubulaire rénale maximale est dépassée, suite à des administrations orales supérieures aux besoins quotidiens, le folate est excrété, intact, dans l'urine. Près de 0,05 mg des réserves normales de folates sont éliminées quotidiennement par excrétion fécale et urinaire.

15. Indications

FOLICIL est indiqué dans le cadre du traitement ou de la prévention de déficience en acide folique, tout particulièrement pendant la grossesse, l'allaitement et les périodes de forte croissance.

Le traitement à l'acide folique est également indiqué dans le cadre de la prévention des anomalies du tube neural (spina-bifida, méningocèle, anencéphalie), particulièrement chez les femmes ayant des antécédents de nouveau-nés (ou fœtus) présentant ces malformations.

Compte tenu que l'administration prolongée de barbituriques, anticonvulsivants, antipaludiques, de laxatifs, de contraceptifs oraux et de certains agents chimiothérapeutiques peut entraîner des déficiences iatrogéniques en folates, dans ces situations il est recommandé d'administrer FOLICIL.

Produit: Folicil 5 mg comprimés
Date: 2014.03.27
Auteur: IA/DAR

Page 4/5
CONFIDENTIEL

III. Fiche de Renseignements

16. Mode d'action

Des formes actives de l'acide folique participent à de nombreuses réactions métaboliques essentielles pour la vie, telles que la synthèse des purines, la synthèse de nucléotides pyrimidiques et l'inter-conversion des acides aminés (de la sérine en glycine, de l'histidine en acide glutamique, de l'homocystéine en méthionine).

17. Mode d'emploi et posologie

Posologie

La posologie et la durée du traitement doivent être établies par le médecin.

Chez l'adulte : entre ½ et 1 comprimé, une ou deux fois par jour, en fonction de la situation clinique à traiter.

Prévention des anomalies du tube neural : ½ comprimé par jour, un mois avant la conception et pendant le premier trimestre de grossesse.

Chez l'enfant : la moitié de la dose utilisée chez l'adulte.

Mode d'administration

Avaler les comprimés avec un peu d'eau, après les repas ou dans l'intervalle des repas.

18. Contre-indications

Hypersensibilité à l'acide folique ou à l'un des excipients.

19. Précautions d'emploi et mise en garde

L'administration d'acide folique ne doit jamais être faite sans avoir préalablement confirmé une éventuelle déficience en vitamine B12 ou sans son administration concomitante, compte tenu du risque de son développement sous-jacent ou même la manifestation des mécanismes qui peuvent entraîner des complications neurologiques graves (myélose funiculaire, notamment connue sous le nom de dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière ou syndrome neuro-anémique et polyneuropathie).

FOLICIL contient du lactose. Ce médicament est contre-indiqué chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

Produit: Folicil 5 mg comprimés
Date: 2014.03.27
Auteur: IA/DAR

Page 5/5
CONFIDENTIEL

III. Fiche de Renseignements

20. Effets secondaires / Effets indésirables

Très fréquents ($\geq 1/10$), Fréquents ($\geq 1/100$, $< 1/10$), Peu fréquents ($\geq 1/1.000$, $< 1/100$), Rares ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$), Très rares ($< 1/10.000$), y compris les cas isolés.

Troubles du système immunitaire :

Rares: Phénomènes d'hypersensibilité tels qu'érythème, fièvre, prurit et bronchospasme.

21. Incompatibilités

Sans objet.

22. Délai de péremption, condition de stockage e autres précautions

3 ans. À conserver à une température ne dépassant pas 30° C. À conserver dans l'emballage d'origine.

23. Prix grossiste et Prix CAF Cameroun

PGHT: 886,00 FCFA

PGHT (CIF- voie maritime) = 930,00 FCFA

PGHT (CIF- voie aérienne) = 975,00 FCFA

24. Prix grossiste et public du pays fabricant convertis em monnaie camerounaise

PGHT: 997,00 FCFA

PVP: 1.469,00 FCFA