

RESUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

FOLICIL 5 mg, comprimés

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chaque comprimé contient de l'acide folique, 5 mg.

Excipient(s) : lactose

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé.

Comprimés de couleur jaune, circulaires et biconvexes, gravé avec «Bial» sur une face et avec « F|O » sur l'autre face.

Le comprimé peut être divisé en doses égales.

4. DONNÉES CLINIQUES

4.1. Indications thérapeutiques

FOLICIL est indiqué dans le cadre du traitement ou de la prévention de déficience en acide folique, tout particulièrement pendant la grossesse, l'allaitement et les périodes de forte croissance.

Le traitement à l'acide folique est également indiqué dans le cadre de la prévention des anomalies du tube neural (spina-bifida, méningocèle, anencéphalie), particulièrement chez les femmes ayant des antécédents de nouveau-nés (ou fœtus) présentant ces malformations.

Compte tenu que l'administration prolongée de barbituriques, anticonvulsivants, antipaludiques, de laxatifs, de contraceptifs oraux et de certains agents chimiothérapeutiques peut entraîner des déficiences iatrogéniques en folates, dans ces situations il est recommandé d'administrer FOLICIL.

4.2. Posologie et mode d'administration

Posologie

La posologie et la durée du traitement doivent être établies par le médecin.

Chez l'adulte : entre ½ et 1 comprimé, une ou deux fois par jour, en fonction de la situation clinique à traiter.

Prévention des anomalies du tube neural : ½ comprimé par jour, un mois avant la conception et pendant le premier trimestre de grossesse.

Chez l'enfant : la moitié de la dose utilisée chez l'adulte.

Mode d'administration

Avaler les comprimés avec un peu d'eau, après les repas ou dans l'intervalle des repas.

4.3. Contre-indications

Hypersensibilité à l'acide folique ou à l'un des excipients mentionnés dans la rubrique 6.1.

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

L'administration d'acide folique ne doit jamais être faite sans avoir préalablement confirmé une éventuelle déficience en vitamine B12 ou sans son administration concomitante, compte tenu du risque de son développement sous-jacent ou même la manifestation des mécanismes qui peuvent entraîner des complications neurologiques graves (myélose funiculaire, notamment connue sous le nom de dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière ou syndrome neuro-anémique et polyneuropathie).

FOLICIL contient du lactose. Ce médicament est contre-indiqué chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

CHLORAMPHÉNICOL: L'administration simultanée d'acide folique et de chloramphénicol chez les patients présentant une carence en folates peut antagoniser la réponse hématopoïétique à l'acide folique
PHÉNYTOÏNE: Chez les patients épileptiques traités à la phénytoïne, le traitement à base de médicaments contenant de l'acide folique peut augmenter le métabolisme de la phénytoïne, diminuer ses concentrations sériques et augmenter la fréquence des crises d'épilepsie.

4.6. Fertilité, Grossesse et Allaitement

L'acide folique peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse et l'allaitement. La déficience en acide folique se manifeste dans ces situations, c'est pourquoi il est recommandé de prendre FOLICIL comme moyen de prévention.

4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

FOLICIL n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

4.8. Effets indésirables

Très fréquents ($\geq 1/10$), Fréquents ($\geq 1/100$, $< 1/10$), Peu fréquents ($\geq 1/1.000$, $< 1/100$), Rares ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$), Très rares ($< 1/10.000$), y compris les cas isolés.

Troubles du système immunitaire:

Rares: Phénomènes d'hypersensibilité tels qu'érythème, fièvre, prurit et bronchospasme.

Affections gastrointestinales:

Rare: Anorexie, nausée, distension abdominal et flatulence

4.9. Surdosage

Aucun cas de surdosage n'a été signalé. Lorsque de fortes doses sont administrées, l'acide folique est éliminé par la voie urinaire.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

Code ATC : B03B B01 – Acide folique.

L'acide folique est une coenzyme importante pour le métabolisme cellulaire. Après l'absorption par le tractus digestif, l'acide folique est rapidement réduit, donnant lieu à des formes actives qui participent

à de nombreuses réactions métaboliques essentielles pour la vie, telles que la synthèse des purines, la synthèse de nucléotides pyrimidiques et l'inter-conversion des acides aminés (de la sérine en glycine, de l'histidine en acide glutamique, de l'homocystéine en méthionine).

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Par voie orale, l'acide folique est rapidement absorbé dans le tractus gastrointestinal, principalement dans la partie proximale de l'intestin grêle. Avant d'être absorbés, les polyglutamates, formes naturelles de l'acide folique, sont hydrolysés sous l'action des enzymes dans le tractus gastrointestinal et transformés en formes monoglutamiques d'acide folique. La muqueuse du duodénum et la partie supérieure du jéjunum sont riches en dihydrofolate réductase, substance capable de procéder à la méthylation des folates réduits qui sont absorbés. Suite à l'administration orale, le pic plasmatique maximal est atteint entre 30 et 60 minutes. La concentration plasmatique normale des folates varie entre 0,005 et 0,015 mcg/ml. Généralement, les concentrations plasmatiques inférieures à 0,005 mcg/ml indiquent une déficience en folates et les concentrations inférieures à 0,002 mcg/ml entraînent une anémie mégaloblastique.

L'acide tétrahydrofolique et ses dérivés sont distribués dans tous les tissus corporels. Le foie contient près de la moitié de l'ensemble des réserves de folates. Les folates sont activement concentrés dans le LCR, sachant que les concentrations normales sont situées entre 0,016 et 0,021 mcg/ml. L'acide folique est une vitamine hydrosoluble du complexe B. Compte tenu que sa principale voie d'élimination est la voie rénale, il ne se produit pas d'accumulation dans le corps. Suite à l'administration orale d'une dose unique de 0,1 à 0,2 mg d'acide folique chez des adultes en bonne santé, seulement une très petite quantité d'acide folique apparaît dans les urines. Lorsque la réabsorption tubulaire rénale maximale est dépassée, suite à des administrations orales supérieures aux besoins quotidiens, le folate est excrété, intact, dans l'urine. Près de 0,05 mg des réserves normales de folates sont éliminées quotidiennement par excrétion fécale et urinaire.

5.3. Données de sécurité préclinique

Les données non cliniques issues des études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicologie en administration répétée, génotoxicité, cancérogénèse, et des fonctions de reproduction et de développement, n'ont pas révélé de risque particulier pour l'homme.

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1. Liste des excipients

Ludipress® [lactose monohydraté, povidone (Kollidon® K30), crospovidone (Kollidon® CL)] et stéarate de magnésium.

6.2 Incompatibilités

Sans objet.

6.3. Durée de conservation

3 ans.

6.4. Précautions particulières de conservation

À conserver à une température ne dépassant pas 30° C. À conserver dans l'emballage d'origine.

6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur

Boîte de 20 comprimés sous blisters de PVC/Aluminium.

6.6. Précautions particulières d'élimination et manipulation

Pas d'exigences particulières pour l'élimination.

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.>

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BIAL- Portela & C^a S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
PORTUGAL

8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

10282/15

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

Date de première autorisation : 24 Août 2015

Date de dernière renouvellement : 16 Avril 2021

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE