

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

MIGRÉTIL, comprimés pelliculés

Traitement des crises de migraine

1. Nom et Adresse du Laboratoire Pharmaceutique Fabricant

BIAL - Portela & C^a, S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

2. Nom et Adresse et Raison Sociale du Demandeur

BIAL - Portela & C^a, S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

3. Nom et Adresse du Représentant au Cameroun

Mr. FANSI TIENTCHEU Narcisse Raoul
Gsvpharma, Zone A Bonamoussadi Douala
BâtimentC37
BP 6451
Douala
Tel.: 00237 626 75 69
Port.: 00237 532 37 59
Email.: nfansi16@yahoo.fr

4. Nom et Adresse du Pharmacien Interlocuteur au Cameroun

Dr. Martin TENDA
Docteur en Pharmacie
Pharmacie Sainte marie
Situé à l'Axe lourd Douala - Yaoundé
Port.:00237 994 66 69
Dom.: 00237 994 35 30
Email.: drtenda@yahoo.fr

5. Nom du Produit

MIGRÉTIL

6. Dénomination Commune Internationale

Paracétamol; Caféine; Tartrate d'ergotamine; Alcaloïdes de la belladone

7. Nom Chimique et Famille Pharmacologique

Paracétamol; Caféine; Tartrate d'ergotamine; Alcaloïdes de la belladone; Préparations antimigraineuses, alcaloïdes ergotaminiques.

8. Numéro d'autorisation de mise sur le marché au Portugal, valide et date d'obtention dans le pays fabricant et le pays demandeur

9989004 et 9989012. Date d'obtention 22/12/1986

9. Lieu de Fabrication et de Conditionnement

BIAL - Portela & C^a, S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

10. Liste des substances vénéneuses

Non applicable.

11. Form et Présentation

Comprimés pelliculés, Boite 20 comprimés.

12. Classe thérapeutique

Préparations antimigraineuses, alcaloïdes ergotaminiques

13. Composition unitaire détaillée

Tartrate d'ergotamine	1 mg
Caféine	100 mg
Paracétamol	400 mg
Alcaloïdes de belladone (sous la forme de 0,085mg de bromhydrate de scopolamine et de 0,015mg de sulfate de d'atropine)	0,1 mg
Acide tartrique	7 mg
Povidone	12 mg
Cellulose microcristalline	90,2 mg
Croscarmellose sodique	32,7 mg
Stéarate de magnésium	5 mg
Eudragit E100	25 mg
Par comprimé	

14. Propriétés

Antimigraineuses.

15. Indications

Traitement des crises de migraine. Il ne prévient pas l'apparition des crises.

16. Mode d'action

Effets analgésiques et antipyrétiques dus à un mécanisme semblable à celui des salicylés de le paracétamol; la caféine potentie l'action des alcaloïdes de l'ergot de seigle augmentant l'absorption gastro-intestinale de l'ergotamine; l'ergotamine provoque la diminution de l'amplitude du pouls et les alcaloïdes de belladone exercent effet antiémétique.

17. Mode d'emploi et posologie

Sauf indication médicale en contraire la posologie recommandée est la suivante:

Adultes: Deux comprimés à la fois, pendant l'aura ou au commencement de la céphalée. Si nécessaire, administrer un autre comprimé après une demi-heure, cette dose pouvant être répétée après une autre demi-heure.

Adolescents: Un comprimé pendant l'aura ou le commencement de la céphalée. Si nécessaire, administrer un autre comprimé après une demi-heure.

Il n'est pas indiqué chez l'enfant âgé moins de 12 ans.

Les comprimés sont à avaler le plus tôt possible, dès les premiers symptômes de la crise de migraine.

Ne pas avaler plus de 6 comprimés par jour ou plus de 10-12 comprimés par semaine.
Les comprimés sont à avaler entiers avec de l'eau.

18. Contre-indications

Hypersensibilité à l'un des composants. Grossesse et allaitement, alcoolisme actif, insuffisance hépatique significative. Angioplastie ou chirurgie vasculaire récentes ou prévues, maladie vasculaire périphérique occlusive, hypertension non contrôlée, maladie coronarienne.

19. Précautions d'emploi et mise en garde

Le risque de complications est augmenté en cas d'infections graves ou d'insuffisance rénale significative, et aussi chez les sujets âgés.

Chez les malades ayant des troubles de l'anxiété, la caféine peut exacerber les symptômes. Il faut éviter l'administration simultanée de boissons contenant de la caféine. Les patients avec une hypertrophie prostatique, une rétention urinaire, une maladie gastro-intestinale occlusive ou un glaucome peuvent souffrir de l'action toxique due aux résultantes des alcaloïdes de la belladone, bien que les doses utilisées dans le MIGRÉTIL soient très basses.

20. Effets secondaires / Effets indésirables

Aux doses recommandées MIGRÉTIL est habituellement bien toléré. Il peut survenir des réactions d'hypersensibilité cutanée, des signes d'irritation gastrique, diarrhée, insomnie, nervosité, myalgies, paresthésies et diminution de la force des membres inférieurs. Les effets vasoconstricteurs peuvent se faire sentir dans certains vaisseaux, bien qu'il existe de grandes variabilités interindividuelles. Ces effets se traduisent par extrémités froides, engourdis et douloureuses, avec ou sans paresthésies.

21. Incompatibilités

Les xanthines peuvent augmenter les effets des stimulants bêta-adrénergiques. L'utilisation Le sulfate d'atropine est incompatible avec les bases, l'acide tannique et les sels de mercure.

Le bromhydrate de scopolamine est incompatible avec les bases, les sels d'argent et l'acide tannique.

22. Délai de péremption, condition de stockage e autres précautions

Trois ans. Conserver le produit à l'abri de la lumière et humidité, à température contrôlée (15-30°C).

23. Prix grossiste et Prix CAF Cameroun

PGHT: 1180,70 FCFA

PGHT approximatif - CIF (voie maritime): 1239,74 FCFA

PGHT approximatif - CIF (voie aérienne): 1299,00