

Marca	Laboratório	Princípio Activo	Forma farmacêutica	Indicações	Anestésico	Adstringente/Hemostático	Anti-inflamatório	Corticoide	Antimicrobiano	Cicatrizante	Argumentos
Ultraproct	Karo Pharma	Fluocortolona + Lidocaína	Creme rectal, 30g *	Para o alívio sintomático da dor, edema ou prurido associado a doença hemorroidária	Lidocaína	N.A.	Fluocortolona	Fluocortolona	N.A.	N.A	- Contém corticosteroides - Sem efeito antimicrobiano nem hemostático - Indicações mais restritas que Retilyv - Creme: mais fluido, maior dificuldade em fixar na ferida
Hemofissural	Baldacci	Óxido de zinco + Dióxido de titânio + Tetracaína	Pasta rectal, 20g	Hemorroidas externas e internas, fissuras, pruridos e irritações anais.	Tetracaína	Óxido de zinco (Dióxido de titânio **)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	- Pasta: muito denso (+sólidos e -água), com consistência mais dura e efeito oclusivo; dificuldade em utilizar o aplicador, aplicar e espalhar
Proctolog	Menarini	Ruscogenina + Trimebutina	Pomada rectal, 50g *	Tratamento das hemorróidas (diagnóstico confirmado)	Trimebutina (efeito anestésico local causal) - através do seu efeito espasmolítico do esfíncter anal	N.A.	Ruscogenina (tem também efeito flebotónico)	N.A.	N.A.	N.A.	- Sem efeito antimicrobiano nem hemostático - Indicações mais restritas que Retilyv - Embalagem maior: quantidade maior do que a necessária para o tratamento e mais cara
Scheriproct	Bayer	Prednisolona + Cinchocaína	Pomada rectal, 30g	Hemorróidas, fissuras anais superficiais, proctite.	Cinchocaína (5mg/g)	N.A.	N.A.	Prednisolona	N.A.	N.A.	- Contém corticosteroides - Sem efeito antimicrobiano nem hemostático
Synalar Rectal	Medinfar	Acetonido de fluocinolona + Lidocaína + Subgalhato de bismuto	Pomada rectal, 40g	Hemorróidas internas e externas, eczema ano-perirenal, proctite, prurido anal, fissuras anais, terapêutica pré e pós-operatória dos processos ano-rectais.	Lidocaína	Subgalhato de bismuto	N.A.	Acetonido de fluocinolona	N.A.	N.A.	- Contém corticosteroides - Sem efeito antimicrobiano - Mais orientado para cirurgia
Procto-Glyvenol	Jaba Recordati	Tribenosido + Lidocaína	Creme rectal, 30g	Tratamento de hemorróidas externas e internas.	Lidocaína	N.A.	Tribenosido	N.A.	N.A.	Tribenosido	- Sem efeito hemostático - Indicações mais restritas que Retilyv - Creme: mais fluido, maior dificuldade em fixar na ferida
Retilyv	Bial	Policresuleno + Cinchocaína	Pomada rectal, 30g	RETILYV está indicado para o tratamento de: hemorroidas não complicadas, fissuras, prurido e eczema anal, após diagnóstico médico prévio.	Cinchocaína	Policresuleno	Policresuleno (efeito anti-inflamatório causal)	N.A.	Policresuleno	Policresuleno	---

NOTA: Os corticoides não são cicatrizantes per si, porém exercem esse efeito na ferida.
** O principal papel do Dióxido de Titânio é proteção UV e branqueamento. Neste caso, deverá ter o papel de excipiente estabilizador do composto; o mais provável é ser um suavizante (ao toque) da pasta.
Note-se que há orientações recentes da EMA de retirar este excipiente dos alimentos e dos medicamentos orais por ser potencialmente tóxico.