

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA
Môn: VẬT LÝ

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một lượng khí được giữ ở một nhiệt độ xác định, khi áp suất là 10^5 Pa thì có thể tích 6 lít, khi áp suất là $1,5 \cdot 10^5$ Pa thì có thể tích là

- A. 12 lít. B. 8 lít. C. 4 lít. D. 9 lít.

Câu 2. Một xilanh chứa 150 cm^3 khí ở áp suất $1,2 \cdot 10^5$ Pa. Piston nén đẳng nhiệt khí trong xilanh đến thể tích 100 cm^3 thì áp suất của khí là

- A. $0,8 \cdot 10^5$ Pa. B. $1,8 \cdot 10^5$ Pa.
C. $1,5 \cdot 10^5$ Pa. D. $0,5 \cdot 10^5$ Pa.

Câu 3. Một lượng khí lí tưởng được nén đẳng nhiệt từ 8 lít xuống 6 lít thì áp suất thay đổi một lượng là $1,2 \cdot 10^5$ Pa. Áp suất ban đầu của khí là

- A. $1,6 \cdot 10^4$ Pa. B. $4,8 \cdot 10^4$ Pa.
C. $0,9 \cdot 10^5$ Pa. D. $3,6 \cdot 10^5$ Pa.

Câu 4. Một xe tải khi không chở hàng thì thể tích khí trong lốp là V_0 và P_0 . Sau khi xếp hàng lên thì áp suất trong lốp tăng thêm một lượng ΔP . Coi khí trong lốp là lí tưởng, khối lượng và nhiệt độ của nó không thay đổi. Thể tích của khí trong lốp sau khi xếp hàng lên xe là

- A. tăng thêm $\frac{\Delta P \cdot V_0}{P_0 + \Delta P}$.
B. giảm đi $\frac{\Delta P \cdot V_0}{P_0 + \Delta P}$.
C. tăng thêm $\frac{\Delta P \cdot V_0}{P_0 - \Delta P}$.
D. giảm đi $\frac{\Delta P \cdot V_0}{P_0 - \Delta P}$.

Câu 5. Một lượng khí lí tưởng ban đầu có áp suất p_1 . Giữ nhiệt độ của khí không đổi nhưng tăng áp suất thêm một lượng $0,5p_1$ thì thể tích của khí thay đổi một lượng 2 lít. Thể tích ban đầu của khí là

- A. 1 lít. B. 4 lít. C. 6 lít. D. 3 lít.

Câu 6. Một lượng khí lí tưởng xác định, ban đầu ở áp suất 3 atm. Bây giờ giữ nhiệt độ của khí không đổi đồng thời tăng áp suất khí thêm 2 atm thì thể tích khí thay đổi một lượng 4 lít. Thể tích ban đầu của khí là

- A. 2 lít. B. 4,4 lít. C. 10 lít. D. 6 lít.

Câu 7. Trong bể nước có nhiệt độ không đổi, một bong bóng khí nổi dần lên từ đáy bể. Trong quá trình nổi lên thể tích và áp suất của bong bóng khí thay đổi như thế nào?

- A. Thể tích tăng và áp suất giảm.
B. Thể tích và áp suất đều không đổi.
C. Thể tích và áp suất đều tăng.
D. Thể tích và áp suất đều giảm.

Câu 8. Một bong bóng khí có thể tích V nằm ở đáy ao, nổi dần lên trên mặt nước. Biết ao nước sâu 3 m, nước có nhiệt độ không đổi, áp suất khí quyển là 10^5 Pa, khối lượng riêng của nước là 10^3 kg/m^3 . Thể tích của bong bóng khí này khi ở mặt nước là

- A. $1,3V$. B. $1,5V$. C. $0,7V$. D. $0,5V$.

Câu 9. Một bong bóng khí nổi dần từ đáy hồ lên mặt nước thì thể tích tăng lên gấp đôi. Biết nhiệt độ nước hồ không đổi, áp suất khí quyển là 10^5 Pa, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 và $g = 10 \text{ m/s}^2$. Độ sâu của nước là

- A. 10 m. B. 20 m. C. 5 m. D. 4 m.

Câu 10. Một bình đang chứa khí ở áp suất 1,0 atm và thể tích 6,0 lít, được bơm thêm một lượng khí có thể tích 9,0 lít và áp suất 1,0 atm. Giả sử rằng quá trình bơm khí có nhiệt độ không đổi. Áp suất khí trong bình chứa không khí sau đó là

- A. 1,0 atm. B. 1,5 atm.
C. 2,0 atm. D. 2,5 atm.

Câu 11. Dùng bình chứa khí lí tưởng có áp suất 24 atm và thể tích 20 lít để bơm từ từ vào 15 bình chân không có thể tích 20 lít, quá trình bơm bình cuối cùng dừng lại tự nhiên. Coi nhiệt độ không đổi trong quá trình bơm và áp suất trong các bình được bơm bằng nhau. Áp suất bên trong các bình được bơm là

- A. 1,5 atm. B. 1,6 atm.
C. 2,4 atm. D. 1,2 atm.

Câu 12. Một bình khí oxy có thể tích 20 lít và áp suất là 30 atm được mở van để cho oxy phân phối vào các lọ chân không có thể tích 5 lít. Áp suất trong các lọ sau khi phân phối là 2 atm. Biết quá trình phân phối nhiệt độ không đổi và không có rò rỉ khí. Số lọ có thể phân phối là

A. 4. B. 50. C. 56. D. 60.

Câu 13. Một bình oxy cao áp có áp suất $1,3 \cdot 10^7$ Pa và thể tích 30 lít. Mỗi ngày cần lấy ra từ bình một lượng khí có thể tích 400 lít ở áp suất $1,0 \cdot 10^5$ Pa. Coi nhiệt độ khí không thay đổi. Để đảm bảo áp suất của oxy trong bình không nhỏ hơn $1,0 \cdot 10^6$ Pa thì lượng oxy trong bình có thể sử dụng

A. 3 ngày. B. 6 ngày.
C. 9 ngày. D. 12 ngày.

Câu 14. Để thuận tiện rút thuốc từ lọ thuốc kín, y tá thường sử dụng ống tiêm để bơm một lượng nhỏ khí vào lọ thuốc. Như hình vẽ, một chai thuốc có thể tích 0,9 ml và chứa 0,5 ml thuốc, áp suất của khí trong lọ là 10^5 Pa. Một lượng khí trong ống tiêm có tiết diện $0,3 \text{ cm}^2$, dài 0,4 cm và áp suất 10^5 Pa được y tá bơm vào lọ thuốc. Biết nhiệt độ bên trong và bên ngoài lọ thuốc bằng nhau và không thay đổi. Áp suất của lượng khí mới trong lọ thuốc là



A. $7,7 \cdot 10^4$ Pa. B. $1,3 \cdot 10^5$ Pa.
C. $7,5 \cdot 10^4$ Pa. D. $1,5 \cdot 10^5$ Pa.

Câu 15. Áp suất lốp là một thông số quan trọng phải lưu tâm để lái xe an toàn. Thể tích lốp của một ô tô là 25 lít và phạm vi áp suất lốp an toàn là từ 2,4 atm đến 3,0 atm. Sau khi ô tô chạy một thời gian, người lái xe thấy áp suất lốp giảm xuống 2,0 atm nên sử dụng máy bơm không khí trên xe có tốc độ bơm là 0,5 lít khí ở áp suất 1,0 atm mỗi giây. Bỏ qua sự thay đổi thể tích lốp và nhiệt độ khí. Khoảng thời gian bơm không khí để đưa áp suất lốp về mức an toàn là

A. từ 120 s đến 150 s. B. từ 60 s đến 75 s.
C. từ 40 s đến 100 s. D. từ 20 s đến 50 s.


Câu 16. Một xilanh tiết diện 20 cm^2 , được đặt nằm ngang, trong ống là một lượng khí nhất định được bao bởi piston có thể trượt không ma sát trong ống. Áp suất khí quyển là 10^5 Pa. Ban đầu, cột khí trong ống dài là 18 cm. Dùng lực đẩy ngang từ từ đẩy piston di chuyển sang trái 3 cm.

Coi nhiệt độ khí không đổi. Lúc này, lực đẩy lên piston có độ lớn là




A. 50 N. B. 20 N. C. 40 N. D. 30 N.

Câu 17. Một piston có khối lượng không đáng kể được giữ trong một xilanh thẳng đứng tiết diện $S = 5 \text{ cm}^2$, dưới piston là một lượng khí lí tưởng có thể tích $6 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$ (hình H1). Tác dụng lực F lên piston để nén khí từ từ (hình H2), nhiệt độ của khí không đổi. Biết áp suất khí quyển là 10^5 Pa và $g = 10 \text{ m/s}^2$. Khi $F = 25 \text{ N}$ thì thể tích khí trong xilanh là



A. $3 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$. B. $5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$.
C. $8 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$. D. $4 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$.


Câu 18. Một lượng khí được chứa trong một xilanh có khối lượng M và một piston có khối lượng m và diện tích S . Không có ma sát và sự rò rỉ khí giữa piston và xilanh. Khi xilanh đặt nằm ngang (hình H1) thì chiều dài của cột không khí là L_0 . Nếu xilanh được treo thẳng đứng (hình H2) thì chiều dài của cột không khí bao nhiêu? Biết áp suất khí quyển là p_0 và nhiệt độ của khí không đổi.



A. $\frac{p_0 S - Mg}{p_0 S} L_0$. B. $\frac{p_0 S}{p_0 S + Mg} L_0$.
C. $\frac{p_0 S}{p_0 S - Mg} L_0$. D. $\frac{p_0 S + Mg}{p_0 S} L_0$.

Câu 19. Một xilanh có khối lượng m và tiết diện S được đặt trên mặt bàn nằm ngang, piston và tay cầm của nó có khối lượng m_0 , dưới piston là một lượng khí lí tưởng. Ban đầu piston đứng yên ở độ cao h tính từ đáy xilanh. Biết áp suất khí

quyển là p_0 . Nâng piston từ từ lên trên, bỏ qua ma sát và sự thay đổi nhiệt độ của khí. Khi piston được nâng lên một đoạn so với ban đầu là bao nhiêu thì xilanh rời khỏi mặt bàn?




- A. $\frac{m_0g + mg}{p_0S - mg}h$. B. $\frac{m_0g + mg}{p_0S - m_0g}h$.
C. $\frac{p_0S - m_0g}{m_0g + mg}h$. D. $\frac{p_0S - mg}{m_0g + mg}h$.

Câu 20. Một xilanh đặt thẳng đứng, dầu hỏa phía trên, chứa cột khí cao 8 cm được bao bởi piston khối lượng 5 kg và diện tích mặt cắt ngang là 50 cm^2 . Áp suất khí quyển là 10^5 Pa và $g = 10 \text{ m/s}^2$. Quay xilanh 180° để dầu hỏa phía dưới (nhiệt độ khí không đổi) thì chiều cao của cột khí là

- A. 6,5 cm. B. 7,3 cm. C. 9,8 cm. D. 8,7 cm.

Câu 21. Một ống thủy tinh thành mỏng một đầu kín và tiết diện đều được đặt thẳng đứng, cột thủy ngân dài 5 cm bịt kín cột không khí dài 30 cm. Người ta quay ống thủy tinh từ từ về vị trí nằm ngang như hình vẽ. Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg. Chiều dài của cột không khí lúc này là



- A. 32 cm. B. 28 cm. C. 35 cm. D. 25 cm.

Câu 22. Một ống thủy tinh thành mỏng một đầu kín và có tiết diện đều được đặt thẳng đứng, dầu hỏa phía trên, cột thủy ngân dài 20 cm bịt kín cột không khí dài 49 cm. Biết áp suất khí quyển là 76 cmHg. Người ta quay ngược ống thủy tinh để dầu hỏa phía dưới. Chiều dài của cột không khí lúc này là

- A. 84 cm. B. 29 cm. C. 54 cm. D. 36 cm.

Câu 23. Một ống thủy tinh một đầu kín, tiết diện đều, một đoạn cột không khí được bịt bởi cột thủy ngân dài 20 cm. Khi đặt ống nằm ngang thì cột không khí dài 17 cm. Khi ống nghiêng 30° so với phương ngang với dầu hỏa hướng lên thì cột

không khí dài 15 cm. Biết nhiệt độ của khí không đổi. Áp suất của khí quyển là

- A. 72 cmHg. B. 78 cmHg.
C. 81 cmHg. D. 75 cmHg.


Câu 24. Một ống thủy tinh một đầu kín, tiết diện đều, đặt thẳng đứng với dầu hỏa hướng xuống thì cột không khí có chiều dài L được bịt bởi cột thủy ngân có chiều dài h (cm). Biết áp suất khí quyển là p_0 (cmHg). Nếu nghiêng ống thủy tinh sao cho ống tạo một góc α với phương thẳng đứng và dầu hỏa phía dưới thì chiều dài của cột không khí trong ống là

- A. $\frac{p_0 - h}{p_0 - h \cos \alpha}L$. B. $\frac{p_0 - h}{p_0 - h \sin \alpha}L$.
C. $\frac{p_0 + h}{p_0 - h \cos \alpha}L$. D. $\frac{p_0 + h}{p_0 - h \sin \alpha}L$.

Câu 25. Một ống thủy tinh có chiều dài rất nhỏ so với độ sâu của bể nước, được ấn theo phương thẳng đứng (dầu hỏa ở dưới) từ trên mặt nước xuống đáy bể nước. Khi nhấc ống lên khỏi mặt nước thì thấy $\frac{2}{3}$ chiều dài thành trong đã bị ngâm nước. Lấy $p_a = 10^5 \text{ Pa}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$. Coi nhiệt độ khí trong ống không đổi. Độ sâu của nước ước tính là

- A. 20 m. B. 40 m. C. 60 m. D. 30 m.

Câu 26. Một ống thủy tinh một đầu kín tiết diện đều được cắm thẳng đứng vào một chậu thủy ngân sâu và rộng. Cột không khí trong ống lúc đầu dài 10 cm. Bề mặt thủy ngân trong ống cao hơn bề mặt thủy ngân bên ngoài ống một đoạn 70 cm. Áp suất khí quyển là 76 cmHg. Ấn từ từ ống xuống dưới theo phương thẳng đứng sao cho bề mặt thủy ngân trong ống cao hơn bề mặt thủy ngân ngoài ống một đoạn 64 cm. Lúc này, chiều dài cột không khí trong ống là



- A. 15 cm. B. 8 cm. C. 11 cm. D. 5 cm.

Câu 27. Một ống thủy tinh tiết diện đều, dài 1 m, có một đầu kín và một đầu hở. Giữ ống thẳng đứng (dầu hỏa phía dưới) rồi cắm từ từ xuống một chậu thủy ngân đến khi ống chìm trong thủy ngân 25 cm thì dừng lại. Biết áp suất khí quyển là 75

cmHg và nhiệt độ khí trong ống không đổi. Cột thủy ngân đi vào ống có chiều cao là

- A. 11,6 cm. B. 12,5 cm.
C. 13,4 cm. D. 14,8 cm.

Câu 28. Một ống thủy tinh thẳng tiết diện đều hở cả hai đầu, được cắm thẳng đứng vào một bình


thủy ngân sao cho một đầu cao hơn bề mặt thủy ngân 8 cm. Áp suất khí quyển là 76 cmHg. Dùng ngón tay bịt kín đầu trên của ống rồi nâng ống thẳng đứng đi lên 46 cm. Khi đó, chiều dài cột không khí trong ống là bao nhiêu? (coi nhiệt độ cột khí trong ống không đổi).

- A. 16 cm. B. 8 cm. C. 12 cm. D. 6 cm.


Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.

Như hình vẽ, đường cong (1) và (2) là các đường đẳng nhiệt biểu diễn liên hệ giữa áp suất p và thể tích V của một lượng khí xác định ở nhiệt độ T_1 và T_2 tương ứng.




Câu 2. Như hình vẽ, đường cong (1) và (2) là các đường đẳng nhiệt biểu diễn liên hệ giữa áp suất p và thể tích V của một lượng khí xác định ở nhiệt độ T_1 và T_2 tương ứng.



- a) $p_1 < p_2$. b) $V_1 < V_2$. c) $T_1 < T_2$. d) $p_1 V_1 < p_2 V_2$.


Câu 3. Như hình H1, một ống hình chữ U nhỏ, tiết diện đều có chiều dài mỗi nhánh là 50 cm, chiều dài phần nằm ngang là 85 cm, nhánh trái để hở và nhánh phải kín. Chiều cao của cột thủy ngân mỗi nhánh đều là 10 cm. Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg. Xoay ống một góc 90° trong mặt phẳng thẳng đứng sao cho đầu hở ở trên, đầu kín dưới, hai nhánh đều nằm ngang như hình H2. Coi nhiệt độ trong cột khí kín không đổi.



- a) Ở hình H1, cột khí kín dài 40 cm.
b) Ở hình H1, áp suất trong cột khí kín là 85 cmHg.
c) Ở hình H2, cột khí kín dài 25 cm.
d) Ở hình H2, áp suất trong cột khí kín là 150 cmHg.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1. Như hình vẽ, một ống thủy tinh hình chữ U tiết diện đều có một đầu kín và một đầu hở. Bề mặt thủy ngân ở hai nhánh ngang nhau và chiều dài cột khí trong nhánh kín là $L_0 = 30$ cm. Áp suất khí quyển là 75 cmHg. Nếu đổ thủy ngân vào đầu hở sao cho chiều dài cột khí ở nhánh kín là 25 cm. Khi đó, chiều dài cột thủy ngân được đổ vào ống là bao nhiêu?



Câu 2. Một ống thủy tinh thẳng tiết diện đều hở cả hai đầu, được cắm thẳng đứng vào một bình thủy ngân sao cho một đầu cao hơn bề mặt thủy ngân 27 cm. Dùng ngón tay bịt kín đầu trên của ống rồi hạ ống thẳng đứng đi xuống 8 cm. Coi nhiệt độ khí trong ống không đổi. Áp suất khí quyển là 75 cmHg. Độ cao chênh lệch giữa bề mặt thủy ngân bên trong và bên ngoài ống là bao nhiêu?