


PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Câu 1: Trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm benzene và aniline. Biết nhiệt độ sôi của benzene và aniline lần lượt là 80,1 và 184,1°C

Câu 2: Mật ong để lâu thường thấy những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai. Đó là hiện tượng gì?

Câu 3: Hình bên mô phỏng thiết bị dùng để chưng cất tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Biết rằng tinh dầu có khối lượng riêng nhỏ hơn 1 g/mL.



a. Tinh dầu nằm ở phần nào? (A hay B)

b. Phương pháp để tách riêng A và B ra khỏi nhau được gọi là phương pháp gì?

Câu 4: Hãy cho biết bản chất các cách làm sau đây thuộc loại phương pháp tách biệt và tinh chế nào?


a. Giã lá cây chàem, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải.

b. Nấu rượu uống

c. Ngâm rượu thuốc

d. Làm đường cát, đường phèn từ mía

Câu 5: Quan sát mô phỏng thí nghiệm sắc kí cột sau



- Chất nào bị hấp phụ mạnh nhất, chất nào bị hấp phụ kém nhất?
- Chất nào hòa tan tốt hơn trong dung môi