

# Решения олимпиадных задач по физике с сайта *math us!*

И. И. Кравченко  
<https://physfor.github.io/>

Набросанные решения задач по физике из листков **Игоря Яковлева**.  
Группировка решений в соответствии с компоновкой основных тематических листков [1] на сайте указанного автора (от механики до квантов).

Самая актуальная версия этого документа должна быть доступна на  
[https://physfor.github.io/pfe/mu\\_sol.pdf](https://physfor.github.io/pfe/mu_sol.pdf).

## Содержание

<b>Предисловие</b>	<b>2</b>
<b>1 Механика</b>	<b>3</b>
1.1 Равномерное движение . . . . .	3

## Предисловие

Решения следуют простоте и естественности в выкладках и рассуждениях. Теоретическая база решений — статьи журнала «Квант» (см. подборку [2] от И. В. Яковлева).

# 1 Механика

## 1.1 Равномерное движение

Листок этой темы → <https://mathus.ru/phys/ravnomer.pdf>.

1. (Всеросс., 2015, ШЭ, 7–9) Школьники Вася и Петя играли в салочки. Вася вероломно подкрался к стоящему Пете и сделал его ведущим, после чего Вася сразу же побежал со скоростью 5 м/с. Петя 2 секунды думал, что же случилось, а потом пустился в погоню со скоростью 7,5 м/с. Через сколько секунд после своего старта Петя догнал Васю?

4 с

Решение. Координата Васи в момент встречи равна:

$$x_1 = x_0 + v_1 t,$$

где  $x_0 = v_1 \Delta t$  — расстояние, на которое Вася успел отбежать.

Координата Пети к моменту встречи:

$$x_2 = v_2 t.$$


При встрече  $x_1 = x_2$ , так что

$$v_1 \Delta t + v_1 t = v_2 t \Rightarrow t = 4 \text{ с.}$$

2. (Всеросс., 2018, ШЭ, 9) Саша, Коля и Дима приняли участие в соревнованиях по бегу на дистанцию  $L = 200$  м. На старте друзья располагались на соседних дорожках. Саша, стартовавший на первой дорожке, финишировал первым через  $t = 40$  с, а Дима на третьей дорожке отстал от победителя на  $\Delta t = 10$  с. Определите скорость Коли на второй дорожке, если известно, что в момент финиша Саши все три бегуна располагались на одной прямой. Скорости бега спортсменов можно считать постоянными на всей дистанции, а беговую дорожку прямой.

$$v = \frac{L}{2} \left( \frac{1}{t} + \frac{1}{t + \Delta t} \right) = 4,5 \text{ м/с}$$

Решение. Ясно, что к моменту финиша Саши тела располагались схематически так, как показано ниже.




Скорость Саши  $v_S = L/t = 5$  м/с. Скорость Димы  $v_D = L/(t + \Delta t) = 4$  м/с.

Видно что к моменту финиша Саши Дима «не дошел»  $v_D \Delta t = 40$  м. Тогда также видно из рисунка, что Коля «не дошел» половину этого расстояния, то есть 20 м.

Значит, Коля преодолел 180 м за 40 с; следовательно, его скорость  $v_K = 180/40 = 4,5$  м/с.

**3.** (Всеросс., 2020, ШЭ, 10) Двое туристов выходят с турбазы в разные моменты времени и идут по одной прямой дороге с постоянными скоростями (но каждый — со своей скоростью). На рисунке показаны графики зависимостей их координат  $x$  (ось  $OX$  направлена вдоль дороги) от времени  $t$ . Турбаза находится в начале координат.



1. Чему равна скорость туриста, который идёт быстрее? Ответ укажите в км/ч, округлив до целого числа.
2. Чему равна скорость туриста, который идёт медленнее? Ответ укажите в км/ч, округлив до целого числа.
3. На каком расстоянии от турбазы туристы встретятся? Ответ укажите в км, округлив до целого числа.

1) 6; 2) 3; 3) 24

*Решение.* Пойдем по пунктам:

1. Быстрее идет тот турист, координата которого растет вверх «круче»: подходит серый график (правый), скорость его роста 6 км/ч.

2. Соответственно, скорость роста другого графика — 3 км/ч — скорость более медленного туриста.
3. Формулы координат туристов к моменту встречи (в км и ч):

$$x_1 = 3t \quad \text{и} \quad x_2 = 6(t - 4),$$

откуда время встречи при равенстве  $x_1 = x_2$  найдется из уравнения

$$3t = 6(t - 4) \quad \Rightarrow \quad t = 8 \text{ ч.}$$

Координата встречи дается подстановкой этого  $t$  в любое из уравнений координат:  $x_1 = 3 \cdot 8 = 24$  км.

**4.** (*Всеросс., 2010, РЭ, 9*) От пристани «Дубки» экспериментатор Глюк отправился в путешествие по реке на плоту. Ровно через час он причалил к пристани «Грибки», где обнаружил, что забыл свой рюкзак на пристани в «Дубках».

К счастью, Глюк увидел на берегу своего друга — теоретика Бага, у которого была моторная лодка. На ней друзья поплыли обратно, забрали рюкзак и вернулись в «Грибки».

Сколько времени плыла моторная лодка против течения, если всё плавание заняло 32 минуты?

Мотор лодки в течение всего плавания работал на полную мощность, а время, которое потребовалось на подбор рюкзака, пренебрежимо мало.

20 минут
----------

*Решение.* На плоту между пристанями пройдено относительно планеты расстояние

$$S = vt,$$

где  $t = 1$  час.

На моторке в той же системе *против течения* пройдено

$$S = (V - v)t_{\text{пр}}.$$

На моторке в той же системе *по течению* пройдено

$$S = (V + v)t_{\text{по}}.$$

И по условию:

$$T = t_{\text{пр}} + t_{\text{по}},$$

где  $T = 32$  мин.

Четыре этих уравнения надо решать совместно, чтобы найти  $t_{\text{пр}}$  (хотя количество неизвестных превышает количество уравнений на 1, система все равно решается — что-то сокращается).

Олимпиадность задачи в том, что нахождение  $t_{\text{пр}}$  в общем виде получается громоздким; если хотя бы использовать прямо указанное значение  $t = 1$  час в этой системе (все времена полагать в часах), то все становится гораздо легче (подстановку  $T = 32/60$  час уже сделать в самом конце для получения численного ответа)!

**5.** (Всеросс., 2012, РЭ, 9) Чебурашка и Крокодил Гена решили устроить забег по лестнице в доме Дружбы. Выяснилось, что Чебурашка успевает три раза добежать до четвёртого этажа и вернуться на первый этаж за время, пока Гена поднимается на шестнадцатый этаж.

На какой этаж успеет подняться Чебурашка, пока Гена будет бегать с первого этажа на шестой и обратно? Считайте, что Чебурашка и Гена бегают вверх-вниз с постоянными скоростями.

На 13-й

*Решение.* Первому случаю отвечает равенство

$$\frac{3 \cdot 6S}{v} = \frac{15S}{V},$$

где  $S$  — расстояние между этажами,  $v$  и  $V$  — скорости Чебы и Гены.

Случаю из вопроса задачи отвечает равенство

$$\frac{10S}{V} = \frac{X}{v}$$


Решение этой системы дает  $X = 12S$ , что означает, что Чеба дошел до 13 этажа. Олимпиадность — составить два уравнения максимально просто, чтобы не запутаться в их совместном решении.

**6.** (Всеросс., 2006, ОЭ, 9) Экспериментатор Глюк наблюдал с безопасного расстояния за движением грозовой тучи. Увидев первую молнию, он засёк время и обнаружил, что услышал гром от неё только через  $t_1 = 20$  с. Через  $\tau_1 = 3$  мин после первой вспышки произошла вторая, а гром грянул с опозданием на  $t_2 = 5$  с. Подождав ещё  $\tau_2 = 4$  мин после второй вспышки, Глюк увидел, как сверкнула последняя молния, и услышал звук грома от неё через  $t_3 = 20$  с. Предполагая, что туча двигалась с постоянной скоростью, определите скорость  $v$  её движения и минимальное расстояние  $h$  от Глюка за время наблюдения. Скорость звука в воздухе  $u \approx 330$  м/с, скорость света  $c = 3 \cdot 10^8$  м/с.

$$v = u \sqrt{\frac{t_1^2 - t_2^2}{\tau_1 \tau_2}} \approx 32 \text{ м/с}; h = u \sqrt{t_1^2 - \frac{(t_1^2 - t_2^2)(\tau_1 + \tau_2)^2}{4\tau_1 \tau_2}} \approx 1,4 \text{ км}$$


(учтено, что  $t_3 = t_1$ )

*Решение.* Видно, что туча находилась на одинаковых расстояниях на первой и третьей вспышках, тогда схематически ситуация изображается нижеследующим рисунком.




Туча двигалась из точки 1 в точку 3 через т. 2. Точка 2 ближе к т. 1, так как учтено, что между второй и третьей вспышками времени прошло больше, чем между 1-ой и 2-ой вспышками (участок 2–3 больше участка 1–2). Наблюдатель обозначен Н.

Теперь на этом рисунке обозначим расстояния удобным образом; появятся искомые величины на рисунке.



Тут  $v\tau_2$  — длина участка 2–3!

Задача видится геометрической, поэтому максимально упростим обозначения на рисунке предыдущем с использованием данных (пока забудем  $h$ ).



Тут скорость тучи — неизвестная, которую измеряем в [м/мин] для удобства. Запишем уравнения по теореме косинусов для левого и правого треугольников 12Н и 23Н.

$$\begin{cases} \frac{X^2}{16} = 9v^2 + X^2 - 2 \cdot 3vX \cos \alpha, \\ \frac{X^2}{16} = 16v^2 + X^2 - 2 \cdot 4vX \cos \alpha, \end{cases}$$

где через  $\alpha$  обозначены углы при вершинах 1 и 3 (эти углы равны, так как треугольник 13Н равнобедренный).

Решение этой системы даст  $v$ , но в [м/мин], если  $X$  подсчитывали в метрах! Переводим в метры в секунду, и ответ получается в интервале (30; 31) м/с. (Ответ 32 м/с приводился в официальной методичке ВСОШ).


Ну а  $h$  из наших рисунков по теореме Пифагора равна

$$h = \sqrt{X^2 - \left(\frac{7v}{2}\right)^2},$$

здесь  $v$  также в м/мин для удобства.




7. (Всеросс., 1997, ОЭ, 9) На гладкой горизонтальной поверхности, ограниченной вертикальными стенками, образующими равнобедренный треугольник  $ABC$  ( $AB = BC = L$ ,  $\angle ABC \ll 1$ ), у середины стенки  $AC$  находится маленькая шайба (рис.). Шайбе сообщают скорость  $\vec{v}$ , направленную под углом  $\alpha$  к  $AC$ . Оцените время между последовательными ударами шайбы о стенку  $AC$ . Удары шайбы о стенки считайте абсолютно упругими.



$$\tau = \frac{2L \sin \alpha}{v}$$

*Решение.* Можно начать анализировать движение после первого, второго и т. д. столкновений, но выглядеть это будет сложно. Столкновения рассматривать очень неудобно. Но если понять, что после столкновения тело движется по прямой, являющейся зеркальным отражением мнимого продолжения, по которому двигалось бы тело в отсутствие стенки, то становится проще.

Можно каждое столкновение представлять как переход в мнимый треугольник, отзеркаленный относительно стенки столкновения!



Эта идея проиллюстрирована вышеприведенным рисунком. Когда тело встретит поперек стоящую стенку, то далее тело начнет идти обратно к стенке  $AC$ .

Так как при отражениях и переходах в мнимый треугольник скорость сохраняется, то возвращение к  $AC$  происходит за двойное время, необходимое для достижения «поперечной» стенки (крайняя верхняя серая стенка на рисунке).

До поперечной стенки по схеме рисунка тело идет по времени  $\frac{L \sin \alpha}{v}$  (учтено, что медиана узкого треугольника  $ABC$  примерно равна длинной стороне  $L$ ). Значит, возвращение в  $AC$  будет через двойное такое время!

8. (МОШ, 2014, 8–11) На берегу реки на расстоянии 10 км друг от друга расположены деревни Липовка и Дёмушкино. В 12:00 от Липовки к Дёмушкино стартовали плот и катер. Доплыв до Дёмушкино, катер развернулся и повернул обратно, встретившись с плотом в 14:00. Плот при этом проплыл 4 км. Постройте графики движения (зависимость расстояния до Липовки от времени) для плота и катера. В какой момент времени катер прибыл в Дёмушкино? Найдите скорость течения реки и скорость катера в стоячей воде, считая эти скорости постоянными.

13:00, 8 км/ч, 2 км/ч

*Решение.* Оптимально, пожалуй, не прям по порядку отвечать на вопросы. Сначала легко найти скорость течения реки.

Скорость реки совпадает со скоростью плота в системе земли (плот просто переносится водой). Плот прошел 4 км за два часа; скорость реки и плота:

$$v = 2 \text{ км/ч.}$$

Далее можно пытаться найти скорость катера из системы уравнений в системе земли, но это — нелегкое занятие. В задачах, где тела переносятся другими телами надо пробовать переходить в подвижную систему, чтобы упростить решение!


Так, перейдем в систему реки. В этой системе происходит все так, как это происходило бы в стоячей воде. Плот неподвижен вначале, а катер, разумеется, удаляется от него пусть со скоростью  $V$  в стоячей воде (это как бы его собственная скорость). Но чтобы опять прийти к плоту в этой системе катеру нужно пройти обратно тот же путь, на который он удалился, с той же скоростью  $V$  (они же как бы в стоячей воде)!

Рассуждения предыдущего абзаца приводят к тому, что время  $t_1$  удаления катера от плота равно времени  $t_2$  приближения катера к плоту:

$$t_1 = t_2.$$

Конечно, в системе земли катер удалялся также пока шел до Дёмушкино. Значит, он прибыл через час в Дёмушкино — то есть в 13:00.

Начнем строить графики в системе земли.



Сначала построили график плота — он удаляется со скоростью реки 2 км/ч. А вот график катера построили из условия равенства времени удаления от плота и приближения к нему (что равносильно равенству времен удаления от Липовки и приближения к ней для катера).

Скорость катера уже найдем по его графику:


$$V + v = \frac{10}{1} \Rightarrow V = 8 \text{ км/ч.}$$

Решению значительно помог переход в подвижную систему отсчета.

**9. (МОШ, 2013, 10)** Школьники Владислав и Ярослав стартовали из деревни Липовка в деревню Дёмушкино: Владислав направился пешком, а Ярослав — спустя  $t_1 = 8$  мин на велосипеде. Добравшись до Дёмушкино, каждый из школьников развернулся и продолжил движение обратно с прежней скоростью. Ярослав прибыл обратно в Липовку на  $t_2 = 32$  мин раньше Владислава. На дистанции школьники встретились два раза, причём обе встречи произошли на одинаковом расстоянии от середины дистанции. Во сколько раз скорость велосипедиста больше скорости пешехода? Сколько времени прошло между встречами?

$$\frac{v_{\text{Я}}}{v_{\text{В}}} = \frac{t_1 + t_2}{t_2 - 3t_1} = 5; \Delta t = \frac{(t_1 + t_2)(t_2 - 3t_1)}{8t_1} = 5 \text{ мин}$$

*Решение.* Строим график качественно, чтобы разобраться.



Расстояние между городами для удобства обозначено  $2x$ . Заданные по условию промежутки времени заменены для краткости на  $c$  и  $4c$ . Штриховой линией выделен уровень  $x$  середины расстояния между городами, на расстоянии  $a$  от которого происходят встречи тел.

На шкале времени удобно выделяется время  $\tau$  — «полное» время красного графика. Время  $\tau$  делится на подвремена:

- $t_1$  — время от начала движения «красного» до первой встречи с «синим»;
- $b$  — время между встречами;
- $t_2$  — время от второй встречи до конца движения «красного».

Сперва удобно выяснить, что получится из связи этих всех времен

$$\tau = t_1 + b + t_2. \quad (1)$$

Заменяем в правой части времени (скорость «синего» —  $v$ , «красного» —  $V$ ):

$$\tau = \frac{x-a}{V} + \frac{2a}{v} + \frac{x+a}{V} = \frac{2x}{V} + \frac{2a}{v},$$

а так как  $\tau = \frac{4x}{V}$  из рисунка, то

$$\frac{2x}{V} = \frac{2a}{v} \Rightarrow \frac{a}{x} = \frac{v}{V} = k;$$

то есть  $k$  — отношение скоростей (тут меньшей к большей).

Пока мы использовали только условие равенства расстояний от мест встреч до середины между городами. У нас практически есть еще два независимых условия: времена, обозначенные  $c$  и  $4c$ .

Составим независимые уравнения, отвечающие указанным оставшимся условиям.

Сначала рассмотрим треугольник, «стоящий» на времени  $c + t_1$  под «синим» графиком (это для условия  $c$ ). Для него можно написать:

$$c + t_1 = \frac{x - a}{v}. \quad (2)$$

А потом можно написать, чему равно полное затраченное время «синего» (сюда войдет условие  $4c$ ):

$$c + \tau + 4c = \frac{4x}{v}, \quad (3)$$

Уравнения (2) и (3) можно решить совместно, делая подстановки по результатам преобразования формулы (1) — а именно,  $\tau = \frac{2x}{V} + \frac{2a}{v}$  и  $\frac{a}{x} = \frac{v}{V} = k$ .

Нужно отметить, что система уравнений решается, если она составлена из *независимых* уравнений. В нашей задаче практически три независимых условия (равенство расстояний от середины до встреч, время  $c$  и время  $4c$ ), которые должны вытекать как раз в три независимых уравнения. Если какие-то из таких уравнений не получены, то решить задачу как раз и не выходит.

## Литература

- [1] И. В. Яковлев. *Материалы по физике*. <https://mathus.ru/phys/index.php>.
- [2] И. В. Яковлев. «Квант». *Материалы по физике. 1970–2016*. <https://mathus.ru/phys/kvartphys.pdf>.