
Passive disks / all measurable galaxies
Observed conditional; counts k/n; Wilson 95% intervals (%)
No data 0/0
0.0% 0/3 [0.0,56.1]
0.0% 0/10 [0.0,27.8]
25.0% 1/4 [4.6,69.9]
0.0% 0/1 [0.0,79.3]
0.0% 0/3 [0.0,56.1]
No data 0/0
0.0% 0/68 [0.0,5.3]
1.1% 3/280 [0.4,3.1]
2.2% 5/226 [0.9,5.1]
2.1% 4/193 [0.8,5.2]
1.7% 2/120 [0.5,5.9]
0.0% 0/47 [0.0,7.6]
2.4% 9/378 [1.3,4.5]
1.6% 23/1446 [1.1,2.4]
1.8% 19/1079 [1.1,2.7]
1.9% 15/777 [1.2,3.2]
1.6% 8/493 [0.8,3.2]
2.7% 6/224 [1.2,5.7]
2.6% 15/567 [1.6,4.3]
1.4% 33/2339 [1.0,2.0]
1.4% 21/1553 [0.9,2.1]
1.3% 16/1214 [0.8,2.1]
0.5% 5/1007 [0.2,1.2]
0.5% 3/587 [0.2,1.5]
6.3% 48/767 [4.8,8.2]
3.2% 111/3424 [2.7,3.9]
1.3% 35/2765 [0.9,1.8]
0.7% 19/2582 [0.5,1.1]
0.0% 1/2119 [0.0,0.3]
0.1% 1/1366 [0.0,0.4]
12–13
11.5–12
11–11.5
10.5–11
10–10.5
9.5–10
log10 (M⋆/M⊙) interval
0–0.5
0.5–1
1–1.5
1.5–2
2–2.5
2.5–3
Source redshift interval
Observed fraction
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
Hatching: denominator <20 or fewer than5 events/non-events. Empty cells are not zero.