



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC  
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT  
DEPARTAMENTO DE FÍSICA – DFIS  
MECÂNICA QUÂNTICA – I

---

**Aluno(a):** Rodrigo Ribamar Silva do Nascimento

**Professor(a):** Bruno Duarte da Silva Moreira

**Capítulo(s) Ref.:** I/II

**Lista de Exercícios:** 001

**Data:** 24/04/2023

**Fase:** LEF102-08U

---

## PRIMEIRA AVALIAÇÃO

**Resumo:**

**Palavras chave:** Equação de Schrödinger; Operadores; Oscilador Harmônico; Potencial Delta.

## Sumário

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Problema 01</b> | <b>1</b>  |
| <b>Problema 02</b> | <b>3</b>  |
| <b>Problema 03</b> | <b>5</b>  |
| <b>Problema 04</b> | <b>8</b>  |
| <b>Problema 05</b> | <b>12</b> |
| <b>Problema 06</b> | <b>15</b> |
| <b>Problema 07</b> | <b>19</b> |
| <b>Problema 08</b> | <b>21</b> |
| <b>Problema 09</b> | <b>21</b> |
| <b>Problema 10</b> | <b>22</b> |

**Problema 1.** Considere a função de onda

$$\Psi(x, t) = Ae^{-\lambda|x|}e^{-i\omega t} \quad (1)$$

onde  $A$ ,  $\lambda$  e  $\omega$  são constantes reais positivas

- Normalize  $\Psi$
- Determine os valores médios  $\langle x \rangle$  e  $\langle x^2 \rangle$
- Encontre o desvio padrão de  $x$ . Esboce o gráfico de  $|\Psi|^2$  como uma função de  $x$ , e marque os pontos  $(\langle x \rangle + \delta)$  e  $(\langle x \rangle - \delta)$  para representar em que sentido de  $\sigma$  representa o “espalhamento” da distribuição em  $x$ . Qual a probabilidade de que a partícula seja encontrada fora deste range?

**Solução 1.** a) Dado que a normalização da função de onda  $\Psi(x, t)$  é obtida por

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)\Psi^*(x, t)|dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (2)$$

de modo que

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |Ae^{-\lambda|x|}e^{-i\omega t}Ae^{-\lambda|x|}e^{+i\omega t}|dx &= 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} A^2e^{-2\lambda|x|}dx &= 1 \end{aligned} \quad (3)$$

a  $\psi(x)$  é uma função par  $\psi(x) = \psi(-x)$  e o intervalo de integração é simétrico em  $x$ , o que nos permite fazer

$$\begin{aligned} 2A^2 \int_0^{+\infty} e^{-2\lambda|x|}dx &= 1 \\ 2A^2 \left( -\frac{1}{2\lambda}e^{-2\lambda x} \Big|_0^{+\infty} \right) &= 1 \\ A^2 &= \lambda \\ A &= \sqrt{\lambda} \end{aligned} \quad (4)$$

ou seja

$$\boxed{\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-i\omega t}, \quad \text{com } \psi(x) = \sqrt{\lambda}e^{-\lambda|x|}}$$

- b) Calculando  $\langle x \rangle$  e  $\langle x^2 \rangle$

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi^*(x, t)x\Psi(x, t)|dx = \int_{-\infty}^{\infty} x|\psi(x)|^2 dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x\lambda e^{-2\lambda x} dx \end{aligned} \quad (5)$$

neste caso a função  $\psi(x)$  é ímpar  $\psi(-x) = -\psi(x)$ , o que num intervalo de integração simétrico com relação a origem, retorna zero, ou seja

$$\boxed{\langle x \rangle = 0} \quad (6)$$

Para  $\langle x^2 \rangle$ , tem-se que

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\psi(x)|^2 dx \\ &= \lambda \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-2\lambda x} dx \end{aligned} \quad (7)$$

$\psi(x)$  é novamente par, então

$$\langle x^2 \rangle = 2\lambda \int_0^{\infty} x^2 e^{-2\lambda x} dx \quad (8)$$

$$(9)$$

usando integração por partes duas vezes, chegamos ao seguinte resultado

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= - \left[ \frac{x^2}{e^{2\lambda x}} \Big|_0^{\infty} + \frac{x}{\lambda e^{2\lambda x}} \Big|_0^{\infty} + \frac{2}{2\lambda e^{2\lambda x}} \Big|_0^{\infty} \right] \Rightarrow \left[ -\frac{\infty}{\infty} \right] \\ &= - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{2\lambda x}} \Rightarrow \left[ -\frac{\infty}{\infty} \right] \\ &\stackrel{H}{=} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2\lambda e^{2\lambda x}} \Rightarrow \left[ -\frac{\infty}{\infty} \right] \\ &\stackrel{H}{=} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{4\lambda^2 e^{2\lambda x}} \Rightarrow [0] \therefore \\ &= - \left[ \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{2}{4\lambda^2 e^{2\lambda x}} \Big|_0^b \right] \\ &= - \left( 0 - \frac{1}{2\lambda^2} \right) \end{aligned} \quad (10)$$

$$\boxed{\langle x^2 \rangle = \frac{1}{2\lambda^2}} \quad (11)$$

c) Calculando  $\sigma$

$$\begin{aligned} \sigma &= \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2\lambda^2} - 0} \\ &= \frac{1}{\lambda\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (12)$$

$$\boxed{\sigma = \frac{\sqrt{2}}{2\lambda}} \quad (13)$$




Figura 1 – Região de probabilidade de encontrar a partícula entre os valores do desvio padrão  $\pm\sigma$

Para valores de  $x \in (-\infty, -\sigma]$  e  $x \in [+ \sigma, +\infty)$ , tem-se que

$$\begin{aligned}
 2\lambda \int_{\sigma}^{\infty} e^{-2\lambda|x|} dx &= 2\lambda \left[ -\frac{1}{2\lambda} e^{-2\lambda x} \right]_{\sigma}^{\infty} \\
 &= 0 + \frac{1}{e^{2\lambda\sigma}} \\
 &= \frac{1}{e^{\sqrt{2}}}
 \end{aligned} \tag{14}$$

## Problema 2. O Teorema de Ehrenfest

a) Mostre que, para uma função de  $x$  qualquer, vale a seguinte relação de comutação:

$$[\hat{p}, f(x)] = -i\hbar \frac{\partial f(x)}{\partial x} \tag{15}$$

b) Utilize o resultado do item (a), o fato que o operador momento comuta com funções apenas do momento e a evolução temporal do valor médio dos operadores

$$\frac{d\langle Q \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{Q}, \hat{H}] \rangle \tag{16}$$

e obtenha o Teorema de Ehrenfest

**Solução 2.** a) Façamos o comutador atuar em uma função  $\psi(x)$ , de modo que

$$\begin{aligned}
 [\hat{p}, f(x)] \psi(x) &= \hat{p}f(x)\psi(x) - f(x)\hat{p}\psi(x) \\
 &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} [f(x)\psi(x)] + i\hbar f(x) \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} \\
 &= (-i\hbar) \left[ \frac{\partial f(x)}{\partial x} \psi(x) + f(x) \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} - f(x) \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} \right] \\
 &= -i\hbar \frac{\partial f(x)}{\partial x} \psi(x)
 \end{aligned} \tag{17}$$

o que resulta em

$$\boxed{[\hat{p}, f(x)] = -i\hbar \frac{\partial f(x)}{\partial x}} \tag{18}$$

□

b) Dado que

$$\begin{aligned}
 \frac{d\langle Q \rangle}{dt} &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{Q}, \hat{H}] \rangle \\
 &= \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* [\hat{Q}, \hat{H}] \psi dx
 \end{aligned} \tag{19}$$

ou seja

$$\begin{aligned}
 \frac{d\langle Q \rangle}{dt} &= \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* (\hat{Q}\hat{H} - \hat{H}\hat{Q}) \psi dx \\
 &= \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \hat{Q}\hat{H}\psi dx - \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \hat{H}\hat{Q}\psi dx \\
 &= \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \hat{Q} \left( \frac{\hat{p}^2}{2m} + V \right) \psi dx - \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \left( \frac{\hat{p}^2}{2m} + V \right) \hat{Q}\psi dx \\
 &= \frac{1}{i\hbar} \left[ \frac{1}{2m} \left( \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \hat{Q}\hat{p}^2 \psi dx - \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \hat{p}^2 \hat{Q}\psi dx \right) + \right. \\
 &\quad \left. + \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \hat{Q}V\psi dx - \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* V\hat{Q}\psi dx \right] \\
 &= \frac{1}{2i\hbar m} \int_{-\infty}^{\infty} (\psi^* \hat{Q}\hat{p}^2 \psi - \psi^* \hat{p}^2 \hat{Q}\psi) dx + \\
 &\quad + \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} (\psi^* \hat{Q}V\psi - \psi^* V\hat{Q}\psi) dx \\
 &= \frac{1}{2i\hbar m} \langle [\hat{Q}, \hat{p}^2] \rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{Q}, V] \rangle
 \end{aligned} \tag{20}$$

Agora, desde que  $\hat{Q}$  possa ser escrito como  $\hat{Q} = \hat{p}$ , devemos ter

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = \frac{1}{2i\hbar m} \langle [\hat{p}, \hat{p}^2] \rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{p}, V] \rangle \tag{21}$$

se o operador  $\hat{p}$  comuta com funções do momento então  $[\hat{p}, \hat{p}^2] = 0$ , além do mais se  $V = V(x)$ , já vimos que

$$[\hat{p}, V(x)] = -i\hbar \frac{\partial V(x)}{\partial x} \quad (22)$$

e portanto,


$$\begin{aligned} \frac{d\langle p \rangle}{dt} &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{p}, V] \rangle \\ \frac{d\langle p \rangle}{dt} &= \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle \end{aligned} \quad (23)$$

$$\boxed{\frac{d\langle p \rangle}{dt} = -\langle \nabla V \rangle} \quad (24)$$

□

**Problema 3.** Em aula resolvemos o problema do poço infinito com centro deslocado da origem. Resolva o poço infinito para o caso onde o centro do poço coincide com a origem, isto é:

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & \text{se } x < -a/2 \\ 0, & \text{se } -a/2 \leq x \leq a/2 \\ \infty, & \text{se } x > a/2 \end{cases}$$



Para este problema encontre as autofunções  $\psi_n(x)$  e os autovalores de energia  $E_n$ .

**Solução 3.** A equação de Schrödinger para pontos no interior do poço é dada por

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} = E\psi(x) \quad (25)$$

manipulando a equação (25) obtemos

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} &= -\frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) \\ \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} &= -k^2 \psi(x)\end{aligned}\tag{26}$$

cujo a solução geral é dada por

$$\psi(x)A \sin(kx) + B \cos(kx), \quad \text{com } k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

da condição de contorno sabemos que

$$\psi(a/2) = A \sin(ka/2) + B \cos(ka/2) = 0 \tag{27a}$$

$$\psi(-a/2) = A \sin(-ka/2) + B \cos(-ka/2) = 0 \tag{27b}$$

O par de equações descrito pelas (27a) e (27b), formam um sistema de equações. A função *seno* é uma função *ímpar* o que equivale a dizer que  $\sin(-x) = -\sin(x)$ , já a função *coseno* é uma função *par* isto é  $\cos(-x) = \cos(x)$ , logo

$$\begin{aligned}A \sin(ka/2) + B \cos(ka/2) &= 0 \\ -A \sin(ka/2) + B \cos(ka/2) &= 0\end{aligned}\tag{28}$$

resolvendo o sistema para o *coseno*, obtemos

$$2B \cos(ka/2) = 0 \tag{29}$$

$B$  não pode ser nulo, do contrário não há função de onda no intervalo de interesse, portanto

$$\cos\left(\frac{ka}{2}\right) = 0 \iff \frac{ka}{2} = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots \tag{30}$$

por outro lado, se resolvermos o sistema para o *seno*, teremos

$$2A \sin(ka/2) = 0 \tag{31}$$

tal como anteriormente  $A$  é não nulo de modo que

$$\sin\left(\frac{ka}{2}\right) = 0 \iff \frac{ka}{2} = \pi, 2\pi, 3\pi, \dots \tag{32}$$

Há portanto duas soluções possíveis para a  $\psi(x)$

$$\psi_n(x) = \begin{cases} A_n \sin(k_n x) & \text{se, } n = 2, 4, 6, \dots (\text{par}) \\ B_n \cos(k_n x) & \text{se, } n = 1, 3, 5, \dots (\text{ímpar}) \end{cases} \tag{33}$$

e

$$k_n = \frac{n\pi}{a} \tag{34}$$

As constantes  $A_n$  e  $B_n$  são obtidas impondo a condição de normalização das funções  $\psi(x)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n^*(x)\psi_n(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n(x)|^2 dx = 1 \quad (35)$$

$$(36)$$

para  $n = 2, 4, 6, \dots$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{-\frac{a}{2}} |\psi_n(x)|^2 dx + \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} |\psi_n(x)|^2 dx + \int_{\frac{a}{2}}^{\infty} |\psi_n(x)|^2 dx &= 1 \\ \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} A_n^2 \sin^2 \left( \frac{n\pi x}{a} \right) dx &= 1 \\ A_n^2 \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \sin^2 \left( \frac{n\pi x}{a} \right) dx &= 1 \end{aligned} \quad (37)$$

fazendo a mudança de variável  $u = n\pi x/2$ ,  $du = n\pi dx/2$ , quando  $x = -\pi/2$  então  $u = -n\pi/2$ , e quando  $x = \pi/2$ ,  $u = n\pi/2$ , dessa forma o resultado da integral acima fica

$$A_n^2 \left[ \frac{a}{n\pi} \right] \left[ \left( \frac{n\pi}{2} \right) - \frac{1}{2} \left( \frac{\sin(2u)}{2} \right) \right]_{-n\pi/2}^{n\pi/2} = 1 \quad (38)$$

o que simplificando da

$$A_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad (39)$$

A solução para  $n = 1, 3, 5, \dots$  é similar, mas agora a função que devemos integrar é

$$B_n^2 \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \cos^2 \left( \frac{n\pi x}{a} \right) dx = 1 \quad (40)$$

procedendo de forma análoga obtemos

$$B_n^2 \left[ \frac{a}{n\pi} \right] \left[ \left( \frac{n\pi}{2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{\sin(2u)}{2} \right) \right]_{-n\pi/2}^{n\pi/2} = 1 \quad (41)$$

ou seja

$$B_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad (42)$$



completando a solução para as autofunções  $\psi_n(x)$

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) & \text{se, } n = 2, 4, 6, \dots (\text{par}) \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right) & \text{se, } n = 1, 3, 5, \dots (\text{ímpar}) \end{cases} \quad (43)$$

e

$$k_n = \frac{n\pi}{a} \quad (44)$$

É de se esperar que os autovalores de energia associados  $E_n$ , sejam os mesmos encontrados para o poço infinito com centro deslocado da origem, e de fato, em termos dos  $k_n$ , teremos

$$k_n = \frac{n\pi}{a} = \sqrt{\frac{2mE_n}{\hbar^2}} \quad (45)$$

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad (46)$$

**Problema 4.** Para o problema do poço quadrado infinito calculado em aula (poço assimétrico em torno da origem), calcule  $\langle x \rangle$ ,  $\langle x^2 \rangle$ ,  $\langle p \rangle$  e  $\langle p^2 \rangle$  e use-os para calcular as incertezas  $\sigma_x$  e  $\sigma_p$  para o  $n$ -ésimo estado estacionário do poço infinito. Mostre que o princípio de incerteza está sendo satisfeito. qual estado  $n$  fica mais próximo do limite inferior do princípio de incerteza?

**Solução 4.** A solução da parte espacial da função de onda encontrada em aula é a seguinte

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad \text{com } n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leq x \leq a$$

logo, teremos

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \int_0^a \psi^* x \psi dx \\ &= \int_0^a x |\psi|^2 dx \\ &= \int_0^a x \left[ \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \right]^2 dx \\ &= \frac{2}{a} \int_0^a x \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx \end{aligned} \quad (47)$$

fazendo a substituição

$$u = \frac{n\pi x}{a} \quad (48a)$$

$$du = \frac{n\pi}{a} dx \quad (48b)$$

e notando que

$$x \rightarrow 0 \implies u \rightarrow 0 \quad (49a)$$

$$x \rightarrow a \implies u \rightarrow n\pi \quad (49b)$$

ajustamos o argumento do *seno* para poder aplicar integração por partes e ficamos com

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \frac{2}{a} \int_0^{n\pi} \left( \frac{a}{n\pi} \right) u \sin^2 u \left( \frac{a}{n\pi} \right) du \\ &= \frac{2}{a} \left( \frac{a}{n\pi} \right)^2 \int_0^{n\pi} u \sin^2 u du \end{aligned}$$

no exercício anterior já mostramos que o resultado da integral de  $\sin^2(x)$ , a menos de uma constante, é igual a

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \left[ x - \frac{1}{2} \sin(2x) \right] \quad (50)$$

de modo que, aplicando a integração por partes na integral de interesse, obtemos

$$\begin{aligned} \frac{2a}{n^2\pi^2} \int_0^{n\pi} u \sin^2 u du &= \frac{2a}{n^2\pi^2} \left\{ \frac{u}{2} \left[ u - \frac{1}{2} \sin(2u) \right] \Big|_0^{n\pi} \right\} - \frac{2a}{n^2\pi^2} \frac{1}{2} \int_0^{n\pi} \left[ u - \frac{1}{2} \sin(2u) \right] du \\ &= \frac{2a}{n^2\pi^2} \left[ \frac{u^2}{2} - \frac{u}{4} \sin(2u) \right] \Big|_0^{n\pi} - \frac{2a}{n^2\pi^2} \frac{1}{2} \left[ \frac{u^2}{2} + \frac{1}{4} \cos(2u) \right] \Big|_0^{n\pi} \\ &= \frac{2a}{n^2\pi^2} \left[ \frac{n^2\pi^2}{2} - \frac{n\pi}{4} \sin(2n\pi) - \frac{n^2\pi^2}{4} - \frac{1}{8} \cos(2n\pi) + \frac{1}{8} \right] = \langle x \rangle \end{aligned} \quad (51)$$

Desde que  $n \in \mathbb{N}^* \implies \sin(2n\pi) = 0$  e  $\cos(2n\pi) = 1$  ou seja

$$\langle x \rangle = \frac{2a}{n^2\pi^2} \left[ \frac{n^2\pi^2}{2} - \frac{n^2\pi^2}{4} \right] = \frac{2a}{n^2\pi^2} \left( \frac{n^2\pi^2}{4} \right) \therefore \quad (52)$$

$$\boxed{\langle x \rangle = \frac{a}{2}} \quad (53)$$

procedendo de forma análoga para  $\langle x^2 \rangle$

$$\begin{aligned}
 \langle x^2 \rangle &= \int_0^a \frac{2}{a} x^2 \sin^2 \left( \frac{n\pi x}{a} \right) dx \\
 &= \frac{2}{a} \int_0^{n\pi} \left( \frac{a}{n\pi} \right)^2 u^2 \sin^2 u \left( \frac{a}{n\pi} \right) du \\
 &= \frac{2}{a} \left( \frac{a}{n\pi} \right)^3 \int_0^{n\pi} u^2 \sin^2 u du \\
 &= \frac{2a^2}{n^3\pi^3} \left[ \frac{u^3}{6} - \frac{u^2}{4} \sin(2u) - \frac{u}{4} \cos(2u) + \frac{1}{8} \sin(2u) \right] \Big|_0^{n\pi} \\
 &= \frac{2a^2}{n^3\pi^3} \left[ \frac{n^3\pi^3}{6} - \frac{n^2\pi^2}{4} \underbrace{\sin(2n\pi)}_0 - \frac{n\pi}{4} \underbrace{\cos(2n\pi)}_1 + \frac{1}{8} \underbrace{\sin(2n\pi)}_0 \right] \\
 &= \frac{2a^2}{n^3\pi^3} \left[ \frac{n^3\pi^3}{6} - \frac{n\pi}{4} \right]
 \end{aligned} \tag{54}$$

portanto,

$$\boxed{\langle x^2 \rangle = \frac{a^2}{3} - \frac{1}{2} \left( \frac{a}{n\pi} \right)^2} \tag{55}$$

Para determinar  $\langle p \rangle$ , uma vez que conhecemos  $\langle x \rangle$ , basta fazermos

$$\langle p \rangle = \frac{d\langle x \rangle}{dt} \tag{56}$$

logo

$$\langle p \rangle = \frac{d}{dt} \left( \frac{a}{2} \right) \tag{57}$$

ou simplesmente

$$\boxed{\langle p \rangle = 0} \tag{58}$$

Porém para determinar  $\langle p^2 \rangle$ , precisaremos da equação de Schrödinger escrita para o problema. Notando que a partícula somente pode existir no interior do poço infinito onde a função de onda  $\psi(x)$  é diferente de zero, e que nesta região a partícula é livre ( $V = 0$ )

$$\begin{aligned}
 \hat{H}\psi &= E\psi \\
 -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_n(x)}{dx^2} &= E_n\psi_n(x) \\
 \frac{d^2\psi_n(x)}{dx^2} &= -\frac{2mE_n}{\hbar^2} \psi_n(x)
 \end{aligned} \tag{59}$$

atento a isto, segue que

$$\begin{aligned}
 \langle p^2 \rangle &= \int_0^a \psi_n^*(x) \left( -i\hbar \frac{d}{dx} \right)^2 \psi_n(x) dx \\
 &= -\hbar^2 \int_a^b \psi^*(x) \frac{d^2 \psi_n(x)}{dx^2} dx \\
 &= \hbar^2 \frac{2mE_n}{\hbar^2} \int_0^a \psi_n^*(x) \psi_n(x) dx
 \end{aligned} \tag{60}$$

usando a condição de normalização das funções  $\psi_n(x)$

$$\langle p^2 \rangle = 2mE_n \tag{61}$$

em sala de aula, encontramos para o valor de energia

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \tag{62}$$

então

$$\boxed{\langle p^2 \rangle = \left( \frac{n\pi\hbar}{a} \right)^2} \tag{63}$$

Para o n-ésimo estado estacionário a incerteza na posição é dada por

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \tag{64}$$

portanto

$$\begin{aligned}
 \sigma_x &= \sqrt{\left[ \frac{a^2}{3} - \frac{1}{2} \left( \frac{a}{n\pi} \right)^2 \right] - \frac{a^2}{4}} \\
 &= \sqrt{\frac{a^2}{12} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2}}
 \end{aligned} \tag{65}$$

$$\boxed{\sigma_x = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{1}{3} - \frac{2}{n^2\pi^2}}} \tag{66}$$

e para o momento teremos

$$\begin{aligned}
 \sigma_p &= \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2} \\
 &= \sqrt{\left( \frac{n\pi\hbar}{a} \right)^2}
 \end{aligned} \tag{67}$$

$$\boxed{\sigma_p = \frac{n\pi\hbar}{a}} \tag{68}$$

Segundo o princípio de incerteza, não é possível obter simultaneamente com precisão o valor de duas variáveis conjugadas, matematicamente isso é expresso por

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (69)$$

se isso for verdade, então, para o caso em questão teremos

$$\begin{aligned} \sigma_x \sigma_p &= \left( \frac{n\pi\hbar}{a} \right) \frac{a}{2} \sqrt{\frac{1}{3} - \frac{2}{n^2\pi^2}} \\ &= \frac{n\pi\hbar}{2} \sqrt{\frac{1}{3} - \frac{2}{n^2\pi^2}} \end{aligned} \quad (70)$$

usando o princípio de incerteza


$$\begin{aligned} \sigma_x \sigma_x &\geq \frac{\hbar}{2} \\ \frac{n\pi\hbar}{2} \sqrt{\frac{1}{3} - \frac{2}{n^2\pi^2}} &\geq \frac{\hbar}{2} \\ n^2\pi^2 \left( \frac{1}{3} - \frac{2}{n^2\pi^2} \right) &\geq 1 \\ \frac{n^2\pi^2}{3} - 2 &\geq 1 \\ \frac{n^2\pi^2}{3} &\geq 3 \\ n &\geq \frac{3}{\pi} \end{aligned} \quad (71)$$

como  $n \in \mathbb{N}^*$  a desigualdade acima é sempre verdade, o que de fato satisfaz o princípio de incerteza. O produto  $\sigma_x \sigma_p$  é proporcional a constante reduzida de planck  $\hbar$ , no intervalo avaliado o menor valor possível de  $n$  é  $n = 1$  o que consequentemente é também o valor mais próximo do limite inferior de incerteza.

**Problema 5.** Uma partícula num poço quadrado infinito tem como função de onda inicial

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} Ax, & \text{se } 0 \leq x \leq \frac{a}{2} \\ A(a - x), & \text{se } \frac{a}{2} \leq x \leq a \end{cases}$$

- Esboce o gráfico de  $\Psi(x, 0)$  e determine a constante de normalização  $A$
- Encontre  $\Psi(x, t)$
- Qual é a probabilidade de que uma medida da energia retorne o valor  $E_1$
- Encontre o valor médio da energia

Figura 2 – Gráfico da  $\Psi(x, 0)$ 

**Solução 5.** a) A função  $\Psi(x, 0) \times x$  encontra-se plotada na Figura 2

Normalizando a  $\Psi(x, 0)$  no intervalo indicado:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \Psi dx &= \int_0^{a/2} |Ax|^2 dx + \int_{a/2}^a |A(a-x)|^2 dx = 1 \\
 &= A^2 \left[ \frac{x^3}{3} \Big|_0^{a/2} + \left( a^2 x - 2a \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{a/2}^a \right] = 1 \\
 &= A^2 \left[ \frac{a^3}{24} + \frac{a^3}{2} - \frac{3a^3}{4} + \frac{7a^3}{24} \right] = 1 \\
 &= A^2 \left[ \frac{8a^3 + 12a^3 - 18a^3}{24} \right] = 1 \\
 &= A^2 \left[ \frac{a^3}{12} \right] = 1 \implies \boxed{A = 2\sqrt{\frac{3}{a^3}}}
 \end{aligned} \tag{72}$$

b) Uma vez que

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-Et/\hbar}, \quad \text{com } c_n = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^*(x) \Psi(x, 0) dx$$

e

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad \text{com } n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Determinando  $c_n$  no intervalo  $x \in [0, a]$ :

$$\begin{aligned}
 c_n &= \sqrt{\frac{2}{a}} \left[ \int_0^{a/2} Ax \operatorname{sen} \left( \frac{n\pi x}{a} \right) dx + \int_{a/2}^a A(a-x) \operatorname{sen} \left( \frac{n\pi x}{a} \right) dx \right] \\
 &= A\sqrt{\frac{2}{a}} \left[ \left( \frac{a}{n\pi} \right)^2 \int_0^{n\pi/2} u \operatorname{sen}(u) du + a \left( \frac{a}{n\pi} \right) \int_{n\pi/2}^{n\pi} \operatorname{sen}(u) du + \right. \\
 &\quad \left. - \left( \frac{a}{n\pi} \right)^2 \int_{n\pi/2}^{n\pi} u \operatorname{sen}(u) du \right] \\
 &= A\sqrt{\frac{2}{a}} \left[ \frac{a^2}{n^2\pi^2} \left( \int_0^{n\pi/2} u \operatorname{sen}(u) du - \int_{n\pi/2}^{n\pi} u \operatorname{sen}(u) du \right) + \right. \\
 &\quad \left. + \frac{a^2}{n\pi} \int_{n\pi/2}^{n\pi} \operatorname{sen}(u) du \right] \\
 &= A\sqrt{\frac{2}{a}} \left[ \frac{a^2}{n^2\pi^2} \left( \underbrace{-u \cos(u) \Big|_0^{n\pi/2}}_0 + \underbrace{\operatorname{sen}(u) \Big|_0^{n\pi/2}}_{\operatorname{sen}(\frac{n\pi}{2})} + \underbrace{u \cos(u) \Big|_{n\pi/2}^{n\pi}}_{n\pi \cos(n\pi)} + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - \underbrace{\operatorname{sen}(u) \Big|_{n\pi/2}^{n\pi}}_{-\operatorname{sen}(\frac{n\pi}{2})} \right) - \frac{a^2}{n\pi} \underbrace{\cos(u) \Big|_{n\pi/2}^{n\pi}}_{\cos(n\pi)} \right] \\
 &= A\sqrt{\frac{2}{a}} \left[ \frac{a^2}{n^2\pi^2} \sin \left( \frac{n\pi}{2} \right) + \frac{a^2}{n\pi} \cos(n\pi) + \frac{a^2}{n^2\pi^2} \operatorname{sen} \left( \frac{n\pi}{2} \right) - \frac{a^2}{n\pi} \cos(n\pi) \right] \\
 &= A\sqrt{\frac{2}{a}} \left[ \frac{2a^2}{n^2\pi^2} \operatorname{sen} \left( \frac{n\pi}{2} \right) \right] \\
 &= 2\sqrt{\frac{3}{a^3}} \sqrt{\frac{2}{a}} \left[ \frac{2a^2}{n^2\pi^2} \operatorname{sen} \left( \frac{n\pi}{2} \right) \right] \\
 &= \frac{4\sqrt{6}}{n^2\pi^2} \operatorname{sen} \left( \frac{n\pi}{2} \right)
 \end{aligned} \tag{73}$$

Se  $n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ , então

$$\begin{aligned}
 c_1 &= \frac{4\sqrt{6}}{(1)^2\pi^2}(1) & c_2 &= \frac{4\sqrt{6}}{(2)^2\pi^2}(0) \\
 c_3 &= \frac{4\sqrt{6}}{(3)^2\pi^2}(-1) & c_4 &= \frac{4\sqrt{6}}{(4)^2\pi^2}(0) \\
 c_5 &= \frac{4\sqrt{6}}{(5)^2\pi^2}(1) & c_6 &= \frac{4\sqrt{6}}{(6)^2\pi^2}(0) \\
 c_7 &= \frac{4\sqrt{6}}{(7)^2\pi^2}(-1) & c_8 &= \frac{4\sqrt{6}}{(8)^2\pi^2}(0)
 \end{aligned}$$

ou seja,

$$c_n = \begin{cases} 0, & \text{se } n = 2, 4, 6, 8, \dots \\ \frac{4\sqrt{6}}{\pi^2} \frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n^2}, & \text{se } n = 1, 3, 5, 7, \dots \end{cases} \quad (74)$$

e por fim

$$\Psi(x, t) = \frac{4\sqrt{6}}{\pi^2} \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_{n=1,3,5,\dots} \left[ \frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n^2} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) e^{-E_n t/\hbar} \right] \quad (75)$$

c) A probabilidade de que uma medida retorne o valor de energia  $E_1$  é dada por

$$|c_1|^2 = \left| \frac{4\sqrt{6}}{\pi^2} \right|^2 = \boxed{0,985} \quad (76)$$

d) Para o valor médio de energia  $\langle H \rangle$  tem-se que:

$$\langle H \rangle = \sum_{n=1,3,5,\dots} |c_n|^2 E_n, \quad \text{com } E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

ou seja,

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= \frac{16(6)}{\pi^4} \sum_{n=1,3,5,\dots} \left[ \frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n^2} \right]^2 \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \\ &= \frac{96}{\pi^4} \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{(-1)^{(n-1)} n^2 \pi^2 \hbar^2}{n^4 2ma^2} \\ &= \frac{48\hbar^2}{ma^2 \pi^2} \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{(-1)^{(n-1)}}{n^2} \\ &= \frac{48\hbar^2}{ma^2 \pi^2} \frac{\pi^2}{8} = \boxed{\frac{6\hbar^2}{ma^2}} \end{aligned} \quad (77)$$

**Problema 6.** Para um oscilador harmônico, pelo método algébrico:

a) Mostre que

$$[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1 \quad (78)$$

b) Utilizando a equação

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}_+)^n \psi_0 \quad (79)$$

e a expressão do operador  $\hat{a}^+$  em termos da derivada em relação à posição, construa  $\psi_2(x)$ .



- c) Escreva os operadores posição e momento em termos dos operadores escada  $\hat{a}_{\pm}$  e calcule os valores médios de  $x$ ,  $p$ ,  $x^2$  e  $p^2$  para o estado fundamental  $\psi_0(x)$  e verifique se o princípio de incerteza está sendo respeitado.

**Solução 6.** a) *Demonstração.* Partindo-se dos operadores

$$\hat{a}_- = \left( \frac{i\hat{p} + m\omega\hat{x}}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \right) \quad (80a)$$

$$\hat{a}_+ = \left( \frac{-i\hat{p} + m\omega\hat{x}}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \right) \quad (80b)$$

construindo uma expressão para o comutador dos operadores

$$[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = \hat{a}_- \hat{a}_+ - \hat{a}_+ \hat{a}_- \quad (81)$$

mas

$$\begin{aligned} \hat{a}_- \hat{a}_+ &= \frac{1}{2m\omega\hbar} [(i\hat{p} + m\omega\hat{x})(-i\hat{p} + m\omega\hat{x})] \\ &= \frac{1}{2m\omega\hbar} [\hat{p}^2 + im\omega\hat{p}\hat{x} - im\omega\hat{x}\hat{p} + (m\omega\hat{x})^2] \\ &= \frac{1}{2m\hbar\omega} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] - \frac{i}{2\hbar} (\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}) \end{aligned} \quad (82)$$

e analogamente,

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{1}{2m\hbar\omega} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] + \frac{i}{2\hbar} (\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}) \quad (83)$$

reescrevendo em termos do comutador  $[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}$

$$\hat{a}_- \hat{a}_+ = \frac{1}{2m\hbar\omega} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] - \frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] \quad (84a)$$

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{1}{2m\hbar\omega} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] + \frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] \quad (84b)$$

uma vez que

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}]f(x) &= -x\hbar \frac{\partial f(x)}{\partial x} + i\hbar \frac{\partial x}{\partial x} f(x) + i\hbar x \frac{\partial f(x)}{\partial x} \\ &= i\hbar f(x) \end{aligned} \quad (84c)$$

tem-se portanto

$$\begin{aligned} [\hat{a}_-, \hat{a}_+] &= \frac{1}{2m\omega\hbar} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] - \frac{i}{2\hbar} i\hbar + \\ &\quad - \frac{1}{2m\omega\hbar} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] - \frac{i}{2\hbar} i\hbar \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \end{aligned} \quad (85)$$

$\therefore$

$$\boxed{[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1}$$

□

b) Se a  $\psi_0(x)$  é dada por

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (86)$$

então, para encontrar a  $\psi_2(x)$  basta computarmos

$$\psi_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2!}}(\hat{a}_+)^2\psi_0, \quad \text{com } \hat{a}_+ = \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\left(-\hbar\frac{d}{dx} + m\omega x\right)$$

logo

$$\begin{aligned} \hat{a}_+\psi_0(x) &= \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\left(-\hbar\frac{d}{dx} + m\omega x\right)\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[-\hbar\left(\frac{-2m\omega}{2\hbar}\right)xe^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} + m\omega xe^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[2m\omega xe^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}\right] \\ \hat{a}_+\hat{a}_+\psi_0(x) &= \frac{1}{2m\omega\hbar}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[-\hbar\frac{d}{dx} + m\omega x\right]2m\omega xe^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \\ &= \frac{1}{2m\omega\hbar}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[-\hbar\left(2m\omega e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} - \frac{2m^2\omega^2x^2}{\hbar}e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}\right) + \right. \\ &\quad \left. + 2m^2\omega^2x^2e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}\right] \\ &= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[-e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}} + \frac{2m\omega x^2}{\hbar}e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}}\right] \\ &= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[\frac{2m\omega x^2}{\hbar} - 1\right]e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}} \end{aligned} \quad (87)$$

$$\boxed{\psi_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[\frac{2m\omega x^2}{\hbar} - 1\right]e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}}} \quad (88)$$

c) Os operadores  $\hat{x}$  e  $\hat{p}$  em termos dos operadores escadas  $\hat{a}_\pm$  ficam

$$\hat{p} = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(\hat{a}_+ - \hat{a}_-), \quad \hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a}_+ + \hat{a}_-) \quad (89)$$

de modo que para o estado fundamental  $\psi_0(x)$  devemos ter

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* x \psi_0 dx \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* (a_+ + a_-) \psi_0 dx \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* (a_+ \psi_0 + a_- \psi_0) dx \end{aligned} \quad (90)$$

sabendo que  $a_- \psi_0 = 0$  e  $a_+ \psi_0 = \sqrt{\hbar} \psi_1$  além de  $\delta_{mn} = 0$  se  $m \neq n$  obtêm-se que

$$\langle x \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* \psi_1 dx = \sqrt{\frac{\hbar}{2m}} \delta_{01} \implies \boxed{\langle x \rangle = 0} \quad (91)$$

de maneira análoga, para o operador momento  $\hat{p}$  teremos

$$\begin{aligned} \langle p \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* p \psi_0 dx \\ &= i \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* (a_+ - a_-) \psi_0 dx \\ &= i \sqrt{\frac{\hbar}{2m}} \delta_{01} \implies \boxed{\langle p \rangle = 0} \end{aligned} \quad (92)$$

Calculando o valor médio de  $\langle x^2 \rangle$

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* \left[ \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a_+ + a_-) \right]^2 \psi_0 dx \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* \left[ (a_+)^2 + (a_+ a_-) + (a_- a_+) + (a_-)^2 \right] \psi_0 dx \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* [(a_+) \psi_1 + (a_+) 0 + (a_-) \psi_1 + (a_-) 0] dx \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* [\sqrt{2} \psi_2 + \psi_0] dx \implies \boxed{\langle x^2 \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}} \end{aligned} \quad (93)$$

Por fim, calculando  $\langle p^2 \rangle$

$$\begin{aligned} \langle p^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* \left[ i \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} (a_+ - a_-) \right]^2 \psi_0 dx \\ &= -\frac{\hbar m \omega}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* \left[ (a_+)^2 - (a_+ a_-) - (a_- a_+) + (a_-)^2 \right] \psi_0 dx \\ &= -\frac{\hbar m \omega}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0^* [\sqrt{2} \psi_2 - \psi_0] dx \implies \boxed{\langle p^2 \rangle = \frac{\hbar m \omega}{2}} \end{aligned} \quad (94)$$

Verificando o princípio de incerteza

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \end{aligned} \quad (95)$$

e

$$\begin{aligned} \sigma_p &= \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2} \\ &= \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} \end{aligned} \quad (96)$$

$$\begin{aligned}\sigma_x \sigma_p &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{\hbar^2}{4}} = \frac{\hbar}{2}\end{aligned}\tag{97}$$

ou seja, sim o princípio de incerteza continua sendo respeitado!

$$\boxed{\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}}\tag{98}$$

**Problema 7.** Para o oscilador harmônico pelo método analítico:

- a) Partindo da Equação de Schrödinger para o oscilador harmônico (primeira equação do slide 4) e usando a variável adimensional

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x,\tag{99}$$

Mostre que a equação pode ser escrita como

$$\frac{d^2 \phi(\xi)}{d\xi^2} = (\xi^2 - K) \phi(\xi), \quad \text{com } K = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

- b) Substitua na equação acima a proposta de solução

$$\phi(\xi) = h(\xi) e^{-\xi^2/2}\tag{100}$$

e obtenha a equação diferencial para  $h(\xi)$  (equação mostrada no exercício seguinte). Utilize o método das séries de potências para a equação diferencial de  $h(\xi)$

$$\frac{d^2 h(\xi)}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dh(\xi)}{d\xi} + (K - 1) h(\xi) = 0\tag{101}$$

e obtenha a relação de recorrência entre os coeficientes.

**Solução 7.** a) Considere a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico

$$\begin{aligned}-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_n(x)}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi_n(x) &= E \psi_n(x) \\ \frac{d^2 \psi_n(x)}{dx^2} - \frac{m^2 \omega^2 x^2}{\hbar^2} \psi_n(x) + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi_n(x) &= 0 \\ \frac{d^2 \psi_n(x)}{dx^2} + \left[ \frac{2mE}{\hbar^2} - \frac{m^2 \omega^2 x^2}{\hbar^2} \right] \psi_n(x) &= 0\end{aligned}\tag{102}$$

assumindo a mundaça de variável  $x \rightarrow \xi$  em que  $\xi(x) = \alpha x$ ,  $\alpha = \sqrt{m\omega\hbar^{-1}}$  e  $\psi(x) \rightarrow \phi(\xi)$ . Deseja-se reescrever a eq. de Sch. em termos da  $\xi$  portanto

$$\begin{aligned}\frac{d\psi}{dx} &= \frac{d\phi}{d\xi} \frac{d\xi}{dx} \\ \frac{d^2\psi}{dx^2} &= \frac{d^2\phi}{d\xi^2} \frac{d\xi}{dx} + \frac{d\phi}{d\xi} \frac{d^2\xi}{dx^2}\end{aligned}\quad (103)$$

supondo que  $\phi(\xi)$  é contínua e definida em todo o seu domínio, podemos usar o teorema de Clairaut para avaliar as derivadas cruzadas

$$\frac{d}{d\xi} \left[ \frac{d\psi}{dx} \right] = \frac{d^2\phi}{d\xi^2} \frac{d\xi}{dx} = \frac{d^2\phi}{dx d\xi} \quad (104)$$

então

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{d^2\phi}{d\xi^2} \left( \frac{d\xi}{dx} \right)^2 + \frac{d\phi}{d\xi} \frac{d^2\xi}{dx^2} = \alpha^2 \frac{d^2\phi}{d\xi^2} \quad (105)$$

na eq. de Sch. fica

$$\begin{aligned}a^2 \frac{d^2\phi(\xi)}{d\xi^2} + \left[ \frac{2mE}{\hbar^2} - \frac{m^2\omega^2}{\hbar^2} \left( \frac{\xi^2\hbar}{m\omega} \right) \right] \phi(\xi) &= 0 \\ \frac{d^2\phi(\xi)}{d\xi^2} + \frac{\hbar}{\omega m} \left[ \frac{2mE}{\hbar^2} - \frac{m\omega}{\hbar} \xi^2 \right] \phi(\xi) &= 0 \\ \frac{d^2\phi(\xi)}{d\xi^2} + \left[ \frac{2E}{\omega\hbar} - \xi^2 \right] \phi(\xi) &= 0\end{aligned}\quad (106)$$

por fim, usando o valor designado para  $K$

$$\boxed{\frac{d^2\phi(\xi)}{d\xi^2} = [\xi^2 - K] \phi(\xi)} \quad (107)$$

b) Se  $\phi(\xi) = h(\xi)e^{-\xi^2/2}$  tem-se

$$\begin{aligned}\frac{d\phi}{d\xi} &= \frac{dh}{d\xi} e^{-\xi^2/2} - h\xi e^{-\xi^2/2} \\ \frac{d^2\phi}{d\xi^2} &= \frac{d^2h}{d\xi^2} e^{-\xi^2/2} - \xi \frac{dh}{d\xi} e^{-\xi^2/2} - \frac{dh}{d\xi} \xi e^{-\xi^2/2} - h e^{-\xi^2/2} + h\xi^2 e^{-\xi^2/2} \\ \frac{d^2\phi}{d\xi^2} &= \frac{d^2h}{d\xi^2} e^{-\xi^2/2} - 2\xi \frac{dh}{d\xi} e^{-\xi^2/2} - h e^{-\xi^2/2} + h\xi^2 e^{-\xi^2/2}\end{aligned}\quad (108)$$

substituindo em (107)

$$\begin{aligned}\frac{d^2\phi}{d\xi^2} &= [\xi^2 - K] \phi \\ \frac{d^2h}{d\xi^2} e^{-\xi^2/2} - 2\xi \frac{dh}{d\xi} e^{-\xi^2/2} - h e^{-\xi^2/2} + h\xi^2 e^{-\xi^2/2} &= [\xi^2 - K] h e^{-\xi^2/2} \\ \frac{d^2h}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dh}{d\xi} - h + h\xi^2 &= h\xi^2 - Kh\end{aligned}\quad (109)$$

e por fim

$$\boxed{\frac{d^2h(\xi)}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dh(\xi)}{d\xi} + [K - 1] h(\xi) = 0} \quad (110)$$

c) Propondo como solução da (110) a série de potência

$$h(\xi) = \sum_n a_j \xi^j \quad (111)$$

calculando todas as derivadas necessárias de  $h(\xi)$

$$\frac{dh(\xi)}{d\xi} = \sum_j j a_j \xi^{j-1}, \quad \frac{d^2 h(\xi)}{d\xi^2} = \sum_j (j-1) j a_j \xi^{j-2} \quad (112)$$

para manter todos os termos na mesma potência de  $\xi$ , fazemos a mudança de variável  $j \rightarrow j+2$  no termo da derivada segunda de  $\xi$  ficando assim:

$$\frac{d^2 h(\xi)}{d\xi^2} = \sum_j (j+1)(j+2) a_{j+2} \xi^j \quad (113)$$

substituindo tudo na (110) ficamos com

$$\sum_j (j+1)(j+2) a_{j+2} \xi^j - 2 \sum_j j a_j \xi^{j-1} \xi + (K-1) \sum_j a_j \xi^j = 0 \quad (114)$$

logo, a relação de recorrência para os coeficientes é dada por

$$\sum_j [(j+1)(j+2) a_{j+2} - 2j a_j + K a_j - a_j] \xi^j = 0 \quad (115)$$

$$(j+1)(j+2) a_{j+2} = (2j+1-K) a_j$$

$$\boxed{a_{j+2} = \frac{2j+1-K}{(j+1)(j+2)} a_j} \quad (116)$$

**Problema 8.** Faça um estudo do final da seção 2.4 do Griffiths, sobre partícula livre, e argumente que

$$v_{grupo} = 2v_{fase} \quad (117)$$

**Problema 9.** Para o problema do potencial delta no caso de estados ligados ( $E < 0$ ):

a) Mostre que

$$\psi''(x) = -2\gamma^3 \delta(x) + \gamma^4 \psi(x), \quad \gamma = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar^2}$$

- b) Calcule os valores médios de  $x$ ,  $x^2$ ,  $p$  e  $p^2$  e teste o princípio da incerteza para este problema.

**Solução 8.** a)

---

**Problema 10.** Mostre que a equação de Schrödinger respeita a equação da continuidade (1D em nossos estudos, por enquanto)

$$\frac{\partial j}{\partial x} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (118)$$

com a densidade de probabilidade e densidade de corrente dadas, respectivamente por

$$\rho = |\Psi(x, t)|^2 \quad (119)$$

e

$$j = \frac{i\hbar}{2m} \left[ \Psi(x, t) \frac{\partial \Psi^*(x, t)}{\partial x} - \Psi^*(x, t) \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial x} \right] \quad (120)$$

---