

Confirmación de hipótesis · Codo

PhysiQ-Assessment · fase 4b. LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR- ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. «hallazgo»: sin LR aplicable. Criterios de cada test y fuentes, en la app.

1 Tendinopatía Lateral (Epicondialgia Lateral / Codo de Tenista)

Test	LR+	LR-	Papel
Test de Cozen (extensión resistida de muñeca)	—	—	hallazgo
Reducción de fuerza de prensión (diferencia 5-10% entre posiciones)	—	—	hallazgo
Test de Thomsen (extensión resistida de muñeca)	—	—	hallazgo
Fuerza de prensión sin dolor (dinamómetro)	—	—	hallazgo

2 Tendinopatía Medial (Epicondialgia Medial / Codo de Golfista)

Test	LR+	LR-	Papel
Dolor a la palpación del epicóndilo medial	—	—	hallazgo
Dolor con flexión resistida de antebrazo y pronación	—	—	hallazgo
Ecografía (si se dispone de informe)	—	—	hallazgo

3 Capsulitis Adhesiva del Codo (Rigidez Post-traumática)

Test	LR+	LR-	Papel
Test de ROM activo en 4 direcciones	—	—	hallazgo
Limitación activa Y pasiva comparada con lado sano	—	—	hallazgo

4 Insuficiencia del Ligamento Colateral Cubital (LCC)

Test	LR+	LR-	Papel
Ecografía dinámica con estrés en valgo	≈5.1	≈0.05	puntúa
RM con artrograma	≈9.0	≈0.21	puntúa
Test de valgo dinámico (maniobra de ordeño, test de valgo móvil de Mayo)	—	—	hallazgo

5 Inestabilidad Rotatoria Posterolateral (IRPL)

Test	LR+	LR-	Papel
Test de cajón posterolateral / Test de pivote lateral	—	—	hallazgo
Dolor lateral con palpación del ligamento colateral radial	—	—	hallazgo
Test de flexión en suelo (push-up) con el antebrazo en supinación	—	—	hallazgo
Test de recolocación en la mesa (table-top relocation)	—	—	hallazgo

6 Pinzamiento Posterolateral por Plica Radiocapitelar

Test	LR+	LR-	Papel
Dolor posterolateral en línea articular radiocapitelar a la palpación	—	—	hallazgo
Test de plica radiocapitelar posterolateral	≈6.7	≈0.19	puntúa

7 Rotura Distal del Bíceps

Test	LR+	LR-	Papel
Test del Gancho (Hook Test)	—	0.19	puntúa
Deformidad visible del contorno del bíceps + equimosis fosa antecubital	—	—	hallazgo
Pronación pasiva del antebrazo (PFP) / test de pronosupinación pasiva	—	0.05	puntúa

8 Neuropatía Cubital (Síndrome del Túnel Cubital)

Test	LR+	LR-	Papel
Test de Tinel en túnel cubital	—	—	hallazgo
Evaluación de subluxación del nervio cubital	—	—	hallazgo
Electrodiagnóstico (velocidad de conducción nerviosa)	—	—	hallazgo
Test de flexión del codo	—	—	hallazgo
Test de rotación interna del hombro con flexión del codo (SIRT)	—	—	hallazgo
Test de rotación interna del hombro con flexión máxima del codo (SIREFT)	—	—	hallazgo

9 Neuropatía Radial en el Codo (Síndrome del Túnel Radial / del Nervio Interóseo Posterior)

Test	LR+	LR-	Papel
Dolor en antebrazo proximal (NO en epicóndilo lateral)	—	—	hallazgo
Dolor con extensión resistida del 3er dedo	—	—	hallazgo
Dolor con supinación resistida con el codo extendido	—	—	hallazgo
Neurodinámica del nervio radial (ULNT radial)	—	—	hallazgo
Debilidad de la extensión de los dedos (síndrome del nervio interóseo posterior)	—	—	hallazgo