
Algoritmo CIF — Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Hombro. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.



Respuestas

SÍ Reproducción con movimientos cervicales (test de Spurling o similar)	→	**6 Disfunción Cervical con Dolor Referido a Hombro**
SÍ Restricción de movilidad en 1ª costilla y dolor en zona de transición	→	**9 Disfunción de Primera Costilla (Zona Cervicotorácica)**
NO No se reproduce con cervical ni 1ª costilla	→	sin hipótesis

Respuestas

SÍ Restricción global de la movilidad pasiva, con pérdida marcada de rotación externa	→	**→ desvío 2b**
NO Movilidad pasiva mayormente preservada	→	sin hipótesis

Respuestas

Dolor en articulación acromioclavicular (parte superior)	→	**7 Artropatía Acromioclavicular**
Evento traumático / "Pop" con sensación de inestabilidad anterior	→	**4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)**
Evento traumático / dolor profundo, síntomas de labrum (chasquidos)	→	**5 Lesión Labral Superior (SLAP)**
Episodio concreto o aprensión (inestabilidad anterior o posterior, también sin «pop» traumático)	→	**4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)**
Ninguno de los anteriores	→	sin hipótesis

continúa en la página siguiente →



Leyenda

- Pregunta del árbol
- Hipótesis que activa la respuesta
- Derivación médica (el recorrido sigue)
- Sin hipótesis

Al terminar sin ninguna hipótesis activa

La app propone trabajar con «dolor de hombro inespecífico», revisar los factores psicosociales (fase 1 y SINSS) y reconsiderar las respuestas. Si el cuadro es crónico y el riesgo psicosocial es alto, sugiere considerar también sensibilización central.

Fase 4b · confirmar

Cada hipótesis activa se confirma o descarta con sus tests: ver el esquema de confirmación de hombro.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.