Hoja de respuestas · IdFAI

Identificación de la inestabilidad funcional de tobillo · PhysiQ · v. 8f0a1e05

Lee cada pregunta en el cuestionario y marca aquí con una X la casilla de tu respuesta, en la fila con el mismo número. Una sola casilla por fila, salvo donde dice que puedes marcar varias. Si te equivocas, tacha la casilla y marca la buena.
No escribas tu nombre ni ningún otro dato en esta hoja.

2	Último esguince	1 ☐ Nunca · 2 ☐ Hace más de 2 años · 3 ☐ 1–2 años · 4 ☐ 6–12 meses · 5 ☐ 1–6 meses · 6 ☐ Menos de 1 mes
3	Grado del esguince más grave (según un profesional)	1 ☐ No consultó · 2 ☐ Leve (grado I) · 3 ☐ Moderado (grado II) · 4 ☐ Grave (grado III)
4	Tiempo con muletas u otra ayuda	1 ☐ Nunca · 2 ☐ 1–3 días · 3 ☐ 4–7 días · 4 ☐ 1–2 semanas · 5 ☐ 2–3 semanas · 6 ☐ Más de 3 semanas
5	Último fallo del tobillo	1 ☐ Nunca · 2 ☐ Hace más de 2 años · 3 ☐ 1–2 años · 4 ☐ 6–12 meses · 5 ☐ 1–6 meses · 6 ☐ Menos de 1 mes
6	Frecuencia de los fallos	1 ☐ Nunca · 2 ☐ Una vez al año · 3 ☐ Una vez al mes · 4 ☐ Una vez a la semana · 5 ☐ Una vez al día
7	Cuando empieza a torcerse, puede pararlo	1 ☐ Nunca se le ha torcido · 2 ☐ Inmediatamente · 3 ☐ A veces · 4 ☐ No puede pararlo
8	Tras una torcedura, vuelve a la normalidad	1 ☐ Nunca se le ha torcido · 2 ☐ Inmediatamente · 3 ☐ En menos de 1 día · 4 ☐ En 1–2 días · 5 ☐ Pasados 2 días
9	Inestable en la vida diaria	1 ☐ Nunca · 2 ☐ Una vez al año · 3 ☐ Una vez al mes · 4 ☐ Una vez a la semana · 5 ☐ Una vez al día
10	Inestable en deporte u ocio	1 ☐ Nunca · 2 ☐ Una vez al año · 3 ☐ Una vez al mes · 4 ☐ Una vez a la semana · 5 ☐ Una vez al día