Hoja de respuestas · VISA-A

Tendinopatía aquílea · PhysiQ · v. d0d648f2

Lee cada pregunta en el cuestionario y marca aquí con una X la casilla de tu respuesta, en la fila con el mismo número. Una sola casilla por fila, salvo donde dice que puedes marcar varias. Si te equivocas, tacha la casilla y marca la buena.
No escribas tu nombre ni ningún otro dato en esta hoja.

1 Minutos de rigidez al levantarse

- 1 ☐ 0 min
- 2 ☐ 10 min
- 3 ☐ 20 min
- 4 ☐ 30 min
- 5 ☐ 40 min
- 6 ☐ 50 min
- 7 ☐ 60 min
- 8 ☐ 70 min
- 9 ☐ 80 min
- 10 ☐ 90 min
- 11 ☐ 100 min

2 Dolor al estirar el Aquiles en el borde de un escalón

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

3 Dolor en las 2 h tras caminar 30 min en llano (si no puede caminarlos, 0 puntos: toca el 10)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

4 Dolor al bajar escaleras a paso normal

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

5 Dolor con 10 elevaciones de talón seguidas

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

6 Saltos a una pierna sin dolor

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7 Deporte o actividad física actual

- 1 ☐ No, en absoluto
- 2 ☐ Entrenamiento o competición modificada
- 3 ☐ Completa, a menor nivel que al empezar los síntomas
- 4 ☐ Al mismo nivel o superior

8 Tiempo que puede entrenar (rama marcada)

1 ☐	A · sin dolor: 0 min
2 ☐	A · 1–10 min
3 ☐	A · 11–20 min
4 ☐	A · 21–30 min
5 ☐	A · más de 30 min
6 ☐	B · con dolor que no le hace parar: 0 min
7 ☐	B · 1–10 min
8 ☐	B · 11–20 min
9 ☐	B · 21–30 min
10 ☐	B · más de 30 min
11 ☐	C · el dolor le hace parar: 0 min
12 ☐	C · 1–10 min
13 ☐	C · 11–20 min
14 ☐	C · 21–30 min
15 ☐	C · más de 30 min