Árbol de decisión — Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Hombro. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 2 si «SÍ»

2b La movilidad pasiva GH (sobre todo la RE) está limitada igual que la activa. ¿Hubo traumatismo previo? 📝 G2 · R3

- SÍ → 11 Luxación Bloqueada o Fractura (→ Rx)
- NO → 10 Artrosis Glenohumeral
- NO → 1 Capsulitis Adhesiva

1 ¿El dolor se reproduce con movimientos cervicales, compresión axial o palpación de la primera costilla? 📝 R3, R4

Respuestas

- **SÍ** — Reproducción con movimientos cervicales (test de Spurling o similar) → **6 Disfunción Cervical con Dolor Referido a Hombro**
- **SÍ** — Restricción de movilidad en 1ª costilla y dolor en zona de transición → **9 Disfunción de Primera Costilla (Zona Cervicotorácica)**
- **NO** — No se reproduce con cervical ni 1ª costilla → sin hipótesis

todas

2 ¿Existe una restricción GLOBAL de la movilidad pasiva, especialmente en rotación externa? 📝 R1, R2, R9

Respuestas

- **SÍ** — Restricción global de la movilidad pasiva, con pérdida marcada de rotación externa → → desvío 2b
- **NO** — Movilidad pasiva mayormente preservada → sin hipótesis

SÍ

NO

3 ¿El dolor está localizado en la parte superior (AC) o hubo un evento traumático con sensación de inestabilidad?
📝 R1, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R13

Respuestas

- **Dolor en articulación acromioclavicular (parte superior)** → **7 Artropatía Acromioclavicular**
- **Evento traumático / "Pop" con sensación de inestabilidad anterior** → **4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)**
- **Evento traumático / dolor profundo, síntomas de labrum (chasquidos)** → **5 Lesión Labral Superior (SLAP)**
- **Episodio concreto o aprensión (inestabilidad anterior o posterior, también sin «pop» traumático)** → **4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)**
- **Ninguno de los anteriores** → sin hipótesis

continúa en la página siguiente →



Leyenda

- Pregunta del árbol
- Hipótesis que activa la respuesta
- Derivación médica (el recorrido sigue)
- Sin hipótesis
- 📝 Formulario del paciente (G general, R región)

Al terminar sin ninguna hipótesis activa

La app propone trabajar con «dolor de hombro inespecífico», revisar los factores psicosociales (fase 1 y SINSS) y reconsiderar las respuestas. Si el cuadro es crónico y el riesgo psicosocial es alto, sugiere considerar también sensibilización central.

Fase 4b · confirmar

Cada hipótesis activa se confirma o descarta con sus tests: ver el esquema de confirmación de hombro.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0