Algoritmo CIF — Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Hombro. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 2 si «SÍ»

2b La movilidad pasiva GH (sobre todo la RE) está limitada igual que la activa. ¿Hubo traumatismo previo?

- SÍ → 11 Luxación Bloqueada o Fractura (→ Rx)
- NO → 10 Artrosis Glenohumeral
- NO → 1 Capsulitis Adhesiva

SÍ

1 ¿El dolor se reproduce con movimientos cervicales, compresión axial o palpación de la primera costilla?

- **SÍ** — Reproducción con movimientos cervicales (test de Spurling o similar) → 6 Disfunción Cervical con Dolor Referido a Hombro
- **SÍ** — Restricción de movilidad en 1ª costilla y dolor en zona de transición → 9 Disfunción de Primera Costilla (Zona Cervicotorácica)
- **NO** — No se reproduce con cervical ni 1ª costilla → sin hipótesis

todas

2 ¿Existe una restricción GLOBAL de la movilidad pasiva, especialmente en rotación externa?

- **SÍ** — Restricción global de la movilidad pasiva, con pérdida marcada de rotación externa → → desvío 2b
- **NO** — Movilidad pasiva mayormente preservada → sin hipótesis

NO

3 ¿El dolor está localizado en la parte superior (AC) o hubo un evento traumático con sensación de inestabilidad?

- Dolor en articulación acromioclavicular (parte superior) → 7 Artropatía Acromioclavicular
- Evento traumático / "Pop" con sensación de inestabilidad anterior → 4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)
- Evento traumático / dolor profundo, síntomas de labrum (chasquidos) → 5 Lesión Labral Superior (SLAP)
- Episodio concreto o aprensión (inestabilidad anterior o posterior, también sin «pop» traumático) → 4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)
- Ninguno de los anteriores → sin hipótesis

todas

4 ¿Hay dolor durante la elevación y/o déficits de fuerza?

- Dolor al elevar el brazo o con los test resistidos, sin debilidad marcada ni signos de retraso → 2 Síndrome de Pinzamiento Subacromial (Impingement)
- Debilidad evidente — caída del brazo (drop arm) o signos de retraso (lag signs) → 3 Rotura del Manguito Rotador
- Sin dolor claro ni debilidad en elevación → sin hipótesis

todas

5 ¿Se observa asimetría o "winging" escapular durante el movimiento activo?

- **SÍ** — Asimetría visual en la elevación o test de asistencia escapular positivo → 8 Discinesia Escapular
- **NO** — Sin alteración escapular evidente → sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor hombro inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.