Confirmación de hipótesis · Rodilla

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. ea1924b8

① Artrosis de Rodilla

Test	LR+	LR−	Papel
Criterio combinado: Edad ≥45 + dolor en actividad + rigidez <30 min	—	—	hallazgo
Crepitación articular	**2.2**	**≈0.18**	**puntúa**
Agrandamiento óseo	**12**	**≈0.47**	**puntúa**
Restricción de ROM	**4.4**	≈0.86	**puntúa**
Criterios clínicos del ACR	1.6	0.80	hallazgo
Rango disminuido, hinchazón persistente, debilidad de cuádriceps	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

② Lesión Meniscal

Test	LR+	LR−	Papel
Test de McMurray	**3.2**	0.52	**puntúa**
Sensibilidad a la palpación de la línea articular	**4.0**	**0.23**	**puntúa**
Combinación de tests clínicos	**2.7**	**0.40**	**puntúa**
Combinación traumática: traumatismo + dolor medial o difuso + palpación de la interlínea medial	**8.9**	**0.10**	**puntúa**
Combinación degenerativa: inicio progresivo + dolor medial aislado + uno de tres	**6.4**	—	**puntúa**
Test de Thessaly	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

③ Dolor Patelofemoral (Síndrome)

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor anterior durante sentadilla	1.8	**0.20**	**puntúa**
Confirmar: grupos de Décary (edad, localización del dolor, escaleras, faceta medial, extensión pasiva)	**8.7**	—	**puntúa**
Descartar: grupos de Décary (si se cumple alguno, marcar «Negativo»)	—	**0.12**	**puntúa**
Palpación alrededor de la FR, sobre todo de las facetas	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

④ Lesión del Ligamento Cruzado Anterior (LCA)

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Lachman	**5.7**	**0.24**	**puntúa**
Test de Cajón Anterior	**6.3**	**0.20**	**puntúa**
Test de Pivot Shift	**11**	0.56	**puntúa**
Lever Sign Test	**9.7**	**0.18**	**puntúa**
Confirmar: mecanismo de pivote + derrame inmediato + Lachman positivo	**18**	—	**puntúa**
Descartar: sin mecanismo de pivote ni chasquido + Lachman o pivot shift negativos (si se cumple, marcar «Negativo»)	—	**0.08**	**puntúa**
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑤ Tendinopatía Rotuliana

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor localizado en polo inferior de rótula + palpación del tendón	—	—	hallazgo
Dolor durante sentadilla en tabla inclinada (decline squat)	—	—	hallazgo
Ecografía o RM (si se dispone de informe)	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑥ Síndrome de la Banda Iliotibial

Test	LR+	LR−	Papel
Test de Ober	—	—	hallazgo
Test de Compresión de Noble	—	—	hallazgo
Palpación a lo largo de la cintilla	—	—	hallazgo
Step-down lateral	—	—	hallazgo
Test de Thomas	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑦ Bursitis de la Pata de Ganso

Test	LR+	LR−	Papel
Dolor y tumefacción en cara medial de rodilla (inserción pata de ganso)	—	—	hallazgo
Ecografía o RMN confirmatoria	—	—	hallazgo
Flexión de rodilla en carga y palpación de la pata de ganso	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑧ Lesión del Ligamento Colateral Medial (LCM)

Test	LR+	LR−	Papel
Valgo forzado a 30° de flexión + mecanismo de la entrevista	**6.4**	**0.50**	**puntúa**
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterios de cada test y fuentes, en la app.

Confirmación de hipótesis · Rodilla (continuación)

⑨ Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP)

Test	LR+	LR−	Papel
Cajón posterior a 90° de flexión	—	—	hallazgo
Signo del sag posterior	—	—	hallazgo
Test activo del cuádriceps	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑩ Lesión del Ligamento Lateral Externo y Esquina Posterolateral (LLE y EPL)

Test	LR+	LR−	Papel
Hinchazón y equimosis laterales; palpación dolorosa del ligamento	—	—	hallazgo
Varo forzado a unos 30° de flexión	—	—	hallazgo
Marcha con empuje en varo	—	—	hallazgo
Test del dial (esquina posterolateral)	—	—	hallazgo
Cajón posterolateral	—	—	hallazgo
Test de recurvatum	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑪ Fracturas (Rótula o Meseta Tibial)

Test	LR+	LR−	Papel
Regla de Ottawa antes de nada	≈1.7	**0.12**	**puntúa**
Rótula: dolor localizado, escalón, dolor con extensión resistida	—	—	hallazgo
Meseta: dolor exquisito sobre el foco y función neurovascular	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑫ Inestabilidad Rotuliana

Test	LR+	LR−	Papel
Tests de estrés tibiofemoral normales	—	—	hallazgo
Movilidad rotuliana excesiva	—	—	hallazgo
Test de aprensión	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑬ Síndrome de la Grasa de Hoffa

Test	LR+	LR−	Papel
Observación: genu recurvatum	—	—	hallazgo
Test de Hoffa	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑭ Bursitis Pre e Infrarrotuliana

Test	LR+	LR−	Papel
Fiebre >37,7 °C (séptica → urgencia)	—	—	hallazgo
Hinchazón en la propia bursa y arrodillarse intolerable	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑮ Apofisitis del Adolescente (Osgood-Schlatter, Sinding-Larsen-Johansson)

Test	LR+	LR−	Papel
Cadera primero	—	—	hallazgo
Palpación de la tuberosidad tibial o del polo inferior de la rótula	—	—	hallazgo
Sentadillas, escaleras, step-down, saltos y extensión resistida	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑯ Lesión Osteocondral

Test	LR+	LR−	Papel
Palpación de la zona afectada	—	—	hallazgo
Marcha antiálgica	—	—	hallazgo
Signos de inestabilidad: derrame y bloqueo	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑰ Plica Sinovial Medial

Test	LR+	LR−	Papel
Test de provocación de la plica rotuliana medial	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑱ Disfunción de la Articulación Tibioperonea Proximal

Test	LR+	LR−	Papel
Presión directa sobre la cabeza del peroné y movilidad accesoria	—	—	hallazgo
Movimiento de rodilla con isquiotibiales en tensión y movimiento de tobillo	—	—	hallazgo
Cabeza del peroné prominente, hipermovilidad o luxación	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑲ Neuropatía del Nervio Peroneo Común

Test	LR+	LR−	Papel
Marcha en steppage	—	—	hallazgo
Sensibilidad en la cara lateral inferior de la pierna y el dorso del pie	—	—	hallazgo
Fuerza de eversión y de flexión dorsal de tobillo y dedos	—	—	hallazgo
Tinel cerca de la cabeza del peroné	—	—	hallazgo
Prueba neurodinámica con sesgo peroneo	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

⑳ Quiste Poplíteo (Baker)

Test	LR+	LR−	Papel
Signos de patología meniscal o condral	—	—	hallazgo
Signo de Foucher	—	—	hallazgo
Gesto testigo (①) y medida objetiva (②)	—	—	hallazgo

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterios de cada test y fuentes, en la app.