Algoritmo CIF — Codo

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Codo. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

1 ¿Hubo un evento traumático, hay deformidad muscular característica o es un niño o adolescente?

SÍ
Pérdida del contorno normal del brazo (a veces sutil), hinchazón y debilidad en flexión/supinación
→ 7 Rotura Distal del Bíceps

FRACTURA / LUXACIÓN
Caída o golpe con deformidad del codo, o el codo no llega a estirarse del todo: sospecha de fractura o luxación → derivación médica
→ **Derivación médica**
Sospecha de fractura o luxación tras un traumatismo (deformidad, o el codo no llega a estirarse del todo: casi un 50 % de fracturas en Appelboam 2008): derivación médica para radiografía; antes, explorar la sensibilidad, el color y la temperatura de la mano.

NIÑO O ADOLESCENTE
Esqueleto inmaduro: tirón del brazo extendido en un menor de 5 años, lanzador joven con dolor medial, o dolor lateral insidioso entre los 7 y los 12 años
→ 14 Pronación Dolorosa (Subluxación de la Cabeza del Radio en el Niño)
→ 15 Codo de la Liga Infantil (Apofisitis o Avulsión del Epicóndilo Medial en el Lanzador Joven)
→ 16 Enfermedad de Panner / Osteocondritis Disecante del Capítulo

NO
Sin traumatismo significativo ni deformidad
→ sin hipótesis

todas

2 ¿Existe una restricción GLOBAL y dolorosa de todos los movimientos del codo (flexión, extensión, pronación, supinación)?

SÍ
Limitación activa y pasiva en todos los planos
→ 3 Rigidez del Codo (Contractura Postraumática o Capsular)

NO
Movilidad mayormente preservada
→ sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 3 ↓

↓ Paso 3: viene del paso 2

3 ¿Presenta parestesias, debilidad intrínseca de la mano o dolor quemante en el antebrazo?

SÍ
Zona medial: parestesias en 4º y 5º dedo, Tinel positivo en surco epitrócleo-olecraniano
→ 8 Neuropatía Cubital (Síndrome del Túnel Cubital)

SÍ
Zona dorsal/lateral: dolor en el dorso del antebrazo proximal, distal al epicóndilo, o debilidad para extender los dedos
→ 9 Neuropatía Radial en el Codo (Síndrome del Túnel Radial / del Nervio Interóseo Posterior)

SÍ
Zona anterior: dolor en el antebrazo anterior, parestesias del 1.º al 3.º dedo o debilidad de la flexión del pulgar y del índice
→ 13 Neuropatía del Mediano en el Codo (Síndrome del Pronador / del Nervio Interóseo Anterior)

NO
Sin síntomas neurales
→ sin hipótesis

todas

4 ¿El dolor es puntual al cargar peso o realizar agarres? ¿Dónde se localiza?

Epicóndilo lateral
Dolor con extensión resistida de muñeca (Test de Cozen) y dolor en cara lateral
→ 1 Tendinopatía Lateral (Epicondilalgia Lateral / Codo de Tenista)

Epicóndilo medial
Dolor con flexión resistida de muñeca y pronación, dolor en cara medial
→ 2 Tendinopatía Medial (Epicondilalgia Medial / Codo de Golfista)

Cara posterior
Dolor en la extensión terminal o con la extensión resistida del codo
→ 10 Tendinopatía o Rotura del Tríceps
→ 11 Pinzamiento Posterior o Posteromedial (Sobrecarga en Extensión-Valgo)
→ 12 Fractura de Estrés del Olécranon

Sin localización epicondílea clara
→ sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 5 ↓

↓ Paso 5: viene del paso 4

5 ¿Siente que el codo "falla" o tiene bloqueos?

Inestabilidad medial
Dolor al estrés en valgo en deportistas de lanzamiento
→ 4 Insuficiencia del Ligamento Colateral Cubital (LCC)

Inestabilidad posterolateral
Sensación de fallo con carga en supinación/extensión
→ 5 Lesión del Complejo Colateral Lateral / Inestabilidad Rotatoria Posterolateral (IRPL)

Bloqueo/Chasquido
Dolor posterolateral en extensión terminal
→ 6 Dolor Radiohumeral / Pinzamiento Posterolateral por Plica Radiocapitelar

Sin inestabilidad ni bloqueos
→ sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor codo inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.