


PhysiQ-Assessment · fase 4 · Tobillo y pie. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.





Respuestas

TIBIAL POSTERIOR
Retromaleolar, ETM sin varo del retropié → 14 Tendinopatía del Tibial Posterior

FHL
Transición de flexión dorsal a plantar → 15 Tendinopatía del Flexor Largo del Primer Dedo (FHL)

TÚNEL DEL TARSO
Tinel → 16 Síndrome del Túnel del Tarso

FRACTURA DE ESTRÉS
Maléolo medial → 17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)

NINGUNO
Sin dolor medial o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Respuestas

SENO DEL TARSO → 18 Síndrome del Seno del Tarso

PERONEOS → 19 Tendinopatía de los Peroneos

ESTRÉS DEL ASTRÁGALO → 17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)

REFERIDO
Valorar en la región Lumbar → sin hipótesis

NINGUNO
Sin dolor lateral o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Respuestas

PINZAMIENTO ANTERIOR
KTW → 20 Pinzamiento Anterior del Tobillo

NINGUNO
Sin dolor anterior o no lo explica → sin hipótesis

Respuestas

DOLOR PLANTAR CRÓNICO
Tuberosidad medial → 26 Dolor Plantar Crónico del Talón

ALMOHADILLA GRASA
Posterolateral → 27 Síndrome de la Almohadilla Grasa del Talón

ATRAPAMIENTO NERVIOSO
Tinel → 28 Atrapamiento Nervioso del Talón

ESTRÉS DEL CALCÁNEO → 17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)

NINGUNO
Sin dolor en el talón plantar o nada de esto lo explica → sin hipótesis



Respuestas

CALCANEOCUBOIDEA → 29 Lesión Calcaneocuboidea y Cubometatarsiana

NAVICULAR (punto N), CUBOIDES O CUÑAS
Fractura de estrés → 30 Fractura de Estrés del Mediopié (Navicular, Cuboides, Cuñas)

LISFRANC → 4 Lesión de Lisfranc

COALICIÓN → 23 Coalición Tarsiana

NINGUNO
Sin dolor en el mediopié o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Respuestas

1.ª MTF → 31 Lesión de la 1.ª Metatarsofalángica

BASE DEL 2.º MT → 32 Dolor en la Base del 2.º Metatarsiano

CUELLO DE MT
Fractura de marcha → 33 Fractura de Estrés del Cuello de un Metatarsiano (Fractura de Marcha)

5.º MT
Fractura → 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)

MORTON
O bursitis intermetatarsiana → 34 Neuroma de Morton o Bursitis Intermetatarsiana

GOTA
Derivar para confirmar (con fiebre y malestar → artritis infecciosa: urgencia) → 35 Gota

NINGUNO
Sin dolor en el antepié o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Respuestas

INESTABILIDAD CRÓNICA → 21 Inestabilidad Crónica del Tobillo

SINDESMOSIS → 2 Lesión de la Sindesmosis

SINOVITIS POSTRAUMÁTICA → 22 Sinovitis Postraumática

COALICIÓN TARSIANA → 23 Coalición Tarsiana

ARTROSIS → 24 Artrosis de Tobillo o Pie

OSTEOCONDritis DISECANTE → 25 Osteocondritis Disecante del Astrágalo

NINGUNO
Sin dolor vago o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Leyenda

-  Pregunta del árbol
-  Hipótesis que activa la respuesta
-  Derivación médica (el recorrido sigue)
-  Sin hipótesis

Al terminar sin ninguna hipótesis activa

La app propone trabajar con «dolor de tobillo y pie inespecífico», revisar los factores psicosociales (fase 1 y SINSS) y reconsiderar las respuestas. Si el cuadro es crónico y el riesgo psicosocial es alto, sugiere considerar también sensibilización central.

Fase 4b · confirmar

Cada hipótesis activa se confirma o descarta con sus tests: ver el esquema de confirmación de tobillo y pie.

Generado desde los datos de la app el 6/10/2026.