

Confirmación de hipótesis · Lumbar

PhysiQ-Assessment · fase 4b. LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR- ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. «hallazgo»: sin LR aplicable. Criterios de cada test y fuentes, en la app.

1 Disfunción Segmentaria Lumbosacra (Déficit de Movilidad)

Test	LR+	LR-	Papel
Regla de Predicción Clínica de Flynn (4/5 criterios)	24	—	pronóstico
Evaluación de hipomovilidad segmentaria lumbar (PAIVM)	—	—	hallazgo

2 Inestabilidad Espinal Lumbar (Déficit de Coordinación)

Test	LR+	LR-	Papel
Flexión lumbar ≥ 53° o ausencia de hipomovilidad en la exploración segmentaria	4.3	—	puntúa
Test de inestabilidad en prono	≈1.4	≈0.68	hallazgo
Movimientos aberrantes en la flexo-extensión	—	—	hallazgo

3 Dolor Radicular Lumbar

Test	LR+	LR-	Papel
Test de Elevación de Pierna Recta (SLR) ipsilateral	≈1.2	≈0.35	puntúa
SLR Contralateral (Lasègue cruzado)	≈2.4	≈0.81	puntúa
Test de Slump	≈4.9	≈0.19	puntúa
Criterios RAPIDH (5 criterios)	≈7.4	≈0.33	puntúa

4 Estenosis Espinal / Claudicación Neurogénica

Test	LR+	LR-	Papel
🌿 Cluster de Cook (anamnesis y observación): ≥4 de 5 positivos → LR+ 4.6 · ninguno de 5 positivos (todos hechos) → LR- 0.19			
Síntomas bilaterales			en clúster
Dolor de pierna mayor que el dolor lumbar			en clúster
Dolor al caminar o estar de pie			en clúster
Alivio al sentarse			en clúster
Edad > 48 años			en clúster
Marcha con base amplia	13	—	puntúa
Romberg alterado	4.2	—	puntúa
Déficits sensoriales (L3-S1)	—	—	hallazgo
Test de extensión lumbar de 30 s	≈1.6	≈0.71	hallazgo

5 Radiculopatía Lumbar (Déficit Neurológico)

Test	LR+	LR-	Papel
Fuerza por miotomas L1–S2	—	—	hallazgo
Reflejos rotuliano (L3–L4) y aquileo (L5–S1)	—	—	hallazgo
Sensibilidad (algodón, diapasón, pinchazo)	≈1.6	≈0.62	hallazgo

6 Dolor Lumbar Discogénico

Test	LR+	LR-	Papel
Centralización con movimientos repetidos	3.1	0.66	puntúa
Preferencia direccional	—	—	hallazgo
Observación: espalda plana o shift lateral	—	—	hallazgo

7 Dolor Lumbar Facetario

Test	LR+	LR-	Papel
Dolor en extensión, inclinación o rotación hacia el lado del dolor	1.3	—	hallazgo
PA unilateral dolorosa o con menos movilidad	—	—	hallazgo
Sin signos radiculares y sin alivio con repetidos	—	—	hallazgo

8 Dolor de la Articulación Sacroilíaca

Test	LR+	LR-	Papel
🌿 Tests de provocación SI (3 de 5): ≥3 de 5 positivos → LR+ 2.4 · ≤2 de 5 positivos (todos hechos) → LR- 0.31			
Distracción			en clúster
Thrust de muslo			en clúster
Compresión			en clúster
Thrust sacro			en clúster
No centraliza con movimientos repetidos	—	—	hallazgo
Gaenslen			en clúster
Ausencia de dolor lumbar en la línea media	2.4	—	puntúa

9 Síndrome de Dolor Miofascial Lumbar

Test	LR+	LR-	Papel
Banda tensa palpable	—	—	hallazgo
Punto hipersensible dentro de la banda	—	—	hallazgo
El paciente reconoce el dolor provocado	—	—	hallazgo