

# Confirmación de hipótesis · Codo

PhysiQ-Assessment · fase 4b. LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR- ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. «hallazgo»: sin LR aplicable. Criterios de cada test y fuentes, en la app.

## 1 Tendinopatía Lateral (Epicondialgia Lateral / Codo de Tenista)

| Test                                                                | LR+ | LR- | Papel    |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Test de Cozen (extensión resistida de muñeca)                       | —   | —   | hallazgo |
| Reducción de fuerza de prensión (diferencia 5-10% entre posiciones) | —   | —   | hallazgo |
| Test de Thomsen (= test de Cozen)                                   | —   | —   | hallazgo |
| Fuerza de prensión sin dolor (dinamómetro)                          | —   | —   | hallazgo |

## 2 Tendinopatía Medial (Epicondialgia Medial / Codo de Golfista)

| Test                                                 | LR+ | LR- | Papel    |
|------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Dolor a la palpación del epicóndilo medial           | —   | —   | hallazgo |
| Dolor con flexión resistida de antebrazo y pronación | —   | —   | hallazgo |
| Ecografía (si se dispone de informe)                 | —   | —   | hallazgo |
| Test de Polk (medial)                                | —   | —   | hallazgo |

## 3 Rigidez del Codo (Contractura Postraumática o Capsular)

| Test                                               | LR+ | LR- | Papel    |
|----------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Test de ROM activo en 4 direcciones                | —   | —   | hallazgo |
| Limitación activa Y pasiva comparada con lado sano | —   | —   | hallazgo |

## 4 Insuficiencia del Ligamento Colateral Cubital (LCC)

| Test                                                   | LR+  | LR-   | Papel    |
|--------------------------------------------------------|------|-------|----------|
| Ecografía dinámica con estrés en valgo                 | ≈5.1 | ≈0.05 | puntúa   |
| RM con artrograma                                      | ≈9.0 | ≈0.21 | puntúa   |
| Test de valgo móvil (moving valgus stress test)        | —    | —     | hallazgo |
| Test de valgo estático (dolor)                         | 1.3  | 0.71  | hallazgo |
| Test de valgo estático (laxitud)                       | —    | 0.81  | hallazgo |
| Dolor a la palpación justo distal al epicóndilo medial | —    | —     | hallazgo |

## 5 Lesión del Complejo Colateral Lateral / Inestabilidad Rotatoria Posterolateral (IRPL)

| Test                                                              | LR+ | LR- | Papel    |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Test de cajón posterolateral / Test de pivote lateral             | —   | —   | hallazgo |
| Dolor lateral a la palpación (complejo colateral lateral)         | —   | —   | hallazgo |
| Test de flexión en suelo (push-up) con el antebrazo en supinación | —   | —   | hallazgo |
| Test de recolocación en la mesa (table-top relocation)            | —   | —   | hallazgo |
| Dolor y laxitud con estrés en varo                                | —   | —   | hallazgo |

## 6 Dolor Radiohumeral / Pinzamiento Posterolateral por Plica Radiocapitelar

| Test                                                                  | LR+ | LR- | Papel    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Dolor posterolateral en línea articular radiocapitelar a la palpación | —   | —   | hallazgo |
| Test de plica radiocapitelar posterolateral                           | —   | —   | hallazgo |
| PEPPER (palpación-extensión de la radiocapitelar)                     | —   | —   | hallazgo |
| SALT (supinación y dolor anterolateral)                               | —   | —   | hallazgo |
| Test de flexión-pronación                                             | —   | —   | hallazgo |
| Deslizamientos accesorios de la cabeza del radio                      | —   | —   | hallazgo |

## 7 Rotura Distal del Bíceps

| Test                                                                  | LR+ | LR-  | Papel    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| Test del Gancho (Hook Test)                                           | 16  | 0.30 | puntúa   |
| Pérdida del contorno normal del brazo y tendón distal no palpable     | —   | —    | hallazgo |
| Pronación pasiva del antebrazo (PFP) / test de pronosupinación pasiva | 3.3 | 0.34 | puntúa   |

## 8 Neuropatía Cubital (Síndrome del Túnel Cubital)

| Test                                                                     | LR+ | LR- | Papel    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Test de Tinel en túnel cubital                                           | —   | —   | hallazgo |
| Evaluación de subluxación del nervio cubital                             | —   | —   | hallazgo |
| Electrodiagnóstico (velocidad de conducción nerviosa)                    | —   | —   | hallazgo |
| Test de flexión del codo                                                 | —   | —   | hallazgo |
| Test de rotación interna del hombro con flexión del codo (SIRT)          | —   | —   | hallazgo |
| Test de rotación interna del hombro con flexión máxima del codo (SIREFT) | —   | —   | hallazgo |

## 9 Neuropatía Radial en el Codo (Síndrome del Túnel Radial / del Nervio Interóseo Posterior)

| Test                                                                             | LR+ | LR- | Papel    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Dolor en antebrazo proximal (NO en epicóndilo lateral)                           | —   | —   | hallazgo |
| Dolor con extensión resistida del 3er dedo                                       | —   | —   | hallazgo |
| Dolor con supinación resistida con el codo extendido                             | —   | —   | hallazgo |
| Neurodinámica del nervio radial (ULNT radial)                                    | —   | —   | hallazgo |
| Debilidad de la extensión de los dedos (síndrome del nervio interóseo posterior) | —   | —   | hallazgo |

## 10 Tendinopatía o Rotura del Tríceps

| Test                                                  | LR+ | LR- | Papel    |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Dolor con la extensión activa o resistida del codo    | —   | —   | hallazgo |
| Dolor a la palpación de la inserción del tríceps      | —   | —   | hallazgo |
| Defecto palpable e hinchazón (rotura)                 | —   | —   | hallazgo |
| Test de compresión del tríceps (triceps squeeze test) | —   | —   | hallazgo |

**11 Pinzamiento Posterior o Posteromedial (Sobrecarga en Extensión-Valgo)**

| Test                                          | LR+ | LR- | Papel    |
|-----------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Dolor en la extensión terminal del codo       | —   | —   | hallazgo |
| Déficit fijo de extensión                     | —   | —   | hallazgo |
| Arm bar test                                  | —   | —   | hallazgo |
| Test de sobrecarga en valgo (valgus overload) | —   | —   | hallazgo |

**12 Fractura de Estrés del Olécranon**

| Test                                             | LR+ | LR- | Papel    |
|--------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Dolor con la extensión del codo, sin traumatismo | —   | —   | hallazgo |
| Pérdida de la extensión terminal                 | —   | —   | hallazgo |
| TC (si la radiografía no es concluyente)         | —   | —   | hallazgo |

**13 Neuropatía del Mediano en el Codo (Síndrome del Pronador / del Nervio Interóseo Anterior)**

| Test                                                                                                                         | LR+ | LR- | Papel    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Dolor a la palpación del pronador redondo                                                                                    | —   | —   | hallazgo |
| Síntomas con la pronación resistida con el codo extendido                                                                    | —   | —   | hallazgo |
| Debilidad del flexor largo del pulgar, del flexor profundo del 2.º y 3.º dedo, del flexor superficial y del pronador redondo | —   | —   | hallazgo |
| Neurodinámica del nervio mediano (ULNT mediano)                                                                              | —   | —   | hallazgo |
| Debilidad aislada del flexor profundo del 2.º y 3.º dedo y del flexor largo del pulgar (interóseo anterior)                  | —   | —   | hallazgo |

**14 Pronación Dolorosa (Subluxación de la Cabeza del Radio en el Niño)**

| Test                                                          | LR+ | LR- | Papel    |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Tirón del brazo extendido en un menor de 5 años, sin caída    | —   | —   | hallazgo |
| Dolor y limitación de la pronación y de la extensión del codo | —   | —   | hallazgo |

**15 Codo de la Liga Infantil (Apofisitis o Avulsión del Epicóndilo Medial en el Lanzador Joven)**

| Test                                                                       | LR+ | LR- | Papel    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Dolor medial con el lanzamiento en un deportista con el esqueleto inmaduro | —   | —   | hallazgo |
| Dolor y laxitud con el estrés en valgo o el valgo móvil                    | —   | —   | hallazgo |

**16 Enfermedad de Panner / Osteocondritis Disecante del Capítulo**

| Test                                                                          | LR+ | LR- | Papel    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| Dolor lateral sordo e hinchazón de inicio insidioso entre los 7 y los 12 años | —   | —   | hallazgo |
| Imagen: radiografía o RM                                                      | —   | —   | hallazgo |