Árbol de decisión — Tobillo y Pie

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Tobillo y pie. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

2 ¿Algún criterio de Ottawa de tobillo o de pie, Thompson positivo, o mecanismo de Lisfranc o de caída sobre el talón? → DERIVAR para radiografía (Ottawa) o derivación preferente (Aquiles, Lisfranc, calcáneo) antes de seguir explorando.

OTTAWA DE TOBILLO POSITIVO →
- 37 Fractura de Tobillo (Maleolar)

OTTAWA DE PIE POSITIVO →
- 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)

THOMPSON POSITIVO → 3 Rotura del Aquiles

MECANISMO DE LISFRANC →
- 4 Lesión de Lisfranc

CAÍDA SOBRE EL TALÓN →
- 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)

NINGUNO → sin hipótesis

3 Tobillo agudo traumático, ¿qué mecanismo cuenta?

ESGUINCE LATERAL →
- 1 Esguince Lateral Agudo (LPAA y LPC)

SINDESMOSIS → 2 Lesión de la Sindesmosis

CALCANEOCUBOIDEA →
- 29 Lesión Calcaneocuboidea y Cubometatarsiana

LUXACIÓN DEL TIBIAL POSTERIOR →
- 6 Luxación del Tibial Posterior

NINGUNO → sin hipótesis

SÍ

1 ¿Traumatismo agudo?

NO

4 ¿Niño o adolescente con dolor bien localizado o sin mecanismo claro?

todas

5 ¿La exploración local no reproduce el dolor conocido? → COLUMNA LUMBAR u origen proximal: slump con flexión plantar e inversión. Si persiste la duda, replantear (malignidad).

todas

6 Dolor sin traumatismo en el tobillo, POSTERIOR: ¿qué lo explica?

Respuestas

SÍ Traumatismo agudo: Ottawa primero, después por mecanismo	→	→ desvío 2
NO Sin traumatismo: por edad y localización	→	sin hipótesis

Respuestas

SEVER Inserción del Aquiles (8–12 años)	→	36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
ISELIN Base del 5.º MT (8–13 años)	→	36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
APOFISITIS DEL TIBIAL POSTERIOR o KÖHLER Navicular (menores de 10, cojera)	→	36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
FREIBERG Cabeza del 2.º–4.º MT (14–18 años)	→	36 Apofisitis y Osteocondrosis Pediátricas (Sever, Iselin, Köhler, Freiberg)
OSTEOCONDRITIS DISECANTE Esguince que no se resuelve, bloqueo	→	25 Osteocondritis Disecante del Astrágalo
OSTEOMA OSTEOIDE Dolor nocturno con alivio rápido por AINE: derivar	→	sin hipótesis
NO Adulto, o hay mecanismo claro	→	sin hipótesis

Respuestas

COLUMNA LUMBAR u origen proximal El slump con flexión plantar e inversión reproduce: valorar en la región Lumbar	→	sin hipótesis
NO REPRODUCE NADA Persiste la duda: replantear (malignidad)	→	sin hipótesis
NO La exploración local sí reproduce el dolor conocido	→	sin hipótesis

Respuestas

PINZAMIENTO POSTERIOR Flexión plantar máxima	→	7 Pinzamiento Posterior del Tobillo
AQUILES PORCIÓN MEDIA Pinza, 2–6 cm	→	8 Tendinopatía del Aquiles, Porción Media
AQUILES INSERCIONAL Un dedo, flexión dorsal	→	9 Tendinopatía Insercional del Aquiles
VAINA DEL AQUILES Crepitación, rango amplio	→	10 Afectación de la Vaina del Aquiles
PLANTAR DELGADO Medial y proximal	→	11 Tendinopatía del Plantar Delgado
NERVIO SURAL Lateral, neuropático	→	12 Neuropatía del Nervio Sural
BURSA SUPERFICIAL Roce del zapato	→	13 Bursitis Calcánea Superficial
NINGUNO Sin dolor posterior o nada de esto lo explica	→	sin hipótesis

continúa en la página siguiente →

7 Dolor sin traumatismo en el tobillo, MEDIAL: ¿qué lo explica?

todas

Respuestas

- **TIBIAL POSTERIOR** — Retromaleolar, ETM sin varo del retropié → 14 Tendinopatía del Tibial Posterior
- **FHL** — Transición de flexión dorsal a plantar → 15 Tendinopatía del Flexor Largo del Primer Dedo (FHL)
- **TÚNEL DEL TARSO** — Tinel → 16 Síndrome del Túnel del Tarso
- **FRACTURA DE ESTRÉS** — Maléolo medial → 17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)
- **NINGUNO** — Sin dolor medial o nada de esto lo explica → sin hipótesis

8 Dolor sin traumatismo en el tobillo, LATERAL: ¿qué lo explica?

todas

Respuestas

- **SENO DEL TARSO** → 18 Síndrome del Seno del Tarso
- **PERONEOS** → 19 Tendinopatía de los Peroneos
- **ESTRÉS DEL ASTRÁGALO** → 17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)
- **REFERIDO** — Valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NINGUNO** — Sin dolor lateral o nada de esto lo explica → sin hipótesis

9 Dolor sin traumatismo en el tobillo, ANTERIOR: ¿qué lo explica?

todas

Respuestas

- **PINZAMIENTO ANTERIOR** — KTW (rodilla a la pared) → 20 Pinzamiento Anterior del Tobillo
- **NINGUNO** — Sin dolor anterior o no lo explica → sin hipótesis

10 Dolor en el pie, TALÓN PLANTAR: ¿qué lo explica?

toc

Respuestas

- **DOLOR PLANTAR CRÓNICO** — Tuberosidad medial → 26 Dolor Plantar Crónico del Talón
- **ALMOHADILLA GRASA** — Posterolateral → 27 Síndrome de la Almohadilla Grasa del Talón
- **ATRAPAMIENTO NERVIOSO** — Tinel → 28 Atrapamiento Nervioso del Talón
- **ESTRÉS DEL CALCÁNEO** → 17 Fractura de Estrés del Tobillo (Maléolo Medial, Astrágalo, Calcáneo)
- **NINGUNO** — Sin dolor en el talón plantar o nada de esto lo explica → sin hipótesis

11 Dolor en el pie, MEDIOPIÉ: ¿qué lo explica?

todas

Respuestas

- **CALCANEOCUBOIDEA** → 29 Lesión Calcaneocuboidea y Cubometatarsiana
- **NAVICULAR (punto N), CUBOIDES O CUÑAS** — Fractura de estrés → 30 Fractura de Estrés del Mediopié (Navicular, Cuboides, Cuñas)
- **LISFRANC** → 4 Lesión de Lisfranc
- **COALICIÓN** → 23 Coalición Tarsiana
- **NINGUNO** — Sin dolor en el mediopié o nada de esto lo explica → sin hipótesis

12 Dolor en el pie, ANTEPIÉ: ¿qué lo explica?

todas

Respuestas

- **1.ª MTF** → 31 Lesión de la 1.ª Metatarsofalángica
- **BASE DEL 2.º MT** → 32 Dolor en la Base del 2.º Metatarsiano
- **CUELLO DE MT** — Fractura de marcha → 33 Fractura de Estrés del Cuello de un Metatarsiano (Fractura de Marcha)
- **5.º MT** — Fractura → 5 Fracturas del Pie (5.º MT, Calcáneo)
- **MORTON** — O bursitis intermetatarsiana → 34 Neuroma de Morton o Bursitis Intermetatarsiana
- **GOTA** — Derivar para confirmar (con fiebre y malestar → artritis infecciosa: urgencia) → 35 Gota
- **NINGUNO** — Sin dolor en el antepié o nada de esto lo explica → sin hipótesis

13 DOLOR VAGO DEL TOBILLO o que no se resuelve tras un esguince: ¿qué lo explica?

Respuestas

- **INESTABILIDAD CRÓNICA** → 21 Inestabilidad Crónica del Tobillo
- **SINDESMOSIS** → 2 Lesión de la Sindesmosis
- **SINOVITIS POSTRAUMÁTICA** → 22 Sinovitis Postraumática
- **COALICIÓN TARSIANA** → 23 Coalición Tarsiana
- **ARTROSIS** → 24 Artrosis de Tobillo o Pie
- **OSTEOCONDRITIS DISECANTE** → 25 Osteocondritis Disecante del Astrágalo
- **NINGUNO** — Sin dolor vago o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Leyenda

- Pregunta del árbol
- Hipótesis que activa la respuesta
- Derivación médica (el recorrido sigue)
- Sin hipótesis

Al terminar sin ninguna hipótesis activa

La app propone trabajar con «dolor de tobillo y pie inespecífico», revisar los factores psicosociales (fase 1 y SINSS) y reconsiderar las respuestas. Si el cuadro es crónico y el riesgo psicosocial es alto, sugiere considerar también sensibilización central.

Fase 4b · confirmar

Cada hipótesis activa se confirma o descarta con sus tests: ver el esquema de confirmación de tobillo y pie.

Generado desde los datos de la app el 30/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0