# Confirmación de hipótesis · Cervical

PhysiQ-Assessment · fase 4b. Los tests de cada hipótesis, sus LR y si puntúan. El criterio de cada test, por qué se hace, sus fuentes, «Ampliar con IA» y una calculadora que puntúa cada hipótesis con los tests que marques, en la guía de consulta (QR).

Porqués, IA y calculadora
v. d78b75c6

## 1 Disfunción Articular Cervical

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| PAIVM (Movilidad Intervertebral Pasiva Accesoria) C0-C3 | — | — | hallazgo |
| ROM Cervical Activo con CROM | — | — | hallazgo |

## 2 Disfunción Neuromuscular Cervical

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Test de Flexión Craneocervical (CCFT) con biofeedback de presión | — | — | hallazgo |
| Test de Reposicionamiento Cabeza-Neutro | — | — | hallazgo |

## 3 Radiculopatía Cervical

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Test de Spurling (Compresión Foraminal) | — | — | hallazgo |
| Upper Limb Neurodynamic Test (ULNT) 1 | **2.5** | **0.42** | **puntúa** |
| Shoulder Abduction Relief Test | — | — | hallazgo |
| Reflejos tendinosos (bíceps C6, tríceps C7) | — | — | hallazgo |
| Exploración neurológica: sensibilidad, fuerza y reflejos del miembro superior | — | — | hallazgo |
| Fuerza del grupo débil con dinamómetro de mano (② medida objetiva) | — | — | hallazgo |
| Combinación de 4 ULNT (ULNT1 y ULNT2a mediano, ULNT2b radial, ULNT3 cubital) | 2.0 | **0.06** | **puntúa** |

## 4 Cefalea Cervicogénica

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Test de Flexión-Rotación Cervical (CFRT) | **5.0** | — | **puntúa** |
| PAIVM C0-C3 (segmento C1-C2 más sintomático) | — | — | hallazgo |
| Cluster: ROM cervical + PAIVM + CCFT | — | — | hallazgo |
| Examen manual cervical alto | — | — | hallazgo |
| Rasgos de cervicogénica frente a migraña y tensional (tabla orientativa) | — | — | hallazgo |

## 5 Trastornos Asociados a Latigazo Cervical (WAD)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| ROM Cervical Activo (reducción significativa) | — | — | hallazgo |
| Factores de riesgo de evolución persistente (WAD agudo o subagudo) | — | — | pronóstico |
| Síntomas de hiperalerta / PTSD | — | — | pronóstico |
| Hielo sobre la nuca (hiperalgesia al frío) | 8.4 | — | pronóstico |
| Reposición articular (si hay mareo o inestabilidad) | — | — | hallazgo |
| Rotación cervical activa sentado (② medida objetiva) | — | — | hallazgo |

## 6 Debilidad Muscular Cérvico-Escapular

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Fuerza de Flexión Cervical (dinamometría) | — | — | hallazgo |
| Fuerza de Extensión Cervical (dinamometría) | — | — | hallazgo |

## 7 Dolor Mecánico Cervical Inespecífico Crónico

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| ROM Cervical Activo (reducción en todas las direcciones) | — | — | hallazgo |
| Test de reposicionamiento cabeza-neutro | — | — | hallazgo |

## 8 Mielopatía Espondilótica Cervical

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Signo de Hoffmann | — | — | hallazgo |
| Clonus de tobillo/muñeca | — | — | hallazgo |
| Evaluación de marcha (alteración) | — | — | hallazgo |
| Hiperreflexia (ROT aumentados) | — | — | hallazgo |

## 9 Disfunción Postural Cérvico-Torácica

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Evaluación postural de cabeza adelantada (Forward Head Posture) | — | — | hallazgo |
| Evaluación de cifosis torácica | — | — | hallazgo |

## 10 Disfunción de 1ª Costilla (Articulación Costo-Vertebral Superior)

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Palpación de 1ª costilla (sensibilidad y restricción) | — | — | hallazgo |
| Restricción de rotación cervical ipsilateral | — | — | hallazgo |

## 11 Fatiga Muscular Cérvico-Escapular

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Test de resistencia de flexores cervicales profundos | — | — | hallazgo |
| Evaluación de fatiga en actividades funcionales prolongadas | — | — | hallazgo |

## 12 Dolor Radicular Cervical

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| ULNT1 (sesgo mediano) con diferenciación estructural | — | — | hallazgo |
| Movilidad cervical que dispara el dolor de brazo | — | — | hallazgo |
| Grados de extensión de codo en el ULNT1 (② medida objetiva) | — | — | hallazgo |
| Rasgos neuropáticos (quemazón o descargas) | — | — | hallazgo |

## 13 Mareo Cervicogénico

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Descartar lo vascular (5 D y 3 N, disección) | — | — | hallazgo |
| Sentido de posición articular (error de reposición) | — | — | hallazgo |
| Movimiento o postura que desencadena el mareo (① gesto testigo) | — | — | hallazgo |

## 14 Dolor Cervical Idiopático

| Test | LR+ | LR− | Papel |
|---|---|---|---|
| Tarea provocadora (① gesto testigo) | — | — | hallazgo |
| Movilidad activa en los tres planos y las tres regiones | — | — | hallazgo |
| Test de flexión-rotación (FRT) si es craneocervical | — | — | hallazgo |
| Extensión-rotación | — | — | hallazgo |
| Examen manual segmentario | — | — | hallazgo |

LR en **verde**: multiplica la puntuación (LR+ ≥ 2 o LR− ≤ 0,5); en gris: no informativa, cuenta como hallazgo. «≈» = calculada de S y E. **puntúa**: puede mover la puntuación · hallazgo: sin LR aplicable · en clúster: solo cuenta con su clúster 🧩 · pronóstico: no entra en la puntuación. Criterio completo de cada test, fuentes y calculadora de la puntuación, en la guía (QR).


PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0