Tiempos de recuperación · Partes blandas

Referencia general, no un plazo para este paciente: cada barra dice qué mide (vuelta al deporte, protección, programa…), y con cirugía manda el protocolo del cirujano. La nota y las fuentes de cada barra, en la guía (QR).

Notas, fuentes e IA



TENDÓN

- **Tendinopatía** — *Sin barra general: ver los subtipos*
  - Rotuliana
  - Aquílea, porción media
  - Aquílea, insercional
  - Isquiotibiales, proximal
  - Glútea
  - Epicondilalgia lateral
  - Epicondilalgia medial
  - Tibial posterior (estadios I–II)
- Síndrome de la banda iliotibial (corredores)
- Rotura / reparación de tendón
  - Aquiles, sin cirugía
  - Aquiles, reparado
  - Manguito rotador reparado, protección
  - Manguito rotador reparado, rehabilitación
  - Bíceps distal reparado, vuelta al trabajo
  - Bíceps distal reparado, vuelta al deporte

MÚSCULO

- Dolor muscular tardío (DOMS)
- Isquiotibiales (clasificación BAMIC)
  - Grado 0 (RM normal)
  - Grado 1a/1b (pequeña)
  - Grado 2a/2b (moderada, sin tendón)
  - Grado 2c (moderada, dentro del tendón)
  - Grado 3c (extensa, dentro del tendón)
- Gemelo y sóleo (por la lesión del tejido conectivo)
  - Grado 0 (edema, sin rotura de fibras)
  - Grado 1 (rotura de fibras, tejido conectivo intacto)
  - Grado 2 (lesión del tendón o la aponeurosis, sin retracción)
  - Grado 3 (con retracción)
- Recto femoral, rotura completa o avulsión proximal
  - Sin cirugía
  - Operado
- Aductores (lesión aguda, futbolistas)
- Discinesia escapular con dolor de hombro
- Aductores, dolor de ingle de larga evolución

Sin barra general por grados I–III: el plazo depende del músculo, de la zona de la lesión y del deporte. Ver las filas de cada músculo.

LIGAMENTO

- **Esguince grado I** — *Sin barra general: ver los subtipos*
  - Tobillo, ligamento lateral
  - Rodilla, ligamento colateral medial
- **Esguince grado II** — *Sin barra general: ver los subtipos*
  - Tobillo, ligamento lateral
- **Esguince grado III** — *Sin barra general: ver los subtipos*
  - Tobillo, ligamento lateral
  - Tobillo, reparación quirúrgica
  - Rodilla, LCA sin cirugía
- **Injerto (reconstrucción)** — *Sin barra general: ver los subtipos*
  - Rodilla, LCA reconstruido
- Esguince de la sindesmosis (alto de tobillo)
  - Sin cirugía
  - Operada (tornillo o sutura dinámica)
- Ligamento colateral cubital del codo, sin cirugía
- Inestabilidad crónica de tobillo

MENISCO

- Rotura traumática, sin cirugía
- Lesión degenerativa, sin cirugía
- Meniscectomía parcial
- Sutura (reparación)

NERVIO PERIFÉRICO

- Neuropraxia (Sunderland I)

Axonotmesis (Sunderland II–IV), sin barra: el plazo depende de la distancia que tiene que crecer el nervio. El axón cruza la lesión en 1–2 semanas y luego avanza unos 1 mm al día (unos 3 cm al mes; de 0,5 a 3 mm según la fuente, más rápido en segmentos proximales, en jóvenes y tras un aplastamiento). Días hasta la reinervación ≈ milímetros desde la lesión hasta el primer músculo. El músculo admite reinervación durante 1–2 años y la recuperación motora se estanca a los 18–24 meses. Sin signos de recuperación (Tinel que no avanza, fuerza que no mejora) a los 3 meses: derivar para valorar cirugía. Neurotmesis (Sunderland V): no se recupera sin cirugía.

Color = gravedad: Mínima · Leve · Moderada · Grave / reconstrucción

Relleno = qué mide: Vuelta al deporte o a la función · Protección (inmovilización o descarga) · Duración del programa de tratamiento · Biología de la reparación · Evolución natural (hasta que se resuelve)

Fases de reparación: Inflamatoria · Proliferativa · Remodelación · Remodelación (tendón) · Eje no lineal: cada columna ocupa lo mismo.

Generado desde los datos de la app (data/tejidos.js) el 29/10/2026. La otra hoja: Hueso, articulación y columna.