

代数幾何まとめノート

Fefr

2024 年 9 月 9 日

目次

第 1 章	Scheme	5
1.1	Zariski Topology	5
1.2	Algebraic Sets	5
1.3	Sheaves	5
1.3.1	\mathfrak{B} -sheaf	13
1.4	Ringed Topological Space	15
1.5	Schemes	17
1.5.1	Morphism of schemes	24
1.5.2	Projective schemes	28
1.5.3	Noetherian schemes, algebraic varieties	31
付録 A	Limit	33
A.1	Inductive Limit	33
付録 B	Complex Analysis	35
B.1	Holomorphic Function	35
B.2	Line Integral	39
B.3	Cauchy's Integral Theorem	42
B.4	Cauchy's Integral Formula	44
B.5	Residue Theorem	44

Scheme

第 1 章

1.1 Zariski Topology

$\text{Spec } A$ を幾何的な対象に昇華するために、位相を導入しよう。まず、環 A のイデアル I に対して

$$\begin{aligned} V(I) &= \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid I \subset \mathfrak{p}\} \\ D(I) &= \text{Spec } A \setminus V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid I \not\subset \mathfrak{p}\} \end{aligned}$$

更に、 $f \in A$ に対して

$$\begin{aligned} V(f) &= \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid Af \subset \mathfrak{p}\} \\ D(f) &= \text{Spec } A \setminus V(Af) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid Af \not\subset \mathfrak{p}\} \end{aligned}$$

と定義する。また、 $Af \subset \mathfrak{p}$ より $af \in Af$ は $af \in \mathfrak{p}$ なので、 $a = 1$ とすれば $f \in \mathfrak{p}$ がわかり、イデアルの定義より、

$$\begin{aligned} V(f) &= \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid f \in \mathfrak{p}\} \\ D(f) &= \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid f \notin \mathfrak{p}\} \end{aligned}$$

がわかる。次に $\{D(f)\}_{f \in A}$ を開集合族とする位相が定まることを示そう。

Proposition 1.1.1. ああああ

1.2 Algebraic Sets

1.3 Sheaves

Definition 1.3.1. X を位相空間とする. X 上の (アーベル群の) 前層 (presheaf) \mathcal{F} とは次のデータ

- U を任意の X の開集合に対して $\mathcal{F}(U)$ はアーベル群.
- 制限写像 (restriction map) と言われる群準同型 $\rho_{U,V} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ が任意の開集合 $V \subset U$ に対して存在する.

そして次の条件を満たす.

- (1) $\rho_{U,U} = \text{id}_{\mathcal{F}(U)}$
- (2) 任意の開集合 $W \subset V \subset U$ に対して $\rho_{U,W} = \rho_{V,W} \circ \rho_{U,V}$ となる.

$s \in \mathcal{F}(U)$ を U 上の \mathcal{F} の切断 (section) という. また, $\rho_{U,V}(s) \in \mathcal{F}(V)$ を $s|_V$ と書いて s の V への制限という.

また, 単に $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}, \dots$ などと書いたら (前) 層を表すことや、 ρ と書いたら制限写像を意味する. また, どの (前) 層の制限写像かを明示するため, 例えば, $\rho_{U,V}^{\mathcal{F}}$ などと書くことがある.

Remark . $\mathcal{F}(U)$ を $\Gamma(U, \mathcal{F})$ と書くことがある. これはたぶん \mathcal{F} が複雑だったり U が複雑だったりするからである.

Definition 1.3.2. 前層 \mathcal{F} が層 (sheaf) とは次の条件を満たすことをいう.

- (4) (Uniqueness) U を X の開集合とし $\{U_i\}_i$ をその開被覆とする. $s \in \mathcal{F}(U)$ が任意の i に対して $s|_{U_i} = 0$ ならば $s = 0$
- (5) (Glueing local sections) 上の状況で, $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ が $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ を満たすならば, $s|_{U_i} = s_i$ を満たす $s \in \mathcal{F}(U)$ が存在する.

Remark . \mathcal{F} が層ならば $\mathcal{F}(\emptyset) = 0$ となる.

Example 1.3.1. X を位相空間とする.

\mathcal{C}_X^0 を X の開集合 U に対して $U \rightarrow \mathbf{C}$ なる連続写像全体の集合 $\mathcal{C}_X^0(U)$ を対応させるものとし, 制限写像を普通の制限とする.

$$\mathcal{C}_X^0(U) = \{f : U \rightarrow \mathbf{C} \mid f \text{ is continuous}\}$$

すると, \mathcal{C}_X^0 は X 上の層となる.

Proof. $V \subset U$ なる開集合 U, V に対して U 上の連続写像 $f \in \mathcal{C}_X^0(U)$ を V に制限することによって得られる V 上の連続写像を $\rho_{U,V}(f)(= f|_V)$ と書く. すると, これは \mathbf{C}

上のベクトル空間 (\mathbf{C} 上の関数空間) の準同型 $\rho_{U,V} : \mathcal{C}_X^0(U) \rightarrow \mathcal{C}_X^0(V)$ となる. つまり (\mathcal{C}_X^0, ρ) は前層となる.

また, (4) を満たすのは明らかで, (5) もすぐに成り立つことがわかる. $\{U_i\}_i$ を U の開被覆とする. $f_i \in \mathcal{C}_X^0(U_i)$ が $f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}$ を満たすとする. するとそれらを張り合わせた関数を f とすればこれは $f \in \mathcal{C}_X^0(U)$ であり, $f|_{U_i} = f_i$ となる. よって (\mathcal{C}_X^0, ρ) は層となる. これを連続写像が成す層という. ■

Example 1.3.2. X を位相空間とする.

A を自明でないアーベル群とする. \mathcal{A}_X を X の空でない開集合 U に対して $\mathcal{A}_X(U) = A$ に, 空集合 \emptyset に対して $\mathcal{A}_X(\emptyset) = 0$ に対応させるものとし, 制限写像を空でない開集合 $V \subset U$ に対して $\rho_{U,V} = \text{id}_A$ とし, $\rho_{U,\emptyset} = 0$ とする.

すると, (\mathcal{A}_X, ρ) は X 上の前層にはなるが, 一般に層とはならない.

Proof. 例えば, X が連結でないとする. 非交差な開集合 U, V があって $X = U \cup V$ とかける. すると $\{U, V\}$ は X の開被覆となる. $s_U \in \mathcal{A}_X(U) = A$ が $s_U|_{U \cap V} = s_U|_{\emptyset} = 0 = s_V|_{U \cap V}$ を満たすとする. このとき, 任意の $s \in \mathcal{A}_X(X) = A$ で $s|_U = s|_V = s$ となり層とならない. ■

Example 1.3.3. (skyscraper sheaf)

X を位相空間, A をアーベル群とする. $p \in X$ に対して $i_p : \{p\} \hookrightarrow X$ を包含写像とする. このとき $i_{p,*}A$ を

$$i_{p,*}A(U) = \begin{cases} A & p \in U \\ 1 & p \notin U \end{cases}$$

と定義する. これは層になる.

Example 1.3.4. \mathcal{F} を X 上の前層とする. このとき X の開集合 U に対して U 上の前層 $\mathcal{F}|_U$ が $V \subset U$ なる開集合に対して $\mathcal{F}|_U(V) = \mathcal{F}(V)$ として定義される. これを \mathcal{F} の U への制限 (restriction of \mathcal{F} to U) という. もし \mathcal{F} が層なら $\mathcal{F}|_U$ も層である.

Definition 1.3.3. 位相空間 X 上の前層 \mathcal{F} と $x \in X$ に対して, x での \mathcal{F} の茎 (stalk) \mathcal{F}_x という群が定義できる.

$$\mathcal{F}_x = \varinjlim_{U \ni x} \mathcal{F}(U)$$

ただし, U は x の開近傍をすべてを回る U 上の切断 $s \in \mathcal{F}(U)$ に対して $x \in U$ の茎 \mathcal{F}_x への自然な群準同型の像を s_x と書いて, x での s の芽 (germ) という.

Remark . ここで, \mathcal{F}_x は x 近傍の情報を持っていると言える. 実際,

$$\mathcal{F}_x = \bigsqcup_{x \in U_i} \mathcal{F}(U_i) / \sim \quad \dots (*)$$

ここで, 同値関係は

$$(t, U) \sim (s, V) \stackrel{\text{def}}{=} \exists W \subset U, V, x \in W \text{ s.t. } t|_W = s|_W$$

である. ただし, (t, U) とは x の開近傍 U で $t \in \mathcal{F}(U)$ という意味である. また $(*)$ を見れば分かるように, \mathcal{F}_x の任意の元はある x 近傍 U 上の切断 $s \in \mathcal{F}(U)$ の芽である.

Proposition 1.3.5. 層の定義の (4),(5) を次の列が完全系列であるとすることができ
る.

$$C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) : 0 \longrightarrow \mathcal{F}(U) \xrightarrow{d_0} \prod_i \mathcal{F}(U_i) \xrightarrow{d_1} \prod_i \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$$

ただし, \mathcal{U} は開集合 U の開被覆で $\mathcal{U} = \{U_i\}_i$.

$$d_0 : s \mapsto (s|_{U_i})_i, d_1 : (s_i)_i \mapsto (s_i|_{U_i \cap U_j} - s_j|_{U_i \cap U_j})_{i,j}$$

Proof. ■

Lemma 1.3.6. \mathcal{F} を X 上の層とする. $s, t \in \mathcal{F}(X)$ が任意の $x \in X$ に対して $s_x = t_x$ ならば $s = t$

Proof. 差を考えれば $t = 0$ のときを考えればいい. $s_x = 0$ ($\forall x \in X$) とすると, x の開近傍 U_x があって $s|_{U_x} = 0$ となる. $\{U_x\}_{x \in U_x}$ は X の開被覆なので, $s = 0$ となる. ■

Definition 1.3.4. X 上の 2 つの前層 \mathcal{F}, \mathcal{G} とする. 前層の射 $\alpha : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ とは, X の開集合 U に対して群準同型 $\alpha(U) : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ があって, 任意の開集合の組 $V \subset U$ に対して $\alpha(V) \circ \rho_{U,V}^{\mathcal{F}} = \rho_{U,V}^{\mathcal{G}} \circ \alpha(U)$ を満たすことをいう.

X の任意の開集合 U に対して $\alpha(U)$ が単射ならば α は単射であるという.(全射はうまくいかんっぽい?)

$\alpha : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ を X 上の前層の射とする. 任意の $x \in X$ に対して α から自然に誘導される群準同型 $\alpha_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ で $(\alpha(U)(s))_x = \alpha_x(s_x)$ が X の任意の開集合 $U, s \in \mathcal{F}(U), x \in U$ で成り立つものが取れる.

α_x が任意の $x \in X$ で全射なら α が全射であるという.

Example 1.3.7. $X = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ とし \mathcal{F} を X 上の正則関数がなす層とし, \mathcal{G} を X 上の双正則関数のなす層とする. 今, 任意の開集合 U と任意の $f \in \mathcal{F}(U)$ に対して $\alpha(U)(f) = \exp(f)$ で定義される層の射 $\alpha : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ が全射であることはよく知られている. しかし

$\alpha(X) : \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{G}(X)$ は全射ではない. 例えば恒等写像は $\exp(f)$ と書けない.

Proposition 1.3.8. $\alpha : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ を X 上の層の射とする.

$$\alpha \text{ が同型} \Leftrightarrow \alpha_x \text{ が同型 } (\forall x \in X)$$

Theorem 1.3.9. 位相空間 X 上の前層 \mathcal{F} に対して, 前層 \mathcal{F} の層化 (sheafification) \mathcal{F}^\dagger は存在する.

Proof. X の開集合 U に対して

$$\mathcal{F}^\dagger(U) = \left\{ \sigma : U \rightarrow \prod_{x \in U} \mathcal{F}_x \mid \forall x \in U, x \in \exists V \subset U : \text{open}, \exists s \in \mathcal{F}(V) \text{ s.t. } \sigma(y) = s_y (\forall y \in V) \right\}$$

とする. ただし, σ は任意の $x \in U$ に対して $\sigma(x) \in \mathcal{F}_x$ とする. また, $V \subset U$ なる開集合に対し,

$$\begin{array}{ccc} \rho_{U,V}^{\mathcal{F}^\dagger} : \mathcal{F}^\dagger(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}^\dagger(V) \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ \sigma & \longmapsto & \sigma|_V \end{array}$$

が定義できる. 実際, 任意の $x \in V$ をとる. $V \subset U$ であり, $\sigma \in \mathcal{F}^\dagger(U)$ より

$$x \in \exists U_0 \subset U : \text{open}, \exists s \in \mathcal{F}(U_0) \text{ s.t. } \sigma(y) = s_y (\forall y \in U_0)$$

$V_0 = U_0 \cap V$, $t = s|_{V_0}$ とすると任意の $y \in V_0$ に対して

$$\sigma(y) = \sigma|_V(y) = s_y$$

さらに帰納極限の定義から

$$\sigma|_V(y) = t_y$$

次に $\mathcal{F}^\dagger(U)$ がアーベル群, つまり $\sigma, \tau \in \mathcal{F}^\dagger(U)$ ならば $\sigma + \tau \in \mathcal{F}^\dagger(U)$ を示そう.

$\sigma, \tau \in \mathcal{F}^\dagger(U)$ より任意の $x \in U$ に対して

$$x \in \exists U_0 \subset U : \text{open}, \exists s \in \mathcal{F}(U_0) \text{ s.t. } \sigma(y) = s_y (\forall y \in U_0)$$

$$x \in \exists V_0 \subset U : \text{open}, \exists t \in \mathcal{F}(V_0) \text{ s.t. } \tau(z) = t_z (\forall z \in V_0)$$

を満たす. いま $W = U_0 \cap V_0$, $s' = s|_W$, $t' = t|_W$ とすると,

$$\begin{aligned} x \in W \subset U : \text{open}, s', t' \in \mathcal{F}(W) \text{ s.t. } (\sigma + \tau)(y) &= \sigma(y) + \tau(y) \\ &= s_y + t_y \\ &= (s + t)_y (\forall y \in W) \end{aligned}$$

よって $\sigma + \tau \in \mathcal{F}^\dagger(U)$ また明らかに可換. よって $\mathcal{F}^\dagger(U)$ はアーベル群.

また, 通常の制限で制限写像を定義しているため, \mathcal{F}^\dagger は前層となる.

更に層となることを示そう.

U を X の開集合とし, $\{U_i\}_i$ をその開被覆とする. $\sigma \in \mathcal{F}^\dagger(U)$ が任意の i に対して $\sigma|_{U_i} = 0$ とする. つまり任意の $x \in U_i$ に対して $\sigma(x) = 0$ とする. U_i は U を被覆するので結局 $\sigma = 0$ となる.

次に, $\sigma_i \in \mathcal{F}^\dagger(U_i)$ とし, $\sigma_i|_{U_i \cap U_j} = \sigma_j|_{U_i \cap U_j}$ と仮定すると,

$$\begin{array}{ccc} \sigma : U & \longrightarrow & \prod_{x \in U} \mathcal{F}_x \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ x & \longmapsto & \sigma_i(x) \end{array}$$

ただし, $x \in U_i$. すると, σ は $\sigma_i \in \mathcal{F}^\dagger(U_i)$ を張り合わせて作っているのだからこれは $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ となることが容易にわかる. よって, \mathcal{F}^\dagger は層になる. ■

Proposition 1.3.10. 層化の射 $\theta : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^\dagger$ に対して、その茎の射 $\theta_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{F}_x^\dagger$ は同型である。

Lemma 1.3.11. \mathcal{F} を X 上の層とし、 \mathcal{F}' を \mathcal{F} の部分層とする。このとき開集合 U を $\mathcal{F}(U)/\mathcal{F}'(U)$ に対応させるものは前層になる。

Proof. この対応を \mathcal{G} とおく。 $V \subset U$ なる開集合 U, V をとる。制限写像を

$$\begin{array}{ccc} \rho_{U,V}^{\mathcal{G}} : \mathcal{F}(U)/\mathcal{F}'(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}(V)/\mathcal{F}'(V) \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ s + \mathcal{F}'(U) & \longmapsto & \rho_{U,V}^{\mathcal{F}}(s) + \mathcal{F}'(V) \end{array}$$

とすると、これは well-defined である。また、 $U \subset V \subset W$ なる開集合の組に対して

$$\rho_{U,W}^{\mathcal{G}} = \rho_{V,W}^{\mathcal{G}} \circ \rho_{U,V}^{\mathcal{G}}$$

が成り立つことは制限写像の定義から明らかである。よって \mathcal{G} は前層。 ■

Definition 1.3.5. Lem:?? で定義した前層の層化を \mathcal{F}/\mathcal{F}' と書いて、商層 (quotient sheaf) という。

Definition 1.3.6. $\alpha : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ を前層の射とする。このとき開集合 U に対して $U \mapsto \text{Ker}(\alpha(U))$ とするものは \mathcal{F} の部分層になる。これを $\text{Ker } \alpha$ と書いて、 α の核 (kernel of α) という。

更に、 $U \mapsto \text{Im}(\alpha(U))$ は一般には前層となるので、この層化を $\text{Im } \alpha$ と書いて、 α の像 (image of α) という。

また、 $U \mapsto \text{Coker}(\alpha(U)) = \mathcal{G}(U)/\text{Im}(\alpha(U))$ は一般には前層となるので、この層化を $\text{Coker } \alpha$ と書いて、 α の余核 (cokernel of α) という。

Lemma 1.3.12. \mathcal{F}, \mathcal{G} を X 上の層, \mathcal{F}' を \mathcal{F} の部分層, $\alpha : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ を前層の射とする。このとき、

$$\begin{aligned} (\mathrm{Ker} \alpha)_x &= \mathrm{Ker} \alpha_x \\ (\mathrm{Im} \alpha)_x &= \mathrm{Im} \alpha_x \\ (\mathrm{Coker} \alpha)_x &= \mathrm{Coker} \alpha_x \\ (\mathcal{F}/\mathcal{F}')_x &= \mathcal{F}_x/\mathcal{F}'_x \end{aligned}$$

が成り立つ。

Proof. $\mathcal{Q}(U) = \mathcal{F}(U)/\mathcal{F}'(U)$ とおく。

このとき、アーベル群の完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}'(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{Q}(U) \longrightarrow 0$$

が作れる。帰納極限は完全列を完全列に移すので、また Prop:?? より

$$0 \longrightarrow \varinjlim \mathcal{F}'(U) \longrightarrow \varinjlim \mathcal{F}(U) \longrightarrow \varinjlim \mathcal{Q}(U) \longrightarrow 0$$

を得る。よって

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}'_x \longrightarrow \mathcal{F}_x \longrightarrow (\mathcal{F}/\mathcal{F}')_x \longrightarrow 0$$

したがって、

$$\mathcal{F}_x/\mathcal{F}'_x \simeq (\mathcal{F}/\mathcal{F}')_x$$

を得る。

次に

$$\begin{aligned} (\mathrm{Ker} \alpha)_x &= \{s_x \in \mathcal{F}_x \mid \alpha(U)(s) = 0, x \in U : \text{open}, s \in \mathcal{F}(U)\} \\ &= \{s_x \in \mathcal{F}_x \mid \alpha_x(s_x) = 0, x \in U : \text{open}, s \in \mathcal{F}(U)\} \\ &= \mathrm{Ker} \alpha_x \end{aligned}$$

を得る。同様に

$$\begin{aligned} (\mathrm{Im} \alpha)_x &= \{t_x \in \mathcal{G}_x \mid x \in \exists U : \text{open}, \exists s \in \mathcal{F}(U) \text{ s.t. } t = \alpha(U)(s)\} \\ &= \{(\alpha(U)(s))_x \in \mathcal{G}_x \mid x \in U : \text{open}, s \in \mathcal{F}(U)\} \\ &= \{\alpha_x(s_x) \in \mathcal{G}_x \mid s_x \in \mathcal{F}_x\} \\ &= \mathrm{Im} \alpha_x \end{aligned}$$

を得る。また、 $(\mathcal{F}/\mathcal{F}')_x = \mathcal{F}_x/\mathcal{F}'_x$ より

$$(\mathrm{Coker} \alpha)_x = (\mathcal{G}/\mathrm{Im} \alpha)_x = \mathcal{G}_x/\mathrm{Im} \alpha_x = \mathrm{Coker} \alpha_x$$

■

Definition 1.3.7. 層の列

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{G} \xrightarrow{\beta} \mathcal{H}$$

が完全とは、 $\text{Im } \alpha = \text{Ker } \beta$ が成り立つことをいう。

Proposition 1.3.13. 層の列に対して次が成り立つ。

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \text{ が完全} \iff \text{任意の } x \in X \text{ に対して } \mathcal{F}_x \longrightarrow \mathcal{G}_x \longrightarrow \mathcal{H}_x \text{ が完全}$$

Proof. 明らか。 ■

Definition 1.3.8. X, Y を位相空間, $f: X \rightarrow Y$ を連続写像とする。このとき、 X 上の層 \mathcal{F} , Y 上の層 \mathcal{G} に対して、新たな Y 上の層 $f_*\mathcal{F}$ が

$$V \mapsto \mathcal{F}(f^{-1}(V))$$

によって定義できる。これを \mathcal{F} の順像 (direct image of \mathcal{F}) という。

また、

$$U \mapsto \varinjlim_{V \supset f(U)} \mathcal{G}(V)$$

で定義できる新たな X 上の前層 $f^*\mathcal{G}$ の層化 $f^*\mathcal{G}$ を \mathcal{G} の逆像 (inverse image of \mathcal{G}) という。

Proposition 1.3.14. 上の状況で

$$(f^*\mathcal{G})_x = \mathcal{G}_{f(x)} \quad \forall x \in X$$

Proof.

$$(f^*\mathcal{G})_x = \varinjlim_{x \in U} (f^*\mathcal{G})(U) = \varinjlim_{x \in U} \varinjlim_{f(U) \subset V} \mathcal{G}(V) = \mathcal{G}_{f(x)}$$

最後の等号は明らか。 ■

Remark . V を Y の開集合とする。このとき自然な単射 $i: V \rightarrow Y$ に対して

$$i^*\mathcal{G} = \mathcal{G}|_V$$

が成り立つ。

Proposition 1.3.15. $f: X \rightarrow Y$ を位相空間の間の連続写像とし、 \mathcal{F} を X 上の層、 \mathcal{G} を Y 上の層とする。このとき

$$\text{Hom}_{\text{Sh}(X)}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) \simeq \text{Hom}_{\text{Sh}(Y)}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$$

ただし、 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ は圏 \mathcal{C} で $X \rightarrow Y$ なる射全体を表し、 $\text{Sh}(X)$ は X 上の層全体を

表す．

Proof. 層化の普遍性より $\theta: f^*\mathcal{G} \rightarrow f^*\mathcal{G} = (f^*\mathcal{G})^\dagger$ を層化の射とすると,

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathrm{PreSh}(X)}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) & \xrightarrow{\simeq} & \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ph}(X)}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \alpha & \longmapsto & \tilde{\alpha} \circ \theta \end{array}$$

が成り立つ．つまり

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{PreSh}(X)}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sh}(Y)}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$$

を示せばいい．次に X 上の開集合 U に対して

$$f^*\mathcal{G}(U) = \varinjlim_{V \supset f(U)} \mathcal{G}(V)$$

なので, $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{PreSh}(X)}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F})$ に対して

$$\varphi(U): \varinjlim_{V \supset f(U)} \mathcal{G}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$$

を与えることは帰納極限の定義より $f(U) \subset V$ なる開集合 V に対して

$$\psi'(V): \mathcal{G}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$$

を $f(U) \subset V' \subset V$ ならば,

$$\psi'(V) = \psi'(V') \circ \rho_{V, V'}^{\mathcal{G}}$$

となるように与えることである．すなわち $\psi'(V)$ は

$$\psi(V): \mathcal{G}(V) \rightarrow \mathcal{F}(f^{-1}(V))$$

と $\rho_{f^{-1}(V), U}^{\mathcal{F}}$ を合成したものである．(帰納系の選び方によらない．)

したがって, $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{PreSh}(X)}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F})$ を与えることは, $\psi \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ph}(Y)}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$ を与えることと等しい． ■

Example 1.3.16. \mathcal{F} を X 上の層とする．このとき

$$\mathrm{Supp} \mathcal{F} = \{x \in X \mid \mathcal{F}_x \neq 0\}$$

と定義して \mathcal{F} の台 (Supports of \mathcal{F}) という．一般にはこれは閉集合ではない．

1.3.1 \mathfrak{B} -sheaf

\mathfrak{B} -sheaf はアフィンスキームの構成にも必要な概念で, ラフに言えばすべての開集合 U に対して $\mathcal{F}(U)$ が定まっているものではなく, 開基 \mathfrak{B} の元 U に対してだけ定まっている層を \mathfrak{B} -sheaf という．

Definition 1.3.9. 位相空間 X の開基 \mathfrak{B} が有限交叉で閉じているとは、任意の $U, V \in \mathfrak{B}$ に対して $U \cap V \in \mathfrak{B}$ が成り立つことをいう。

Example 1.3.17. 環 A の素イデアルの集合 $\text{Spec } A$ の基本開集合による開基 $\{D(f)\}_{f \in A}$ は有限交叉で閉じている。

Definition 1.3.10. X を位相空間、 \mathfrak{B} をその開基とする。このとき \mathcal{F} が \mathfrak{B} -前層 (\mathfrak{B} -presheaf) であるとは、

- $U \in \mathfrak{B}$ に対して $\mathcal{F}(U)$ はアーベル群。
- $V \subset U \in \mathfrak{B}$ に対して群準同型 $\rho_{U,V} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ が定まる。

で、

- (1) $\rho_{U,U} = \text{id}_{\mathcal{F}(U)}$
- (2) 任意の開集合 $W \subset V \subset U$ に対して $\rho_{U,W} = \rho_{V,W} \circ \rho_{U,V}$ となる。

を満たすときをいう。

Definition 1.3.11. \mathfrak{B} が有限交叉で閉じているとする。このとき \mathfrak{B} -前層が層の条件を満たすとき \mathfrak{B} -層 (\mathfrak{B} -sheaf) という。

Proposition 1.3.18. \mathcal{F} を \mathfrak{B} -層とする。このとき、任意の \mathfrak{B} の元でない開集合 V に対して

$$\mathcal{F}(V) = \left\{ (s_U)_U \in \prod_{\substack{U \in \mathfrak{B} \\ U \subset V}} \mathcal{F}(U) \mid \forall U, U' \in \mathfrak{B}, s_U|_{U \cap U'} = s_{U'}|_{U \cap U'} \right\}$$

とおく。演算を

$$(s_U)_U + (t_U)_U = (s_U + t_U)_U$$

で定めるとアーベル群になる。

また、 $V' \subset V$ に対して制限写像 $\rho_{V,V'} : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(V')$ を $(s_U)_U \in \mathcal{F}(V)$ を $V' \subsetneq U \subset V$ なる s_U は無視するということで定義する。

Proof. Claim (4)(Uniqueness) が成立する。

\mathfrak{B} の元でない開集合 V をとり開被覆 $\{V_i\}_i$ をとる。

$$V = \bigcup_{\substack{V_i \subset V \\ V_i \in \mathfrak{B}}} V_i$$

$s \in \mathcal{F}(V)$ が任意の i に対して $s|_{V_i} = 0$ とする。このとき $s = 0$ が成り立つ。実際、定義から $s = 0$ とは $U \subset V$ なる任意の $U \in \mathfrak{B}$ に対して $s_U \in \mathcal{F}(U)$ が 0 であることであ

る．まず， V の開被覆から U の開被覆 $\{U \cap V_i\}_i \subset \mathfrak{B}$ を得る．また任意の i に対して $U \cap V_i \subset V_i$ より $s|_{V_i|_{U \cap V_i}} = s|_{U \cap V_i} = 0$ となる．従って任意の i に対して $s_U|_{U \cap V_i} = 0$ となる．今 \mathcal{F} は \mathfrak{B} -sheaf なので $s_U = 0$ によって $s = 0$ が分かる．

Claim (5)(Glueing local sections) が成立する．

$s_{V_i} \in \mathcal{F}(V_i)$ が任意の i, j に対して $s_{V_i}|_{V_i \cap V_j} = s_{V_j}|_{V_i \cap V_j}$ を満たすとする． $(s_U)_U \in \prod \mathcal{F}(U)$ を $U = V_i$ のとき $s_U = s_{V_i}$ で定義すれば， $(s_U)_U \in \mathcal{F}(V)$ で， $(s_U)_U|_{V_i} = s_{V_i}$ ■

1.4 Ringed Topological Space

Definition 1.4.1. 局所環付き空間とは位相空間 X と X 上の環の層 \mathcal{O}_X の組 (X, \mathcal{O}_X) で、任意の $x \in X$ に対して $\mathcal{O}_{X,x}$ が局所環となるものをいう．また、この \mathcal{O}_X を (X, \mathcal{O}_X) の **構造層 (structure sheaf)** という．また (X, \mathcal{O}_X) を単に \mathcal{O}_X と書くことがある．また、 $\mathcal{O}_{X,x}$ の唯一の極大イデアル \mathfrak{m}_x に対してその剰余体 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$ を X の点 x での **剰余体 (residue field of X at x)** といって $k(x)$ と書く．

Definition 1.4.2. 局所環付き空間の射とは

$$(f, f^\#) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

とは連続写像 $f : X \rightarrow Y$ と環の層の射 $f^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X$ の組 $(f, f^\#)$ で、任意の $x \in X$ に対して $f_x^\# : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ は局所射となるものをいう．(つまり $f_x^\#(\mathfrak{m}_{Y,f(x)}) \subset \mathfrak{m}_{X,x}$ を満たす．)

Prop:1.3.13 より

$$f^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X$$

を考えることは

$$f^\# : f^*\mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_X$$

を考えることに等しい．Def:1.4.2 の $f_x^\#$ は下の式で考えている．

Definition 1.4.3. 射 $(f, f^\#) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ が**開はめ込み (open immersion)**(resp. **閉はめ込み (closed immersion)**) とは連続写像 f が開はめ込み (resp. 閉はめ込み) ^aでかつ任意の $x \in X$ に対して $f_x^\#$ が同型 (resp. 全射) のときをいう．

^a $f : X \rightarrow Y$ が (位相的) 開 (閉) はめ込みとは X と $f(X)$ が同相で $f(X)$ が開 (閉) 集合のときをいう．

Definition 1.4.4. (X, \mathcal{O}_X) を局所環付き空間とする。 \mathcal{I} が \mathcal{O}_X のイデアル層 (sheaf of ideals of \mathcal{O}_X) とは任意の開集合 U に対して $\mathcal{I}(U)$ が $\mathcal{O}_X(U)$ のイデアルになっているときをいう。

Lemma 1.4.1. (X, \mathcal{O}_X) を局所環付き空間とする。 \mathcal{I} を \mathcal{O}_X のイデアル層とする。そして、

$$V(\mathcal{I}) = \{x \in X \mid \mathcal{I}_x \neq \mathcal{O}_{X,x}\}$$

とおく。(ちなみに上の諸々から $\mathcal{I}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$ が分かる。)

$j: V(\mathcal{I}) \hookrightarrow X$ を包含写像とする。すると

- $V(\mathcal{I})$ は X の閉集合
- $(V(\mathcal{I}), j^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}))$ は局所環付き空間
- $j^\#$ は自然な全射

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{I} = j_*(j^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}))$$

で $(j, j^\#): (V(\mathcal{I}), j^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ は閉はめ込みである。

Proof. Claim1. $V(\mathcal{I})$ は X の閉集合

$x \in X \setminus V(\mathcal{I}) = \{x \in X \mid \mathcal{I}_x = \mathcal{O}_{X,x}\}$ に対して $f_x = 1$ なる x の開近傍 U と $f \in \mathcal{I}(U)$ をとる。つまり $f|_V = 1|_V = 1$ なる x の開近傍 $V \subset U$ がある。すると任意の $y \in V$ に対して $f_y = 1 \in \mathcal{I}_y$ となって、この y に対して $\mathcal{I}_y = \mathcal{O}_{X,y}$ なので $V \subset X \setminus V(\mathcal{I})$ となって $X \setminus V(\mathcal{I})$ が開であることがわかる。

Claim2. $(V(\mathcal{I}), j^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}))$ は局所環付き空間

任意の $x \in V(\mathcal{I})$ に対して

$$(j^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}))_x = (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})_x = \mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{I}_x$$

は局所環。残りは自明。■

Proposition 1.4.2. $f: X \rightarrow Y$ を局所環付き空間の閉はめ込みとする。 Z を局所環付き空間 $V(\mathcal{I})$ とする。ただし、 $\mathcal{I} = \text{Ker } f^\# \subset \mathcal{O}_Y$ 。すると $X \simeq Z$ を自然な閉はめ込み $Z \hookrightarrow Y$ から得る。

Proof. まず次の完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*\mathcal{O}_X \longrightarrow 0$$

から Prop:?? より任意の $y \in Y$ に対して

$$\mathcal{O}_{Y,y}/\mathcal{I}_y = (f_*\mathcal{O}_X)_y$$

を得る。よって

$$(f_*\mathcal{O}_X)_y = \begin{cases} 0 & y \in Y \setminus V(\mathcal{I}) \\ \mathcal{O}_{Y,y}/\mathcal{I}_y & y \in V(\mathcal{I}) \end{cases} \quad \dots (*)$$

を得る。 $f(X)$ は Y の閉集合なので $x \in Y \setminus f(X)$ の開近傍 U で

$$f(X) \cap U = \emptyset$$

となるものがとれる。よって

$$f_*\mathcal{O}_X(U) = \mathcal{O}_X(f^{-1}(U)) = \mathcal{O}_X(\emptyset) = 0$$

したがって、

$$(f_*\mathcal{O}_X)_x = 0$$

また、 $x \in f(X)$ の開近傍 U に対して f での引き戻し $f^{-1}(U)$ は $y = f(x)$ の開近傍である。これを V とおく。逆に、 f は閉はめ込みなので、 X は $f(X)$ と同相なので X に自然に Y の相対位相が入る。つまり、任意の $x \in X$ の開近傍 U に対して $y = f(x) \in Y$ の開近傍 V が存在して $f^{-1}(V)$ とかける。よって、

$$(f_*\mathcal{O}_X)_x = \varinjlim_{U \ni x} f_*\mathcal{O}_X(U) = \varinjlim_{U \ni x} \mathcal{O}_X(f^{-1}(U)) = \varinjlim_{V \ni y} \mathcal{O}_X(V) = \mathcal{O}_{X,y}$$

つまり、

$$(f_*\mathcal{O}_X)_y = \begin{cases} 0 & y \in Y \setminus f(X) \\ \mathcal{O}_{X,x} & y = f(x) \end{cases}$$

(*) と比較すれば

$$V(\mathcal{J}) = f(X)$$

が分かる。なので、 $j : Z \hookrightarrow Y$ を包含写像とすると、 f から誘導される同相写像 $g : X \rightarrow Z$ に対して

$$f = j \circ g$$

で、

$$j_*\mathcal{O}_Z = \mathcal{O}_Y/\mathcal{J} \simeq f_*\mathcal{O}_X$$

がわかる。容易に

$$f_*\mathcal{O}_X = j_*g_*\mathcal{O}_X$$

が分かるので

$$\mathcal{O}_Z = (j^{-1} \circ j)_*\mathcal{O}_Z = (j^{-1})_*j_*\mathcal{O}_Z \simeq (j^{-1})_*j_*g_*\mathcal{O}_X = (j^{-1} \circ j)_*g_*\mathcal{O}_X = g_*\mathcal{O}_X$$

である。よって、 g は局所環付き空間の同型射である。 $f = j \circ g$ が局所環付き空間の射であることを確認するのは読者に委ねる。■

1.5 Schemes

後できちんとした定義を述べるが、スキーム (scheme) とは局所環付き空間で局所的にはアフィンスキーム (affine scheme) とみれる空間のことである。すなわち、先にアフィンスキームを定義せねばなるまい。

まず、 A を環とし $X = \operatorname{Spec} A$ とし、Zariski 位相が与えられてるとする。このとき、 X 上の層 \mathcal{O}_X を構成しよう。

まず、 $D(f) \subset X$ に対して $\mathcal{O}_X(D(f)) = A_f (= A[1/f])$ とする。次に射 $\rho_{D(f), D(g)} : \mathcal{O}_X(D(f)) \rightarrow \mathcal{O}_X(D(g))$ を定義しよう。

まず、 $D(g) \subset D(f)$ とする。つまり

$$g \in \sqrt{fA}$$

である。これは

$$\exists m \in \mathbf{N} - \{0\}, \exists b \in A \text{ s.t. } g^m = fb \quad (1.1)$$

を意味する。よって f は A_g で単元である。実際上の式に両辺 $1/g^m$ をかけることによって

$$f^{-1} = b/g^m$$

を得る。これによって制限写像 $A_f \rightarrow A_g$ を

$$a/f^n \mapsto ab^n/g^{mn}$$

で定義できる。もし $D(f) = D(g)$ なら $A_f \rightarrow A_g$ は同型射になる。(計算すれば容易にわかる。) 従って、 $\mathcal{O}_X(D(f))$ は f の選び方に依らない。 $\{D(f)\}_f$ は有限交叉で閉じた開基であったから、これは \mathfrak{B} -presheaf である。

Proposition 1.5.1. A を環、 $X = \operatorname{Spec} A$ とする。このとき以下が成り立つ。

- (1) \mathcal{O}_X を環の \mathfrak{B} -層とする。 \mathcal{O}_X が誘導する X 上の層 \mathcal{O}_X は $\mathcal{O}_X(X) = A$ となる。
- (2) 任意の $p \in X$ に対して、茎 $\mathcal{O}_{X,p}$ は A_p への標準的な同型がある。特に、 (X, \mathcal{O}_X) は局所環付き空間になる。

Proof. まず、 $X = D(1)$ なので $\mathcal{O}_X(X) = \mathcal{O}_X(D(1)) = A$ 。次に、開集合 $U = X$ について Uniqueness 条件を確認する。ほかの基本開集合も同様に示される。

$$X = \bigcup_i D(f_i) = D\left(\sum_i f_i A\right)$$

開被覆 $\{D(f_i)\}_i$ をとる。いま $s \in \mathcal{O}_X(X) = A$ に対して $s|_{D(f_i)} = 0$ とする。このとき、ある $m_i \geq 1$ があって、

$$f_i^{m_i} s = 0$$

いま、

$$X = \bigcup_i D(f_i) = \bigcup_i D(f_i^{m_i}) = D\left(\sum_i f_i^{m_i} A\right)$$

これは, $1 \in \sum f_i^{m_i} A$ を意味する. よって

$$s \in \sum_i s f_i^{m_i} A = 0$$

よって $s = 0$ を得る.

次に, Glueing local sections 条件を確認する. $s_i \in \mathcal{O}_X(D(f_i)) = A_{f_i}$ をとる. そして, 任意の i, j に対して, $s_i|_{D(f_i) \cap D(f_j)} = s_j|_{D(f_i) \cap D(f_j)}$ が成り立つとする. $s_i \in A_{f_i}$ よりある $m_i \geq 1$ があって

$$s_i = \frac{b_i}{f_i^{m_i}}$$

実は m_i は i に関わらず選ぶことが出来る. X は準コンパクトなので有限個の $i \in I$ で被覆できる. なので $\max\{m_i\}_{i \in I}$ を m とすると, $m \geq m_i$ なので,

$$s_i = \frac{b_i}{f_i^{m_i}} = \frac{b_i f_i^{m-m_i}}{f_i^m} = \frac{c_i}{f_i^m}$$

となる. $D(f_i) \cap D(f_j) = D(f_i f_j)$ であることを考慮すれば,

$$\begin{aligned} \frac{b_i}{f_i^m} \Big|_{D(f_i) \cap D(f_j)} &= \frac{b_i c_i^m}{(f_i^{n_i} f_j^{n_i})^m} \\ \frac{b_j}{f_j^m} \Big|_{D(f_i) \cap D(f_j)} &= \frac{b_j c_j^m}{(f_i^{n_j} f_j^{n_j})^m} \end{aligned}$$

よって, 仮定から,

$$\frac{b_i c_i^m}{(f_i^{n_i} f_j^{n_i})^m} = \frac{b_j c_j^m}{(f_i^{n_j} f_j^{n_j})^m}$$

なので,

$$(f_i f_j)^{r_{i,j}} (b_i c_i^m (f_i^{n_j} f_j^{n_j})^m - b_j c_j^m (f_i^{n_i} f_j^{n_i})^m) = 0$$

となる $r_{i,j}$ がある. しかし, 上と同様に $r = \max\{r_{i,j}\}_{(i,j) \in I \times I}$ とおくと,

$$(f_i f_j)^r (b_i c_i^m (f_i^{n_j} f_j^{n_j})^m - b_j c_j^m (f_i^{n_i} f_j^{n_i})^m) = 0$$

で, 上で見たように, $1 = \sum a_j f_j^{m+r_{i,j}}$ なる $a_j \in A$ がとれる. $s = \sum a_j b_j f_j^{r_{i,j}} \in A$ とおくと,

$$f_i^{m+r_{i,j}} s = \sum_j b_j f_j^{r_{i,j}} f_i^{m+r_{i,j}} = \sum_j a_j b_i f_i^{r_{i,j}} f_j^{m+r_{i,j}} = b_i f_i^{r_{i,j}}$$

■

Definition 1.5.1. 上で定義した局所環付き空間 $(\text{Spec } A, \mathcal{O}_{\text{Spec } A})$ を **アフィンスキーム (affine scheme)** という.

Example 1.5.2. 環 R に対して $\mathbf{A}_R^n := \operatorname{Spec} R[X_1, \dots, X_n]$ とおく. これを R 上の相対次元 n のアフィン空間 (affine space of relative dimension n over R) という. もちろん $(\mathbf{A}_R^n, \mathcal{O}_{\mathbf{A}_R^n})$ はアフィンスキーム

Lemma 1.5.3. A を整域とし K をその商体とする. 素イデアル 0 に対応する $X = \operatorname{Spec} A$ の点を ξ とする. このとき

$$\mathcal{O}_{X,\xi} = K$$

が成り立つ. さらに, 任意の空でない開集合 $U \subset X$ と $\xi \in U$ に対して標準的な準同型

$$\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_{X,\xi}$$

は単射となる. 開集合の組 $V \subset U$ に対して制限

$$\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_X(V)$$

は単射となる.

Proof. Prop:1.5.1(2) より

$$\mathcal{O}_{X,\xi} = A_\xi = K$$

を得る.

$U = D(f)$ とすると, $\mathcal{O}_X(U) = A_f \subset K$. 一般に

$$U = \bigcup_i D(f_i)$$

と置く. $s \in \mathcal{O}_X(U)$ を飛ばすと $0 \in K$ になるとする. 各開被覆 $D(f_i) \subset U$ への制限を考えると

$$s|_{D(f_i)} = 0$$

が任意の i で成り立つので, $s = 0$ である. よって $\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_{X,\xi} \subset K$ は単射.

開集合の組 $\xi \in V \subset U$ に対して制限 $\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_X(V)$ に対して帰納極限の定義より図式

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X(U) & \longrightarrow & \mathcal{O}_X(V) \\ \downarrow & \circlearrowleft & \searrow \\ & \mathcal{O}_{X,\xi} & \end{array}$$

が可換となるので, 制限は単射である. ■

Lemma 1.5.4. $X = \operatorname{Spec} A$ をアフィンスキームとし, $g \in A$ をとる. このとき開集合 $D(g)$ は X から誘導される局所環付き空間で $\operatorname{Spec} A_g$ に同型なアフィンスキームになる.

Proof. $Y = \operatorname{Spec} A_g$ と置く. 局所化と素イデアルの対応より標準的な開はめ込み

$$i: Y \rightarrow X$$

がある ($\operatorname{Im} i = D(g)$)

$D(h) \subset D(g)$ とする. $A \xrightarrow{\varphi} A_g$ とする. また $\varphi(h) = \bar{h}$ と置く. このとき標準的な同型

$$\mathcal{O}_X(D(h)) = A_h \simeq (A_g)_{\bar{h}} = \mathcal{O}_Y(D(\bar{h})) = i_* \mathcal{O}_Y(D(h))$$

今 $A_h \simeq (A_g)_{\bar{h}}$ は感覚的には

$$(A_g)_{\bar{h}} = (A[1/g])_{\bar{h}} = A[1/g, 1/\bar{h}]$$

で, $D(h) \subset D(g)$ より $h^n = gb$ となる $n \in \mathbf{N} - \{0\}$ と $b \in A$ がある. よって

$$A[1/g, 1/\bar{h}] = A[b/h^n, 1/\bar{h}] = A[1/h] = A_h$$

具体的にはまず, φ が単射ではないとき,

$$\operatorname{Ker} \varphi \neq 0 \Leftrightarrow A_g = 0$$

に注意すると (よって $(A_g)_{\bar{h}} = 0$), 定義から $\operatorname{Ker} \varphi \ni a \neq 0$ とすると

$$\exists m \in \mathbf{N} \text{ s.t. } g^m a = 0$$

を満たす. また $h^n = gb$ より $h^{nm} a = g^m a b^m = 0$ より $\operatorname{Ker}(A \rightarrow A_h)$ は 0 でない. 従って, $A_h = 0$ だから自明に同型である. よって φ を単射とする.

$$(A_g)_{\bar{h}} \rightarrow A_h$$

を,

$$\frac{a}{g^m} \frac{1}{\bar{h}^k} \mapsto \frac{ab^m}{h^{mn}} \frac{1}{h^k} = \frac{ab^m}{h^{mn+k}}$$

で定義する. これは簡単に準同型で $0 \leq k < n$ としてよい. 次に

$$A_h \rightarrow (A_g)_{\bar{h}}$$

を,

$$\frac{a}{h^n} \mapsto \frac{\bar{a}}{\bar{h}^n}$$

ただし, $0 \leq k < n$ とする. これらは互いに逆射を与えるので, $\{D(h)\}_h$ は $D(g)$ の開基となるので, i は (Y, \mathcal{O}_Y) から $(D(g), \mathcal{O}_X|_{D(g)}) \subset (X, \mathcal{O}_X)$ への同型を誘導する. (Refer to Exercises 2.7) ■

Definition 1.5.2. スキーム (scheme) とは局所環付き空間 (X, \mathcal{O}_X) で開被覆 $\{U_i\}_i$ に対して $(U_i, \mathcal{O}_X|_{U_i})$ がアフィンスキームになるものが存在するときをいう. また $\mathcal{O}_X(U)$ の元は (やや不適切であるが) U 上の正則関数 (regular functions on U) という. しかし, 層の関数としての側面をよく表している. (Refer to Exercises 3.4 and Proposition 4.4)

明らかにアフィンスキームはスキームである. また, 局所環付き空間 X が開被覆 $\{U_i\}_i$ に対して $(U_i, \mathcal{O}_X|_{U_i})$ がスキームだったら X はスキームである. 逆に次の命題が従う.

Proposition 1.5.5. X をスキームとする. このとき任意の開集合 $U \subset X$ に対して局所環付き空間 $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ はまたスキームになる.

Proof. 定義より $X = \bigcup_i U_i$ で U_i は開集合で, アフィンスキームになるものがある. $U \cap U_i$ がスキームとなることを示せば十分である. ■

Definition 1.5.3. X をスキームとする. U を X の開集合とする. スキーム $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ を X の開部分スキーム (open subscheme) 更に $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ がアフィンスキームになるとき U をアフィン開集合 (affine open subset) という.

以下, X の開集合 U はスキームの構造が与えられているとする.

Definition 1.5.4. X をスキーム, $f \in \mathcal{O}_X(X)$ とする.

$$X_f := \{x \in X \mid f_x \in \mathcal{O}_{X,x}^\times\}$$

ただし, A^\times は A の単元群である. (Liu の Definition 3.11. では*の記号を用いている.)

次の条件を考えよう.

X は有限アフィン開被覆 $\{U_i\}_i$ があって $U_i \cap U_j$ はまた有限アフィン開被覆を持つ.

便宜上この条件を条件 A と呼称する.

Proposition 1.5.6. X をスキームとし $f \in \mathcal{O}_X(X)$ とする. このとき X_f は X の開集合で, 更に, X が条件 A を満たすなら, 制限 $\mathcal{O}_X(X) \rightarrow \mathcal{O}_X(X_f)$ は同型

$$\mathcal{O}_X(X)_f \simeq \mathcal{O}_X(X_f)$$

を誘導する.

Proof. $x \in X_f$ とする. x の開近傍 U と $g \in \mathcal{O}_X(U)$ があって, $f_x g_x = 1$ を満たすものがある. $f_x g_x = (fg)_x$ よりある x の開近傍 $V \subset U$ があって $fg|_V = 1$ を満たす. した

がって、 $V \subset X_f$ となる．よって X_f は開集合である．

更に、 V が動くにつれて f の逆元 $g \in \mathcal{O}_X(V)$ を張り合わせると $f|_{X_f}$ の $\mathcal{O}_X(X_f)$ での逆元を得る．

詳しく言えば、 X_f の上の V を集めた開被覆 $\{V_i\}_i$ を取り、 $fg_i|_{V_i} = 1$ なる $g_i \in \mathcal{O}_X(V_i)$ を考えれば任意の i, j に対して

$$fg_i|_{V_i \cap V_j} = 1 = fg_j|_{V_i \cap V_j}$$

より

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) - (\text{右辺}) &= fg_i|_{V_i \cap V_j} - fg_j|_{V_i \cap V_j} \\ &= f|_{V_i \cap V_j}(g_i|_{V_i \cap V_j} - g_j|_{V_i \cap V_j}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

また、 $f|_{V_i}$ は単元なので逆元 $(f|_{V_i})^{-1}$ がある．また、

$$f|_{V_i \cap V_j} = (f|_{V_i})|_{V_i \cap V_j}$$

なので、

$$\begin{aligned} f|_{V_i \cap V_j}((f|_{V_i})^{-1}|_{V_i \cap V_j}) &= (f|_{V_i})|_{V_i \cap V_j}((f|_{V_i})^{-1}|_{V_i \cap V_j}) \\ &= ((f|_{V_i})(f|_{V_i})^{-1})|_{V_i \cap V_j} \\ &= 1 \end{aligned}$$

よって $f|_{V_i \cap V_j}$ はまた単元で $g_i|_{V_i \cap V_j} = g_j|_{V_i \cap V_j}$ を得る．

\mathcal{O}_X は層なので、貼り合わせ条件より $g|_{V_i} = g_i$ なる $g \in \mathcal{O}_X(X_f)$ がある．この g が $f|_{X_f}$ の逆元になっている．

よって制限 $\mathcal{O}_X(X) \rightarrow \mathcal{O}_X(X_f)$ から準同型

$$\alpha : \mathcal{O}_X(X)_f \rightarrow \mathcal{O}_X(X_f); \frac{x}{f^n} \mapsto \rho_{X, X_f}(x)f^{-n} = \rho_{X, X_f}(x)g^n$$

を誘導する．($\mathcal{O}_X(X)$ は環なので $\mathcal{O}_X(X)_f$ は $\{f^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ での局所化であることに注意しよう．) ここで条件 A を仮定すれば、 X は有限アフィン開被覆 $\mathcal{U} = \{U_i\}_i$ を持つ．

よって、

$$X_f = \bigcup_i U_i \cap X_f = \bigcup_i V_i = \bigcup_i D(f|_{U_i})$$

ここで、 $U_i = \text{Spec } A_i$ とすると

$$\begin{aligned} U_i \cap X_f &= \{x \in X \cap \text{Spec } A_i \mid f_x \in \mathcal{O}_{X, x}^\times\} \\ &= \{x \in \text{Spec } A_i \mid f_x \in \mathcal{O}_{X, x}^\times\} \\ &= \{x \in \text{Spec } A_i \mid f_x \in (\mathcal{O}_X|_{\text{Spec } A_i, x})^\times\} \\ &= \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A_i \mid f_{\mathfrak{p}} \in A_{i, \mathfrak{p}}^\times\} \end{aligned}$$

ここで、素イデアルの局所化 $A_{\mathfrak{p}}$ が局所環でその極大イデアルが $A_{\mathfrak{p}} \setminus A_{\mathfrak{p}}^\times = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ となることに注意すると

$$\begin{aligned} \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A_i \mid f_{\mathfrak{p}} \in A_{i, \mathfrak{p}}^\times\} &= \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A_i \mid f_{\mathfrak{p}} \notin \mathfrak{p}A_{i, \mathfrak{p}}\} \\ &= \{\} \end{aligned}$$

Lem:1.5.3 より $\mathcal{O}_X(U_i)_f = \mathcal{O}_X(V_i)$

今以下の完全系列を得る.

$$C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{O}_X) : 0 \longrightarrow \mathcal{O}_X(X) \xrightarrow{d_0} \bigoplus_i \mathcal{O}_X(U_i) \xrightarrow{d_1} \bigoplus_{i,j} \mathcal{O}_X(U_i \cap U_j)$$

ただし $d_0 : s \mapsto (s|_{U_i})_i, d_1 : (s_i)_i \mapsto (s_i|_{U_i \cap U_j} - s_j|_{U_i \cap U_j})_{i,j}$ とする. (有限個なら直積 \prod と直和 \bigoplus は同じ)

次にテンソルをとることは左完全関手なので $C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_X(X)} \mathcal{O}_X(X)_f$ はまた, 完全列である. よってこれは次の可換図式を与える.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_X(X)_f & \longrightarrow & \bigoplus_i \mathcal{O}_X(U_i)_f & \longrightarrow & \bigoplus_{i,j} \mathcal{O}_X(U_i \cap U_j)_f \\ & & \downarrow \alpha & & & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_X(X_f) & \longrightarrow & \bigoplus_i \mathcal{O}_X(V_i) & \longrightarrow & \bigoplus_{i,j} \mathcal{O}_X(V_i \cap V_j) \end{array}$$

■

1.5.1 Morphism of schemes

Definition 1.5.5. $f : X \rightarrow Y$ がスキームの射 (morphism of schemes) とは局所環付き空間としての射とする.

環の射 $\varphi : A \rightarrow B$ が誘導する射 $\mathrm{Spec} B \rightarrow \mathrm{Spec} A$ を φ^a と書くことにする.
つまり $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec} B$ に対して $\varphi^a(\mathfrak{p}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{p})$

Proposition 1.5.7. $\varphi : A \rightarrow B$ を環の射とする. このとき

$$(\varphi^a, (\varphi^a)^\#) : \mathrm{Spec} B \rightarrow \mathrm{Spec} A$$

は $(\varphi^a)^\#(\mathrm{Spec} A) = \varphi$ を満たすスキームの射である.

Proof. $X = \mathrm{Spec} B, Y = \mathrm{Spec} A$ と置く. 任意の $f \in A$ に対して

$$(\varphi^a)^{-1}(D(f)) = D(\varphi(f))$$

が成り立ち, 実際

$$\begin{aligned} (\varphi^a)^{-1}(D(f)) &= \{\mathfrak{p} \in X \mid \varphi^a(\mathfrak{p}) \in D(f)\} \\ &= \{\mathfrak{p} \in X \mid f \notin \varphi^a(\mathfrak{p})\} \\ &= \{\mathfrak{p} \in X \mid f \notin \varphi^{-1}(\mathfrak{p})\} \\ &= \{\mathfrak{p} \in X \mid \varphi(f) \notin \mathfrak{p}\} \\ &= D(\varphi(f)) \end{aligned}$$

である． φ から誘導される環の射

$$(\varphi^a)^\#(D(f)) : \mathcal{O}_Y(D(f)) = A_f \rightarrow B_{\varphi(f)} = \mathcal{O}_X(D(\varphi(f))) = (\varphi^a)_* \mathcal{O}_X(D(f))$$

これは制限写像と可換 (compatible という意味で) になる．よって層の射

$$(\varphi^a)^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow \varphi_* \mathcal{O}_X$$

に拡張できる．更に，任意の $\mathfrak{q} \in X$ に対して φ から誘導される環の射

$$(\varphi^a)^\#_{\mathfrak{q}} : A_{\varphi^a(\mathfrak{q})} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$$

は局所射で，実際

$$\begin{aligned} (\varphi^a)^\#_{\mathfrak{q}}(\varphi^a(\mathfrak{q})A_{\varphi^a(\mathfrak{q})}) &= \{\varphi(a)/\varphi(p) \mid a \in \varphi^a(\mathfrak{q}), p \notin \varphi^a(\mathfrak{q})\} \\ &= \{\varphi(a)/\varphi(p) \mid \varphi(a) \in \mathfrak{q}, \varphi(p) \notin \mathfrak{q}\} \\ &\subset \{b/q \mid b \in \mathfrak{q}, q \notin \mathfrak{q}\} \\ &= \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \end{aligned}$$

よって $(\varphi^a, (\varphi^a)^\#)$ は局所環付き空間の射になる．構成により

$$(\varphi^a)^\#(Y) : \mathcal{O}_Y(Y) = A \rightarrow B = \mathcal{O}_X(X) = (\varphi^a)_* \mathcal{O}_X(Y)$$

で $(\varphi^a)^\#(Y) = \varphi$ を満たす． ■

Example 1.5.8. A を環とする． $f \in A$ に対して $\varphi : A \rightarrow A_f$ を自然な射とする．よって Prop:1.5.7 より $\varphi^a : \operatorname{Spec} A_f \rightarrow \operatorname{Spec} A$ はアフィンスキームの射で， $\operatorname{Spec} A_f \simeq D(f)$ で， $D(f) \rightarrow \operatorname{Spec} A$ は開はめ込みである．

Example 1.5.9. X をスキームとする． $x \in X$ に対して標準的な射 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow X$ がある．実際 $x \in U$ なるアフィン開集合に対して標準的な射 $\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ から誘導される射 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \operatorname{Spec} \mathcal{O}_X(U) = U$ がとれる．また $U \hookrightarrow X$ は自然に開はめ込みだと見れるので射 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow X$ を得る．これは U の選び方に依らない．

Lemma 1.5.10. A を環とし， I をそのイデアルとする．このとき，スキームの射

$$i : \operatorname{Spec} A/I \rightarrow \operatorname{Spec} A$$

が自然な射影 $\varphi : A \rightarrow A/I$ によって誘導される． i は $\operatorname{Im} i = V(I)$ へのスキームの開はめ込みである．更に，任意の $\operatorname{Spec} A$ の基本開集合 $D(f)$ に対して

$$(\operatorname{Ker} i^\#)(D(f)) = I \otimes_A A_f$$

が成り立つ．

Proof. i が閉はめ込みであることはよい．次に，任意の $\mathrm{Spec} A$ の基本開集合 $D(f)$ に対して先ほどみたように，標準的な全射

$$\mathcal{O}_{\mathrm{Spec} A}(D(f)) = A_f \rightarrow (A/I)_{\varphi(f)} = i_* \mathcal{O}_{\mathrm{Spec} A/I}(D(f))$$

がある．これにより， $i^\#$ の全射性と，

$$\begin{aligned} (\mathrm{Ker} i^\#)(D(f)) &= \mathrm{Ker}(i^\#(D(f))) \\ &= \mathrm{Ker}(A_f \rightarrow (A/I)_{\varphi(f)}) \\ &= I_f \\ &= I \otimes_A A_f \end{aligned}$$

がわかる． ■

Example 1.5.11. X をスキームとする． $x \in X$ に対して $k(x)$ は点 x での X の剰余体であった．(Def:1.4.1 を参照．) このとき標準的な全射 $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow k(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$ は閉はめ込み $\mathrm{Spec} k(x) \rightarrow \mathrm{Spec} \mathcal{O}_{X,x}$ を誘導する．Ex:1.5.9 より射 $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow X$ がある．よって射 $\mathrm{Spec} k(x) \rightarrow X$ を得る．この射は $\mathrm{Spec} k(x)$ の唯一の点を $x \in X$ に送る射である．

Definition 1.5.6. Z を X の閉集合とする．このとき Z が **閉部分スキーム (closed subscheme)** とは包含写像 $j: Z \rightarrow X$ が閉はめ込み

$$(j, j^\#): (Z, \mathcal{O}_Z) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$$

となるときをいう．

Proposition 1.5.12. $X = \mathrm{Spec} A$ をアフィンスキームとする． $j: Z \rightarrow X$ をスキームの閉はめ込みとする．このとき， Z はアフィンスキームで，あるイデアル $J \subset A$ が唯一存在して j は同型 $Z \xrightarrow{\simeq} \mathrm{Spec} A/J$ を誘導する．

Definition 1.5.7. S をスキームとする．このとき X が **S -スキーム (S -scheme)** または **S 上のスキーム (scheme over S)** とはスキームの射 $\pi: X \rightarrow S$ が与えられているときをいう．この π を **構造射 (structural morphism, structure morphism)**， S を **基底スキーム (base scheme)** という． $S = \mathrm{Spec} A$ のときまた X を **A -スキーム (A -scheme)** または **A 上のスキーム (scheme over A)** という．このとき A を **基底環 (base ring)**

Definition 1.5.8. $\pi: X \rightarrow S, \rho: Y \rightarrow S$ を S 上のスキームとする．このとき **S -スキームの射 (morphism of S -scheme)** $f: X \rightarrow Y$ とは f がスキームの射で $\rho \circ f = \pi$ を満たすことをいう．

スキーム X, Y に対して

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sch}}(X, Y) := \{f : X \rightarrow Y \mid f \text{ is morphism of schemes}\}$$

また, 環 A, B に対して

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ring}}(A, B) := \{f : A \rightarrow B \mid f \text{ is morphism of rings}\}$$

とおく. このとき標準的な写像

$$\rho : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Sch}}(X, Y) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ring}}(\mathcal{O}_Y(Y), \mathcal{O}_X(X))$$

がある. 実際 $(f, f^\#) \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Sch}}(X, Y)$ とすると

$$f^\#(Y) : \mathcal{O}_Y(Y) \rightarrow f_*\mathcal{O}_X(Y) = \mathcal{O}_X(f^{-1}(Y)) = \mathcal{O}_X(X)$$

がある.

Definition 1.5.9. $\pi : X \rightarrow S$ を S 上のスキームとする. X の切断 (section of X) とは S 上のスキームの射 $\sigma : S \rightarrow X$ で $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_S$ となることをいう. X の切断の集合を $X(S)$ ($S = \mathrm{Spec} A$ のときは $X(A)$) とかく.

Example 1.5.13. X を体 k 上のスキームとする. このとき

$$X(k) = \{x \in X \mid k(x) = k\}$$

実際 $\sigma \in X(k)$ をとる. $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec} k, (0)} = k_{(0)} = k$ より

$$\sigma^\#_{(0)} : \mathcal{O}_{X, \sigma((0))} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathrm{Spec} k, (0)} = k$$

で,

Definition 1.5.10. X を体 k 上のスキームとする. 上の例より $X(k)$ の点を X の k -有理点 (k -rational points of X) という.

Remark . Y を X の開 (閉) 部分スキームとする. 任意の点 $y \in Y$ に対してその点での剰余体は \mathcal{O}_Y で考えたときと \mathcal{O}_X で考えたときの二種類が考えられるがこれらは同型である. よって X を体 k 上のスキームとすると $Y(k) = X(k) \cap Y$ である.

Lemma 1.5.14. S をスキームとする. $\{X_i\}_i$ を S 上のスキームの族とする. X_{ij} を X_i の開部分スキームとして $f_{ii} = \mathrm{id}_{X_i}$, $f_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ と $f_{ik} = f_{jk} \circ f_{ij}$ が $X_{ij} \cap X_{ik}$ 上で成り立つ S スキームの同型射 $f_{ij} : X_{ij} \xrightarrow{\cong} X_{ji}$ が与えられているとき, ある S 上のスキーム X が同型を除いて唯一存在して以下を満たす.

$$\text{開はめ込み } g_i : X_i \rightarrow X \text{ があって } X_{ij} \text{ 上で } g_i = g_j \circ f_{ij} \text{ で } X = \bigcup_i g_i(X_i)$$

Proof. 先に X を構成しそれが条件を満たすことを確認する.

$$X = \coprod_i X_i / \sim$$

と置く. ここで

$$x \sim y \stackrel{\text{def}}{=} x \in X_i, y \in X_j, y = f_{ij}(x)$$

と定義する. また X に商位相を入れる. 包含写像 $g_i : X_i \hookrightarrow X$ は位相的開はめ込みで $g_i = g_j \circ f_{ij}$ を満たす. $U_i = g_i(X_i)$ と置いて $\mathcal{O}_{U_i} = g_{i*} \mathcal{O}_X$ とおくと

$$\mathcal{O}_{U_i}|_{U_i \cap U_j} = \mathcal{O}_{U_j}|_{U_i \cap U_j}$$

を満たす. 実際

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_{U_i}|_{U_i \cap U_j} &= (g_{i*} \mathcal{O}_X)|_{U_i \cap U_j} \\ &= ((g_j \circ f_{ij})_* \mathcal{O}_X)|_{U_i \cap U_j} \\ &= (g_{j*} f_{ij*} \mathcal{O}_X)|_{U_i \cap U_j} \end{aligned}$$

■

1.5.2 Projective schemes

まず初めに次数環

$$A = \bigoplus_{n \in \mathbf{N}} A_n$$

を固定する. ここでイデアル $I \subset A$ が斉次イデアルとは

$$I = \bigoplus_{n \in \mathbf{N}} (I \cap A_n)$$

のときをいう. ここで

$$A/I = \bigoplus_{n \in \mathbf{N}} A_n / \bigoplus_{n \in \mathbf{N}} (I \cap A_n)$$

だが

$$\begin{aligned} \varphi: \bigoplus_{n \in \mathbf{N}} A_n / (I \cap A_n) &\longrightarrow A/I \\ \downarrow &\quad \downarrow \\ (x_i + I \cap A_i)_i &\longmapsto (x_i)_i + I \end{aligned}$$

とするとこれは全準同型で単射性は $(x_i)_i + I = (y_i)_i + I$ とすると $(x_i)_i - (y_i)_i = (x_i - y_i)_i \in I$ と $x_i \in A_i$ より $x_i - y_i \in I \cap A_i$ でこれは単射であることを意味する. よって,

$$A/I = \bigoplus_{n \in \mathbf{N}} A_n / (I \cap A_n)$$

である. ここで $\text{Proj } A$ を次のように定義しよう.

$$\text{Proj } A := \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \text{ は斉次イデアルで } A_+ \not\subset \mathfrak{p}\}$$

とおく．ただし

$$A_+ := \bigoplus_{n>0} A_n$$

である．あとで $\text{Proj } A$ にスキームの構造が入ることを示そう．

任意の斉次イデアル $I \subset A$ に対して

$$V_+(I) := \{\mathfrak{p} \in \text{Proj } A \mid I \subset \mathfrak{p}\}$$

と定義する．このとき

$$\bigcap_{\mu} V_+(I_{\mu}) = V_+(\sum_{\mu} I_{\mu}) \quad (1.2)$$

$$V_+(I) \cup V_+(J) = V_+(I \cap J) \quad (1.3)$$

$$V_+(A) = \emptyset \quad (1.4)$$

$$V_+(0) = \text{Proj } A \quad (1.5)$$

が成り立つ．実際 (1.1) から示そう．

$$I_{\lambda} \subset \sum_{\mu} I_{\mu}$$

なので

$$V_+(\sum_{\mu} I_{\mu}) \subset V_+(I_{\lambda})$$

である．よって

$$V_+(\sum_{\mu} I_{\mu}) \subset \bigcap_{\mu} V_+(I_{\mu})$$

逆に $\mathfrak{p} \in \bigcap V_+(I_{\mu})$ とすると任意の μ に対して $I_{\mu} \subset \mathfrak{p}$ なので $\sum I_{\mu} \subset \mathfrak{p}$ が成り立ち逆の包含関係もわかる．

(1.2) は $\mathfrak{p} \in V_+(I)$ なら $I \subset \mathfrak{p}$ なので $I \cap J \subset \mathfrak{p}$ だから $V_+(I) \subset V_+(I \cap J)$ で同様に $V_+(J) \subset V_+(I \cap J)$ なので

$$V_+(I) \cup V_+(J) \subset V_+(I \cap J)$$

逆に $\mathfrak{p} \in V_+(I \cap J)$ なら $I \cap J \subset \mathfrak{p}$ で $I \not\subset \mathfrak{p}$ なら $a \in I$ かつ $a \notin \mathfrak{p}$ なる元がある．しかし，任意の $b \in J$ に対して $ab \in I \cap J$ なので $ab \in \mathfrak{p}$ で今 $a \notin \mathfrak{p}$ なので $b \in \mathfrak{p}$ である．よって $J \subset \mathfrak{p}$ なので $V_+(I \cap J) \subset V_+(J)$ だから逆の包含関係もわかる．残り二つは自明である．

Spec の場合と同様に $\text{Proj } A$ にも $\{V_+(I)\}_I$ を閉集合族とする位相を入れることにする．この位相を同様に Zariski 位相ということにする．

I を A の任意のイデアルとすると， I に伴う斉次イデアル $I^h = \bigoplus (I \cap A_n)$ (ここで h 乗ではなく単なる記号であることに注意) が定義できる．

Lemma 1.5.15. I, J を次数環 A のイデアルとする．このとき以下が成り立つ．

(1) I が素イデアルならそれに伴う斉次イデアル I^h も素イデアル．

(2) I と J が斉次イデアルとする．このとき

$$V_+(I) \subset V_+(J) \Leftrightarrow J \cap A_+ \subset \sqrt{I}$$

(3) $\text{Proj } A = \emptyset \Leftrightarrow A_+$ が冪零

Proof. (1) I を素イデアルとする． $a, b \in A$ が $ab \in I^h$ で $a, b \notin I^h$ を満たすとする．斉次元に分解すると

$$a = \sum_{i=0}^n a_i, \quad b = \sum_{j=0}^m b_j, \quad a_n, b_m \in A_n$$

よって $ab = a_n b_m + \{ \text{次数 } n+m \text{ 未満の斉次元} \}$ だから ab の $n+m$ 次斉次元は $a_n b_m$ で

(2) まず (\Leftarrow) を示す．つまり $J \cap A_+ \subset \sqrt{I}$ とする．任意の $\mathfrak{p} \in V_+(I)$ に対して

$$\mathfrak{p} \supset J \cap A_+ \supset JA_+$$

■

斉次元 $f \in A$ に対して

$$D_+(f) = \text{Proj } A \setminus V_+(fA)$$

これを **基本開集合 (principal open subset)** という．基本開集合の族 $\{D_+(f)\}_f$ は $\text{Proj } A$ の開基になっている．

Lemma 1.5.16. 3.36

Proposition 1.5.17. 3.38

Lemma 1.5.18. 3.40

Lemma 1.5.19. 3.41

Definition 1.5.11. 3.42

Lemma 1.5.20. 3.43

Corollary 1.5.21. 3.44

1.5.3 Noetherian schemes, algebraic varieties

Definition 1.5.12. スキーム X の各点 x のアフィン開近傍 $\text{Spec } A_x$ として, A_x がネーター環であるものがとれるとき **局所ネータースキーム (locally noetherian scheme)** という. 更に X が準コンパクトであれば **ネータースキーム (noetherian scheme)** という.

Proposition 1.5.22. X をネータースキームとする.

- (1) X の任意の開 (閉) 部分スキームはネーターである.
- (2) 任意の点 $x \in X$ に対して $\mathcal{O}_{X,x}$ はネーター
- (3) 任意のアフィン開集合 U に対して $\mathcal{O}_X(U)$ はネーター

Proof. X はネーター的なので有限個のアフィン開集合 $\{X_i\}$ で被覆され $\mathcal{O}_X(X_i)$ はネーター環であるようにとる.

(1) Z を X の開 (閉) 部分スキームとする. $Z \cap X_i$ がネーター環であることを示せば十分である. また $Z \cap X_i$ は X_i の開 (閉) 部分スキームであるので, 結局 X をアフィンスキームとしてよい. よって, $X = \text{Spec } A$ とおく. もし Z が開だとすると, $Z = X \setminus V(I)$ なる I がある. いま A はネーター環なので I は有限生成によって Z は有限個の基本開集合 $D(f_j)$ で被覆され, 更にその局所化 (例えば A_{f_j}) はまたネーター的である. 従って Z はネーターである.

次に Z を閉のときは Prop:1.5.12 よりよい.

(2) 環 $\mathcal{O}_{X,x}$ はネーター環の局所化なので再びネーター環になる.

(3) 上で見たように $U \cap X_i$ は X_i の有限個のネーターアフィン開集合で被覆される. 従って U は有限個のネーターアフィン開集合 U_j で被覆されているとしてよい. I を $A = \mathcal{O}_X(U)$ のイデアルとする. $I\mathcal{O}_X(U_j)$ は有限生成である. $J\mathcal{O}_X(U_j) = I\mathcal{O}_X(U_j)$ が任意の j で成り立つ有限生成なイデアル $J \subset I$ が存在する. 任意の点 $x \in U$ に対して $J\mathcal{O}_{U,x} = I\mathcal{O}_{U,x}$ よって

$$I\mathcal{O}_{U,x}/J\mathcal{O}_{U,x} = I/J \otimes_A A_{\mathfrak{p}} = 0$$

が任意の $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ で成り立つ. 今 $A_{\mathfrak{p}} \neq 0$ なので $I/J = 0$ で $I = J$ は有限生成である. ■

Definition 1.5.13. k を体とする.

Limit

第 A 章

A.1 Inductive Limit

とりあえず, 帰納極限だけ述べる. 射影極限は双対概念なのでまあ頑張って.

Definition A.1.1.(帰納系の定義)

(Λ, \leq) を順序集合, \mathcal{C} を圏とする. 各 $\lambda \in \Lambda$ に対し, $X_\lambda \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ が与えられ, $\lambda \leq \mu$ に対して射 $\varphi_{\mu, \lambda} : X_\lambda \rightarrow X_\mu$ があって次を満たすとき, $\{X_\lambda, \varphi_{\mu, \lambda}\}$ を **順系 (direct system)** または **帰納系 (inductive system)** という. しばし $\varphi_{\mu, \lambda}$ を省略して $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ や $\{X_\lambda\}_\lambda$ で表す.

- 任意の $\lambda \in \Lambda$ に対して $\varphi_{\lambda, \lambda} = \text{id}_{X_\lambda}$
- $\lambda \leq \mu \leq \nu$ なる任意の $\lambda, \mu, \nu \in \Lambda$ に対して $\varphi_{\nu, \lambda} = \varphi_{\nu, \mu} \circ \varphi_{\mu, \lambda}$

Example A.1.1. 位相空間 X の開集合族 $\{U\}_U$ に対して

$$U \leq V \stackrel{\text{def}}{=} V \subset U$$

と定義する. そして, **AGrp** をアーベル群の成す圏, \mathcal{F} を X 上の前層とする. すると, 各開集合 U に対し, $\mathcal{F}(U) \in \text{Ob}(\mathbf{AGrp})$ で, 前層の定義からアーベル群と制限写像との組 $\{\mathcal{F}(U), \rho_{U, V}\}$ は帰納系となる. 前層の定義は Def:1.3.1 を参照.

Definition A.1.2.(帰納系の射の定義)

Λ を順序集合. $\{X_\lambda, \varphi_{\lambda, \mu}\}, \{Y_\lambda, \psi_{\lambda, \mu}\}$ を Λ 上の圏 \mathcal{C} における帰納系とする. このとき $\{X_\lambda\}$ から $\{Y_\lambda\}$ への射とは $f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y_\lambda$ なる射の族 $\{f_\lambda\}$ で, 任意の $\lambda \leq \mu$ に対して $\psi_{\lambda, \mu} \circ f_\mu = f_\lambda \circ \varphi_{\lambda, \mu}$ となるものを言う.

$$\begin{array}{ccc}
 X_\mu & \xrightarrow{f_\mu} & Y_\mu \\
 \varphi_{\lambda,\mu} \downarrow & \circlearrowleft & \downarrow \psi_{\lambda,\mu} \\
 X_\lambda & \xrightarrow{f_\lambda} & Y_\lambda
 \end{array}$$

Definition A.1.3. \mathcal{C} を圏とし, Λ を順序集合とする. $\{X_\lambda, \varphi_{\mu,\lambda}\}$ を \mathcal{C} の帰納系とする. このとき $\{X_\lambda, \varphi_{\mu,\lambda}\}$ の **順極限 (direct limit)** または **帰納的極限 (inductive limit)** または **帰納極限** とは, \mathcal{C} の対象 $\varinjlim_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と射の族 $\{\varphi_\lambda : X_\lambda \rightarrow \varinjlim_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ の組 $\{\varinjlim_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda, \varphi_\lambda\}$ で, 次の条件を満たすものをいう.

- $\lambda \leq \mu$ に対して $\varphi_\mu \circ \varphi_{\mu,\lambda} = \varphi_\lambda$
- $\lambda \leq \mu$ に対して $f_\mu \circ \varphi_{\mu,\lambda} = f_\lambda$ を満たす任意の射の族 $\{f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y\}_{\lambda \in \Lambda}$ に対して, $f : \varinjlim_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \rightarrow Y$ が一意に存在して

$$f \circ \varphi_\lambda = f_\lambda \quad (\forall \lambda \in \Lambda)$$

を満たす.

Remark . 一般の圏では帰納極限や射影極限は存在するとは限らない. しかし, 存在するとすれば, 同型を除いて一意である.

Proposition A.1.2. 帰納極限は存在すれば, 同型を除いて一意である.

Proof. 証明は後で書く. ■

Complex Analysis

第 B 章

B.1 Holomorphic Function

複素数 $z = x + iy \in \mathbf{C}$ に対して $|z|$ を

$$|z| \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\text{B.1})$$

と定義する．定義とコーシー・シュワルツの不等式から $z, w \in \mathbf{C}$ に対して

$$|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0 \quad (\text{B.2})$$

$$|zw| = |z||w| \quad (\text{B.3})$$

$$|z + w| \leq |z| + |w| \quad (\text{三角不等式}) \quad (\text{B.4})$$

が成り立つ．三角不等式より

$$||z| - |w|| \leq |z - w| \quad (\text{B.5})$$

が成り立つ．実際

$$|z| = |z - w + w| \leq |z - w| + |w|$$

より $|z| - |w| \leq |z - w|$ で，対称性から $- (|z| - |w|) \leq |z - w|$ より式 (B.5) を得る．

集合 $\Omega \subset \mathbf{C}$ 上で定義された関数 $f: \Omega \subset \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ が $z_0 \in \Omega$ で**連続 (continuous)** とは，任意の $\varepsilon \in \mathbf{R}_{>0}$ に対して，ある $\delta \in \mathbf{R}_{>0}$ が存在して

$$|z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon \quad (\text{B.6})$$

を満たすことである．^{*1}これは， Ω 内の点列 $(z_n)_n$ で $z_n \rightarrow z_0$ ($n \rightarrow \infty$) なる任意の点列に対して，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = f(z_0) \quad (\text{B.7})$$

が成り立つことと同値である． f が Ω 上で連続とは Ω の任意の点で連続なときを言う．

f が連続ならば実数値関数 $|f|$ も連続であることがわかる．実際 (B.5) より

$$||f(z)| - |f(z_0)|| \leq |f(z) - f(z_0)| \quad (\text{B.8})$$

^{*1} ただし， δ を十分小さく取る．具体的には $z \in \Omega$ となる程度

なのでよい.

f が点 $z_0 \in \Omega$ で最大値をとるとは,

$$|f(z)| \leq |f(z_0)| \quad (z \in \Omega)$$

を満たすことである. 同様に最小値も定義される.

Theorem B.1.1. コンパクト集合 Ω 上の連続関数は有界で, Ω において最大値と最小値をとる.

証明は省く.

Definition B.1.1. $\Omega \subset \mathbb{C}$ を開集合とし, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ が $z_0 \in \Omega$ で **正則 (regular/non-singular)** であるとは,

$$\frac{f(z+h) - f(z)}{h} \quad (\text{B.9})$$

が $h \rightarrow 0$ のときに極限を持つことである. ただし, (B.9) が定義されるために, $h \in \mathbb{C}$ をゼロでない複素数で $|h|$ を十分小さく $z+h \in \Omega$ となるように取る. この極限が存在する場合 $f'(z_0)$ と書いて f の z_0 における微分という. ただし, この極限において h はすべての方向から 0 に近づくような複素数であることに注意.

f が Ω で正則とは, f が Ω の任意の点で正則であるときを言う.

Ω が開でないときは, Ω を含むある開集合上で正則で f が正則であるということにする. f が \mathbb{C} で正則のとき f を **整関数** という.

Proposition B.1.2. f, g を Ω 上の正則関数とする. このとき以下が成り立つ.

- $f + g$ は Ω 上で正則で, $(f + g)' = f' + g'$ である.
- fg は Ω 上で正則で, $(fg)' = f'g + fg'$ である.
- $g(z_0) \neq 0$ ならば f/g は z_0 で正則で,

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

- もし $f : \Omega \rightarrow U, g : U \rightarrow \mathbb{C}$ が正則なら,

$$(g \circ f)'(z) = g'(f(z))f'(z) \quad (z \in \Omega)$$

が成り立つ.

Example B.1.3. $f(z) = z$ は正則で, $f'(z) = 1$ である. よって Prop:B.1.2 より, 多項式

$$p(z) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

は \mathbb{C} で正則で,

$$p'(z) = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1}$$

である.

Example B.1.4. $f(z) = \bar{z}$ は正則ではない.

(B.9) の h が実数の場合の極限を考えよう. 特に $h = h_1 + ih_2$ として $h_2 = 0$ の場合を考えよう. このとき $f(z) = f(x, y)$ と書くことにすると,

$$f'(z) = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{f(x + h_1, y) - f(x, y)}{h_1} = \frac{\partial f}{\partial x}(z) \quad (\text{B.10})$$

次に $h_1 = 0$ として考えると,

$$f'(z) = \lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h_2) - f(x, y)}{ih_2} = \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y}(z) \quad (\text{B.11})$$

よって, f が正則なら

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y} \quad (\text{B.12})$$

が成り立つ. $f = u + iv$ とかけば,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (\text{B.13})$$

が成り立つことがわかる. これらの関係式 (B.13) を **コーシー・リーマンの方程式 (Cauchy-Riemann equations)** という. ここで, ウェルティンガーの微分を定義する.

$$\frac{\partial}{\partial z} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial y} \right) \quad (\text{B.14})$$

Proposition B.1.5. f が z_0 で正則なら

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0 \quad (\text{B.15})$$

Proof. $f = u + iv$ と置くと,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{1}{i} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right) \end{aligned}$$

よってコーシー・リーマンの方程式と同値である. ■

Theorem B.1.6. $f = u + iv$ を開集合 Ω 上で定義された複素数値関数とする．もし， u, v が C^1 級で，コーシー・リーマンの方程式を満たすならば， f は Ω 上で正則で， $f'(z) = \partial f / \partial z$ を満たす．

Proof.

$$\begin{aligned} u(x + h_1, y + h_2) - u(x, y) &= \frac{\partial u}{\partial x} h_1 + \frac{\partial u}{\partial y} h_2 + |h| \varepsilon_1(h) \\ v(x + h_1, y + h_2) - v(x, y) &= \frac{\partial v}{\partial x} h_1 + \frac{\partial v}{\partial y} h_2 + |h| \varepsilon_2(h) \end{aligned}$$

で表せる．ただしここで， $h = h_1 + ih_2$ が $|h| \rightarrow 0$ のとき $\varepsilon_i(h) \rightarrow 0$ を満たしている．コーシー・リーマンの方程式を用いれば，

$$\begin{aligned} f(x + h) - f(x) &= u(x + h_1, y + h_2) - u(x, y) + i(v(x + h_1, y + h_2) - v(x, y)) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} h_1 + \frac{\partial u}{\partial y} h_2 + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} h_1 + \frac{\partial v}{\partial y} h_2 \right) + |h| \varepsilon(h) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} h_1 + \frac{\partial u}{\partial y} h_2 + i \left(-\frac{\partial u}{\partial y} h_1 + \frac{\partial u}{\partial x} h_2 \right) + |h| \varepsilon(h) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right) (h_1 + ih_2) + |h| \varepsilon(h) \end{aligned}$$

ただし， $|h| \rightarrow 0$ のとき $\varepsilon(h) = \varepsilon_1(h) + i\varepsilon_2(h) \rightarrow 0$ を満たしている．ゆえに f は正則で，

$$f'(z) = 2 \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z} \quad (\text{B.16})$$

が成り立つ． ■

次に冪級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad (a_i \in \mathbf{C}) \quad (\text{B.17})$$

について考えよう．(めんどうなので和の範囲を省略して $\sum a_n z^n$ と書くこともある．) 最初に次の定理を証明しよう．

Theorem B.1.7. 冪級数 $\sum a_n z^n$ に対して $0 \leq R \leq \infty$ で，次を満たすものが存在する．

- (1) $|z| < R$ ならばこの級数は絶対収束する．
- (2) $R < |z|$ ならばこの級数は発散する．

ここで $\sum z_n$ 絶対収束するとは $\sum |z_n|$ が収束するときをいう．便宜上 $1/0 = \infty, 1/\infty = 0$ とすると， R は以下で与えられる．

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \quad (\text{B.18})$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \quad (\text{B.19})$$

Proof. 後で書く. ■

Definition B.1.2. 上の定理の R を冪級数の **収束半径 (radius of convergence)** といい、領域 $|z| < R$ を **収束円 (circle of convergence)** という。

Remark . 収束円の境界 $|z| = R$ 上では収束することもある発散することもある。

Theorem B.1.8. 冪級数 $\sum a_n z^n$ の収束円内の点における微分は級数の項別微分 $\sum n a_n z^{n-1}$ で与えられる。

$$\frac{\partial}{\partial z} \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial}{\partial z} a_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n z^{n-1} \quad (\text{B.20})$$

更に、冪級数は微分しても収束半径は変わらない。

Proof. 後で書く. ■

Corollary B.1.9. 冪級数はその収束円内で無限回複素微分可能

最後に開集合 Ω 上の複素数値関数 f が $z_0 \in \Omega$ で **解析的 (analytic)** とは、 z_0 を中心として、正の収束半径を持つ冪級数 $\sum a_n (z - z_0)^n$ があって、 z_0 のある近傍内の任意の点 z において

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad (\text{B.21})$$

が成り立つことである。 f が Ω 内の任意の点で解析的であるとき f は Ω 上で解析的であるという。

B.2 Line Integral

Definition B.2.1. パラメトリック曲線 (parametric curve) とは、写像 $c : [a, b] \subset \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ のことである。

パラメトリック曲線が **滑らか (smooth)** とは、 $c'(t)$ があって、 $[a, b]$ 上で連続であり、そして $t \in [a, b]$ に対して $c'(t) \neq 0$ を満たすことである。ただし、点 $t = a, t = b$ に対しては $c'(a), c'(b)$ を片側極限

$$c'(a) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \frac{c(a+h) - c(a)}{h}, \quad c'(b) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \frac{c(b+h) - c(b)}{h}$$

で定義する.

パラメトリック曲線が **区分的に滑らか (piecewise smooth)** とは, c が $[a, b]$ 上で連続で, ある区間の分割

$$a = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = b$$

があって, $c(t)$ が各区間 $[a_i, a_{i+1}]$ において滑らかになっていることである. 点 a_i における右側微分と左側微分とは一致しないこともありうる.

二つのパラメトリック曲線

$$c: [a, b] \rightarrow \mathbf{C}, \quad \bar{c}: [c, d] \rightarrow \mathbf{C}$$

が同値とは, 全単射な C^1 級関数 $t: [a, b] \rightarrow [c, d]$ があって, $t'(s) > 0$ かつ

$$\bar{c}(t(s)) = c(s)$$

を満たしていることである.

区分的に滑らかな曲線が閉とは始点と終点が一様していることをいう.

区分的に滑らかな曲線 c が, 単純とは, c が単射なときをいう. ただし, 曲線が閉の場合は始点と終点以外の点で単射なとき単純という.

Example B.2.1. 中心を $z_0 \in \mathbf{C}$ とする半径 r の円周

$$C_r(z_0) = \{z \in \mathbf{C} \mid |z - z_0| = r\}$$

は単純閉曲線で, 反時計回りのパラメータ付け

$$c(t) = z_0 + re^{it} \quad (t \in [0, 2\pi])$$

を正の向きとしておこう.

漸く積分の定義にありつける.

Definition B.2.2. $c: [a, b] \rightarrow \mathbf{C}$ によりパラメーター付けられた滑らかな曲線 γ と γ 上の連続関数 f が与えられたとき, γ に沿った f の積分または γ 上の積分を

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(c(t)) c'(t) dt \quad (\text{B.22})$$

により, 定義する. この定義が意味を持つには, 右辺がパラメーター付けに依らないことを示さなければならない. $\bar{c}: [c, d] \rightarrow \mathbf{C}$ を同値なパラメーター付けだとする. このとき積分の変数変換の公式と連鎖律から

$$\int_a^b f(c(t)) c'(t) dt = \int_a^b f(\bar{c}(t(s))) \bar{c}'(t(s)) t'(s) ds = \int_c^d f(\bar{c}(s)) \bar{c}'(s) ds \quad (\text{B.23})$$

が成り立つ.

γ は区分的に滑らかなときは, γ 上の f の積分は, 単に区分的に積分した和として定

義される．すなわち

$$\int_{\gamma} f(z)dz = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(c(t))c'(t)dt \quad (\text{B.24})$$

である．滑らかな曲線 γ の長さ $L(\gamma)$ は

$$L(\gamma) = \int_a^b |c'(t)|dt \quad (\text{B.25})$$

と定義する．

Proposition B.2.2. 以下が成立する．

(1) $\alpha, \beta \in \mathbf{C}$ に対して，

$$\int_{\gamma} (\alpha f(z) + \beta g(z))dz = \alpha \int_{\gamma} f(z)dz + \beta \int_{\gamma} g(z)dz \quad (\text{B.26})$$

(2) γ^- を γ と逆に向き付けた曲線るとき

$$\int_{\gamma^-} f(z)dz = - \int_{\gamma} f(z)dz \quad (\text{B.27})$$

(3) 次の不等式が成り立つ．

$$\left| \int_{\gamma} f(z)dz \right| \leq \sup_{z \in \gamma} |f(z)| \cdot L(\gamma) \quad (\text{B.28})$$

Proof. 気が向いたら書く． ■

Theorem B.2.3. f が開集合 Ω で連続で，かつ原始関数 F をもち， γ が始点 w_1 ，終点 w_2 の Ω 内の曲線であるとき，

$$\int_{\gamma} f(z)dz = F(w_2) - F(w_1) \quad (\text{B.29})$$

が成り立つ．

Proof. γ が滑らかなとき， $c : [a, b] \rightarrow \mathbf{C}$ を γ のパラメータ付けたとすると， $c(a) = w_1, c(b) = w_2$ で

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z)dz &= \int_a^b f(c(t))c'(t)dt \\ &= \int_a^b F'(c(t))c'(t)dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} F(c(t))dt \\ &= F(c(b)) - F(c(a)) \end{aligned}$$

である． γ が区分的に滑らかなとき，

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} f(z)dz &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(c(t))c'(t)dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (F(c(a_{k+1})) - F(c(a_k))) \\ &= F(c(a_n)) - F(c(a_0)) \\ &= F(c(b)) - F(c(a))\end{aligned}$$

を得る． ■

Corollary B.2.4. γ が開集合 Ω における閉曲線で， f が連続かつ Ω で原始関数をもつなら，

$$\int_{\gamma} f(z)dz = 0 \quad (\text{B.30})$$

である．

Example B.2.5. $f(z) = 1/z$ は $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ で原始関数を持たない．

Proof. C を $c(t) = e^{it}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) でパラメーター付けられた単位円周とすると，

$$\int_C f(z)dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} ie^{it} dt = 2\pi i \neq 0 \quad (\text{B.31})$$

だからである． ■

Corollary B.2.6. f が領域 Ω で正則で， $f' = 0$ なら f は定数である．

Proof. 点 $w_0 \in \Omega$ を任意に取り固定する．任意の $w \in \Omega$ に対して， $f(w_0) = f(w)$ を示せば十分である． Ω は連結なので w_0 と w を結ぶ Ω 内の曲線 γ がある．よって

$$\int_{\gamma} f'(z)dz = f(w) - f(w_0) \quad (\text{B.32})$$

となる．仮定から $f' = 0$ で左辺は 0 になり $f(w_0) = f(w)$ を得る． ■

B.3 Cauchy's Integral Theorem

コーシーの積分定理とは，以下のことである．

D を領域， f を D 上の正則関数， C を D 内の閉曲線で D 内で C が 0 にホモトープ ($C \simeq 0$)

ならば

$$\int_C f(z)dz = 0 \quad (\text{B.33})$$

が成り立つ.

ホモトープの定義などは後で述べる. 最初に C が三角形の辺のなす折れ線の場合を示す. C の三点 a, b, c を頂点とする閉三角形を $T(a, b, c)$ で表す.

$$T(a, b, c) = \{z = \lambda a + \mu b + \nu c \in \mathbf{C} \mid \lambda + \mu + \nu = 1, \lambda, \mu, \nu \geq 0\} \quad (\text{B.34})$$

と表される. T の内部は

$$\{z = \lambda a + \mu b + \nu c \in \mathbf{C} \mid \lambda + \mu + \nu = 1, \lambda, \mu, \nu > 0\} \quad (\text{B.35})$$

で与えられる.

T の境界 ∂T は閉曲線として $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ と各辺上を動くとき, 左側に T の内部があるように動く向きになっているとする. この向きを ∂T の正の向きという.

Lemma B.3.1. D を領域, $T \subset D$ を閉三角形とし, ∂T を上のようにする. このとき任意の D 上で正則な f に対して,

$$\int_{\partial T} f(z)dz = 0 \quad (\text{B.36})$$

Proof. 後で書く. ■


一般に $[a, b] \rightarrow [0, 1]$ で $x \mapsto$

Definition B.3.1. 曲線 γ_0, γ_1 が領域 D 内で **ホモトープ (ホモトピック) (homotopic)** とは, $c_j : [a_j, b_j] \rightarrow D$ ($j = 0, 1$) が γ_j のパラメーター付けだとする. これが始域が $[0, 1]$ となる曲線と同値なとき, 次が成立することである.

(1)

Theorem B.3.2. 領域 D 内で, 始点 $w_0 \in D$, 終点 $w_1 \in D$ を共有する二つの曲線 γ, γ' が, ホモトープならば

$$\int_{\gamma} f(z)dz = \int_{\gamma'} f(z)dz \quad (\text{B.37})$$



B.4 Cauchy's Integral Formula

Theorem B.4.1. (Cauchy's Integral Formula1)

f を閉円板 $\overline{D(a; r)}$ の近傍上の正則関数とし、円 $C(a; r)$ に反時計回りの向き (正の向き) を与える. このとき, 次の等式が成り立つ.

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C(a; r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad (z \in D(a; r)) \quad (\text{B.38})$$

Proof. 平行移動で $a = 0$ とする. ある開円板 $D(r')$ ($r' > r$) 上で f は正則である. $z \in D(r)$ に対し $\varepsilon > 0$ を $\overline{D(z; \varepsilon)} \subset D(r)$ となるようにとる. 今ここで, $C(r) = \partial D(r), C(z; \varepsilon) = \partial D(z; \varepsilon)$ は反時計回りの向き (正の向き) をもつ円とする. ここで, 右図 (図 B.1) のように曲線 γ を定義する. 具体的には次のように定義する. $z_1 \in \partial D(r)$ と $z_2 \in \partial D(z; \varepsilon)$ を最も遠くなるように取る. そして, z_1 を始点として z_2 へ動いて $\partial D(z; \varepsilon)$ を時計回りに一周して $(-\partial D(z; \varepsilon))$, 次に z_2 から z_1 へ動いて, $\partial D(r)$ を反時計回りに一周する曲線を γ とする.




図 B.1 γ の図

B.5 Residue Theorem

Definition B.5.1. 領域 D で正則な関数 f が点 $c \in D$ で $f(c) = 0$ ならば, c を f の零点 (zero of f) という. 一致の定理によれば, f が恒等的に 0 でなければ, f の零点集合は内点を持たない. c を f の零点として $z = c$ における f の冪級数展開を

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - c)^n \quad (\text{B.39})$$

とする. $f(c) = 0$ だから $a_0 = 0$ である. f は恒等的に 0 でないとするならば, a_n の中に 0 でないものがあるからそのような a_n の中で n が最小のものを a_k とする. このとき f は c において k 位の零 (zero of order k) を持つという. k を零点 c の位数 (order) ま

たは重複度 (multiplicity) ということもある. 定理〇〇によって, これは

$$f(c) = f'(c) = \cdots = f^{(k-1)}(c) = 0 \quad (f^{(k)}(c) \neq 0) \quad (\text{B.40})$$

ということと同値である.

Theorem B.5.1. f は D 上正則な関数で $z = c$ において k 位の零を持つとする. このとき $f(z) = (z - c)^k g(z)$, $g(c) \neq 0$ である D 上の正則な関数 g が存在する.

Proof.

$$g(z) = \frac{f(z)}{(z - c)^k} \quad (\text{B.41})$$

と定義すれば, g は $D \setminus \{c\}$ で正則である. f の冪級数展開 (B.39) を用いると,

$$\phi(z) := \frac{f(z)}{(z - c)^k} = \sum_{n=k}^{\infty} a_n (z - c)^{n-k} \quad (\text{B.42})$$

ϕ はもとの冪級数と同じ収束半径を持つ. ϕ の作り方から ϕ は収束する領域内で $z \neq c$ なる z に対して $g(z) = \phi(z)$ が成立する. したがって, $g(c) = \phi(c) (= a_k)$ と定義すれば, g は D 全体で正則で $f(z) = (z - c)^k g(z)$ かつ $g(c) \neq 0$ を満たす. ■

Corollary B.5.2. f が恒等的に 0 でないならば f の零点集合は離散的である.

Proof. c を f の零点とすれば, $f(z) = (z - c)^k g(z)$, $g(c) \neq 0$ なる g がある. $g(c) \neq 0$ だから c の十分小さい近傍 $U(c)$ をとれば, $U(c)$ の任意の点 z に対して $g(z) \neq 0$ である. したがって, f は $U(c)$ 内に c 以外の零点を持たない. ■

Definition B.5.2. 領域 D と D のりさん部分集合 $\{c_\alpha\}_{\alpha \in A}$ を考える. f は $D \setminus \{c_\alpha\}_{\alpha \in A}$ で正則な関数とする. このとき f が D 上の有理型関数 (meromorphic function) であるとは, 各 α に対して c_α の近傍 U_α と U_α で定義された正則関数 g_α, h_α が存在して, $U_\alpha \setminus c_\alpha$ 上で,

$$f(z) = \frac{g_\alpha(z)}{h_\alpha(z)} \quad (\text{B.43})$$

が成り立つことである. $z = c_\alpha$ における g_α, h_α の零点の位数を k, l とする. すると定理〇〇より

$$f(z) = \frac{g_\alpha(z)}{h_\alpha(z)} = \frac{(z - c_\alpha)^k g'_\alpha(z)}{(z - c_\alpha)^l h'_\alpha(z)} \quad (\text{B.44})$$

で g'_α, h'_α は $z = c_\alpha$ で 0 ではないようにとれる. よって, $k \geq l$ ならば f は $z = c_\alpha$ で正則になるように拡張できる. 逆に $k < l$ ならば f を $z = c_\alpha$ まで正則にはできない. この場合 f は $z = c_\alpha$ で極 (pole) を持つといって, $l - k$ を極の位数 (order) という.

f は D 上の有理型関数で $z = c$ で極を持つとする. c を中心とした十分小さい円周 $C(c; \varepsilon)$

をとって、積分

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C(c; \varepsilon)} f(z) dz \tag{B.45}$$

ただし、円周は正の向きに向き付けられているとする．Cauchy の積分定理によって、正数 ε が十分小さい時