

5. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale.

Lorsque le paramètre n est grand et que p n'est ni trop proche de zéro, ni trop proche de 1, on peut approcher la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ de paramètres n et p , par la loi normale de paramètres :

$$\mu = np \text{ et } \sigma = \sqrt{np(1-p)}.$$

52 C 1. Une étude statistique a permis d'estimer que la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la clientèle d'un certain supermarché effectue un achat au rayon crèmerie est 0,45.

On observe 100 clients pris au hasard dans ce supermarché. On suppose que ces clients font leurs achats en toute indépendance. Soit X la variable aléatoire mesurant le nombre de ces personnes qui achètent un article au rayon crèmerie.

a) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi.

b) Calculer l'espérance mathématique de X , puis la valeur arrondie à l'entier le plus proche de l'écart type de X .

2. On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire discrète X par la loi normale $\mathcal{N}(45 ; 5)$. Utiliser cette approximation pour :

a) calculer la probabilité qu'au moins 50 des 100 clients observés effectuent un achat au rayon crèmerie, c'est-à-dire calculer la probabilité de l'événement « $X \geq 49,5$ » ;

b) calculer la probabilité de l'événement suivant : « parmi les 100 clients observés, le nombre de ceux qui effectuent un achat au rayon crèmerie est strictement compris entre 30 et 60 », c'est-à-dire encore, calculer la probabilité de l'événement « $30,5 \leq X \leq 59,5$ ».

53 Dans une entreprise, un stage de formation à l'utilisation d'un nouveau logiciel de gestion a été suivi par 25 % du personnel. Ainsi, la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans l'entreprise ait suivi ce stage est $p = 0,25$.

On choisit au hasard n personnes de cette entreprise. On suppose l'effectif suffisamment important pour assimiler ce choix à un tirage avec remise.

1. Dans cette question, $n = 10$.

On note X la variable aléatoire qui, à tout ensemble de 10 personnes ainsi choisies, associe le nombre de personnes ayant suivi le stage.

a) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale. Indiquer les paramètres de cette loi.

b) Déterminer, à 10^{-2} près, la probabilité des événements suivants :

E_1 : « Parmi 10 personnes choisies au hasard, exactement 2 personnes ont suivi le stage » ;

E_2 : « Parmi 10 personnes choisies au hasard, au plus une personne a suivi le stage ».

2. Dans cette question, $n = 500$. On note Y la variable aléatoire qui, à tout ensemble de 500 personnes ainsi choisies, associe le nombre de personnes ayant suivi le stage. On admet que la variable aléatoire Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 500$ et $p = 0,25$.

a) Déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire Y .

En donner une interprétation.

Déterminer une valeur approchée, arrondie à

10^{-1} près, de l'écart type de la variable aléatoire Y .

b) On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y par la loi normale de moyenne 125 et d'écart type 9,7.

On note Z une variable aléatoire suivant cette loi. En utilisant cette approximation, calculer la probabilité qu'au plus 120 personnes, parmi les 500 choisies au hasard, aient suivi le stage, c'est-à-dire $P(Z \leq 120,5)$. Donner ce résultat à 10^{-2} près.