



LE REGIONI DEL TORACE



IL GARRESE





É la regione interscapolare e forma il rilievo più alto del margine dorsale del tronco.

BASE ANATOMICA

Equini: T1-T8÷T9.

Bovini: T1-T5÷T6.



Mm. trapezio e romboide.

CARATTERI ZOOGNOSTICI

Bovini. Orizzontale, molto largo nelle razze da carne, asciutto in quelle da latte. **Difetti:** garrese alto, stretto, scarno, tagliente e incavato con depressione mediana.


Equini.

- **Cavalli:** più alto e stretto, $\pm$ esteso caudalmente, asciutto; $h <$ nelle ♀ ♀. Prominente nel purosangue inglese.



Difetti: garrese tagliente e troppo alto, basso e grasso, corto e/o incavato.

- **Asini e muli:** basso.



- **Ovini:** **basso**, meno nei **caprini**.
- **Suini:** non evidente.

NOTE PRATICHE

Il **mal del garrese** è una lesione suppurativa necrotica che interessa la parte più craniale del dorso a causa di finimenti logori o disadatti che producono un continuo sfregamento; batteri possono infettare la ferita che ne deriva, dando luogo alla produzione di pus. Fattori predisponenti sono:

- precarie condizioni igieniche;
- stato di nutrizione compromesso dell'animale.

IL DORSO

2 piani leggermente inclinati che convergono medialmente nella **linea dorso-lombare**.

LIMITI

Craniale: garrese.

Caudale: regione lombare.

Laterale: costato.


BASE ANATOMICA

Equini: T9÷T10-T18.

Bovini: T6÷T7-T13.


MUSCOLI SPINO-DORSALI

6. *Parte toracica del m. trapezio* (in posizione dorso-laterale);
7. *m. spinale e semispinale del torace e del collo* (medialmente a 6);
8. *m. lunghissimo del torace* (ventralmente a 6-7);
9. *m. multifido del torace* (medialmente a 8);
12. *mm. elevatore della costa e rotatore* (ventralmente a 8).



Sezione trasversale del tronco a livello di T8: superficie caudale della sezione (bovino).

Questi mm. occupano lo spazio compreso fra i processi spinosi e trasversi delle vertebre toraciche e lombari e formano la porzione principale della «**lombata**», il taglio ottenuto sezionando le coste a ≈ 20 cm dalla linea dorsale mediana da cui si ricavano bistecche come la *fiorentina*. Il **m. lunghissimo del torace** costituisce il «**roast beef**» nel vitello e la «**lonza**» nel maiale.




CARATTERI GENERALI DEL DORSO

Il dorso unisce il treno posteriore all'anteriore, trasmette gli impulsi dinamici dal post. all'ant., sopporta il peso del cavaliere nei cavalli e del basto in asini e muli.

CARATTERI ZOOGNOSTICI DEL DORSO

- Direzione;
- lunghezza;
- larghezza;
- muscolosità.





Muscolatura profonda della colonna vertebrale: lato sinistro (bovino).

1. I costa;
2. mm. intercostali esterni;
3. parte funicolare del legamento nucale;
4. parte cucullare del legamento nucale;
5. parte lamellare del legamento nucale;
6. mm. spinale e semispinale del torace e del collo;
7. **m. lunghissimo del torace e dei lombi;**
8. m. lungo vasto (gluteobicipite);
9. m. multifido del collo;
10. m. multifido del torace;
11. m. multifido dei lombi;
12. m. lunghissimo del collo;
13. XIII costa;
14. m. ileocostale dei lombi.

DIREZIONE



Orizzontale nei bovini; leggermente inclinato in senso caudo-craniale e dorso-ventrale nei cavalli; $\pm$ convesso nei muli e nei bardotti.





Dorso insellato: profilo dorso-lombare concavo
 ⇐ deviazione della colonna vertebrale (*lordosi*) ⇐
 rastrelliere per il foraggio troppo alte, errori ali-
 mentari, cause congenite, vacche in gravidanza
 Avanzata.

Dorso di mulo: profilo dorso-lombare convesso
 (*cifosi*). Vantaggioso per la robustezza del dorso
 e per la sua resistenza al sovraccarico negli equini
 da soma, ma < elasticità ⇒ svantaggioso per i
 cavalli da sella.



Dorso orizzontale nel cavallo (*in alto*),
 nel bovino (*al centro*) e nel suino (*in basso*).

LUNGHEZZA

Bovini: dorso gen. piuttosto corto; pregio se lungo e diritto nelle razze da latte, se lungo, diritto e largo in quelle da carne.

Equini:

- **cavalli da tiro:** pregio se breve;
- **cavalli da corsa:** pregio se più lungo ⇒ torace più profondo e colonna vertebrale più flessibile.


LARGHEZZA

Bovini:


- **razze da carne:** dorso largo per > curvatura coste e sviluppo masse muscolari, forma una superficie piana ± ampia;
- **razze da latte:** dorso più stretto perché le coste sono meno incurvate lateralmente e dirette più caudalmente, difetto se troppo stretto.

Equini:

- **cavalli da sella e da corsa:** dorso abbastanza largo;
- **cavalli da tiro:** dorso molto largo per grande sviluppo *mm. dentati dorsali caudali* (che originano con digitazioni dai processi spinosi delle ultime vertebre toraciche e delle prime lombari e s'inseriscono sulla faccia laterale delle coste, agendo come mm. espiratori) e dei citati *mm. spino-dorsali* (che occupano lo spazio compreso fra i processi spinosi e trasversi delle vertebre estendendosi dalla regione occipitale a quella sacrale);



Muscoli superficiali del tronco di cavallo (veduta laterale sinistra).



Muscoli del torace e dell'addome di cavallo (piano dei mm. dentati dorsali e obliquo interno dell'addome).

presenza di un solco $\pm$ profondo sulla linea mediana $\Rightarrow$ **dorso doppio**.



MUSCOLOSITÀ

Buon sviluppo muscolatura del dorso = pregio in tutte le specie e «tipi» morfologici ⇒ rotondità del profilo trasversale.

Dorso tagliente o «a tetto»: difetto dovuto a ipotrofia muscolare.

REGIONE PRE-STERNALE (PETTORALE)

Regione impari, localizzata all'estremità craniale del tronco tra le punte delle spalle.

LIMITI

Caudale: linea passante per le punte delle spalle.


Dorsale: regione ventrale del collo.


Ventrale: manubrio dello sterno.

Laterale: **solco pettorale laterale** (tra i mm. brachiocefalico e pettorale discendente).

BASE SCHELETRICA

Manubrio dello sterno e prime 2 sternebre.





Muscoli della regione cervicale ventrale e muscoli pettorali di cavallo (veduta ventrale, testa estesa).

LARGHEZZA

Distanza fra le art. scapolo-omerale dei 2 lati.

Se il petto è prominente, largo e profondo (in relazione a larghezza e profondità del torace) ⇒ buon sviluppo muscolare e buona capacità del torace.


Bovini:

- **razze da carne:** largo, muscoloso, convesso e «basso», tanto da avvicinarsi al carpo (art. radio-carpo-metacarpale);



Toro di razza marchigiana.

- **razze da latte:** più stretto e scarno; difettoso se infossato fra le spalle.



a. Petto stretto e corto nel bovino; b. petto largo e profondo nel bovino; c. petto stretto nel cavallo; d. petto largo nel cavallo.

Punta di petto: è uno dei «tasti» in cui si può stimare lo stato d'ingrassamento di un bovino da carne valutando, alla palpazione, l'entità dell'accumulo di tessuto adiposo sottocutaneo che si forma a tale livello.

Equini:

- **cavalli da tiro:** notevole ampiezza del petto = pregio assoluto;
- **cavalli da corsa e da sella:** notevole ampiezza del petto = difetto per eccessiva distanza fra gli arti ant.;
- **asini e muli:** petto più stretto e meno muscoloso che nel cavallo.

Ovini:

- **razze da carne:** petto ampio e prominente;

- **razze da latte**: petto più stretto.

Suini: petto ampio e continuo senza demarcazione rispetto alle regioni laringea e ventrale del collo.

Difetti in tutte le specie: petto

- **stretto**, per insufficiente sviluppo in senso trasversale;
- **tagliente**, per ipotrofia dei mm. pettorali $\Rightarrow$ sterno percepibile sotto la pelle;
- **incavato** = infossato fra le punte delle spalle che sporgono in avanti.

REGIONE STERNO-COSTALE POSTERIORE (BASE DEL TORACE)

BASE SCHELETRICA

Ultime 4÷6 sternebre, processo xifoideo dello sterno, cartilagini costali delle coste sternali dalla 3^a all'ultima.


Regione detta anche, negli equini, del «passaggio delle cinghie» (vi passa la cinghia destinata a tener ferma la sella o il basto sul dorso dell'animale), dev'essere **ampia** soprattutto **nei bovini da carne e nei cavalli da tiro** per offrire una solida inserzione ai mm. cervicali, pettorali, addominali ed al diaframma.

☺ Armonico raccordo con il petto (ant.), il costato (lat.) e l'addome (post.).


Complessi mammari toracici nella scrofa e nelle ♀♀ dei carnivori.

NOTE PRATICHE


Nella valutazione morfologica delle bovine da latte si prende in considerazione il «**vigore**» o «**forza anteriore**», carattere a cui viene attribuito un punteggio compreso fra 5 e 45 in funzione della **forza scheletrica del treno ant.** che dipende dalla **larghezza** e dalla **profondità del torace** e, quindi, anche del **petto**.



5



25



45

- 5.** animale molto stretto e debole
- 15.** stretto e debole
- 25.** moderatamente forte ed ampio
- 35.** molto forte
- 45.** estremamente forte ed ampio