

Esercitazione N° 1: **La miostatina**

Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna – Asti
piero.rivoira@yahoo.it

Creiamo il nostro profilo su Ubuntu

questo è un commento!

lanciamo il terminale per aggiungere un nuovo profilo

ctrl+alt+t

```
$ sudo adduser nome_battesimo -uid 663
```

```
$ pw di labx
```

per eliminare un profilo utente (in caso di errore)

```
$ sudo deluser --remove-home nome_utente
```

```
$ pw di labx
```

per recuperare la passwd dimenticata

sostituire <user name> con il proprio nome utente

```
$ sudo passwd user name
```

```
$ pw di labx
```

```
$ nuova pw
```

Creiamo il nostro profilo su Ubuntu

acquisiamo i privilegi dell'amministratore di sistema modificando il file di configurazione del Sistema Operativo (SO) `/etc/sudoers`

\$ **sudo visudo**

questo comando lancia l'editor di testo **nano** per creare ed aprire il file `/etc/sudoers.tmp` in modalità scrittura (per poterlo modificare); tale file è una copia di backup di `/etc/sudoers`

Creiamo il nostro profilo su Ubuntu

```
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"

# This fixes CVE-2005-4890 and possibly breaks some versions of kdesu
# (#1011624, https://bugs.kde.org/show\_bug.cgi?id=452532)
Defaults        use_pty

# This preserves proxy settings from user environments of root
# equivalent users (group sudo)
#Defaults:%sudo env_keep += "http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy no_proxy"

# This allows running arbitrary commands, but so does ALL, and it means
# different sudoers have their choice of editor respected.
#Defaults:%sudo env_keep += "EDITOR"

# Completely harmless preservation of a user preference.
#Defaults:%sudo env_keep += "GREP_COLOR"

# While you shouldn't normally run git as root, you need to with etckeeper
#Defaults:%sudo env_keep += "GIT_AUTHOR_* GIT_COMMITTER_*"

# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"

# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

# Ditto for GPG agent
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification
```

[Lette 59 righe]

^G Guida
^X Esci**^O** Salva
^R Inserisci**^W** Cerca
^ Sostituisci**^K** Taglia
^U Incolla**^T** Esegui
^J Giustifica**^C** Posizione
^/ Vai a riga**M-U** Annulla
M-E Ripeti**M-A** Contrassegna
M-6 Copia**M-]** Parentesi
^Q Cerca ind.**M-Q** Precedente
M-W Successiva**^B** Indietro
^F Avanti

Creiamo il nostro profilo su Ubuntu

```
GNU nano 7.2 /etc/sudoers.tmp
# This is a prewritten example of a sudoers file.  It is not
# equivalent users (group sudo)
#Defaults:%sudo env_keep += "http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy no_proxy"

# This allows running arbitrary commands, but so does ALL, and it means
# different sudoers have their choice of editor respected.
#Defaults:%sudo env_keep += "EDITOR"

# Completely harmless preservation of a user preference.
#Defaults:%sudo env_keep += "GREP_COLOR"

# While you shouldn't normally run git as root, you need to with etckeeper
#Defaults:%sudo env_keep += "GIT_AUTHOR_* GIT_COMMITTER_"

# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"

# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

# Ditto for GPG agent
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
piro    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin   ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL


# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@include /etc/sudoers.d
```

Elenco degli amministratori di sistema
portarsi con il cursore sull'ultima riga della lista
alt-6 # copia
ctrl-u # incolla l'intera riga
inserire il proprio nome utente
ctrl-o # per salvare
cancellare l'estensione .tmp
ctrl-x # per chiudere **nano**
alt-u # in caso di errore
(per annullare l'ultimo comando inserito)


Elenco degli amministratori di sistema

Struttura di un nucleotide




Zuccheri

Sugars




Ribose




Deoxyribose

Basi pirimidiniche e puriniche


Nitrogen-containing bases



Cytosine (C)




Uracil (U)




Thymine (T)

Pyrimidines



Guanine (G)



Adenine (A)

Purines

RNA

&

DNA

are chains of nucleotides



Ribose
(sugar)

Deoxyribose
(sugar)


Sugar-phosphate
backbone


Sugar-phosphate
backbone

Nucleotide
Unit




Deoxyribonucleic Acid (DNA)






antiparallelismo

Tratto di DNA formato da 4 paia di basi (CTTG nella catena inferiore, GaaC nella catena antiparallela ad essa). Le frecce verdi indicano la direzione dei legami fra i nucleotidi, che è opposta nelle due catene.





L'incrocio industriale o F1 toro da carne X vacca da latte

- **Razza Belga** = razza incrociante più utilizzata in Piemonte, allevata in purezza solo in Belgio



- Vitelli ibridi spuntano prezzi ≤ 400 Euro
[Piemontese puro ~ 500 E, frisione puro (*gaiot*) 50 E]
- Quante bovine da latte posso inseminare con il Belga senza compromettere la **rimonta interna**?



La razza Belga e la miostatina

Phenotype of myostatin null vertebrates.

- a) upper forelimb muscles of wild-type mouse;
- B) upper forelimb of mouse that is myostatin null;
- C) bovine with myostatin mutation;
- D) and E) human with myostatin mutation as a neonate (D) and at 7 mo of age.



La razza Belga e la miostatina





RESEARCH ARTICLE | GENETICS |



Double muscling in cattle due to mutations in the myostatin gene

Alexandra C. McPherron and Se-Jin Lee [Authors Info & Affiliations](#)

November 11, 1997 | 94 (23) 12457-12461 | <https://doi.org/10.1073/pnas.94.23.12457>

La razza Belga e la miostatina

the GenBank dat... 1

Q GenBank



Proc. Natl. Acad. Sci. USA
Vol. 94, pp. 12457–12461, November 1997
Genetics

Double muscling in cattle due to mutations in the myostatin gene

ALEXANDRA C. MCPHERRON AND SE-JIN LEE*

Department of Molecular Biology and Genetics, Johns Hopkins University School of Medicine, 725 North Wolfe Street, Baltimore, MD 21205

Communicated by Daniel Nathans, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, August 26, 1997 (received for review August 12, 1997)

La razza Belga e la miostatina

Data deposition: The sequences reported in this paper have been deposited in the **GenBank** database [baboon (accession no. AF019619), bovine (accession no. AF019620), chicken (accession no. AF019621), ovine (accession no. AF019622), porcine (accession no. AF019623), rat (accession no. AF019624), turkey (accession no. AF019625), zebrafish (accession no. AF019626), and human (accession no. AF019627)].

A commentary on this article begins on page 12249.

*To whom reprint requests should be addressed. e-mail: sejin_lee@qmail.bs.jhu.edu.

La razza Belga e la miostatina

lanciamo il terminale per usare R

ctrl+alt+t

\$ **R**

> **install.packages("ape")**

> **library(ape)**

> **x = paste("AF0196", 19:27, sep = "")**

ctrl+MAIUSC+v per incollare nel terminale o in R

```
> myostatin.numbers = c('NM_001001525.3', 'XM_010862903.1', 'XM_005907427.1', 'GQ184147.1', 'AF019620.1',  
'XM_061432883.1', 'BC134563.1', 'AY160688.1', 'XM_027555492.1', 'XM_019969486.1', 'AF019761.1',  
'NM_001290967.1', 'XM_055574715.1', 'KP057613.1', 'AY629304.1', 'XM_055397770.1', 'XM_061135030.1',  
'XM_043894881.1', 'XM_043488279.1', 'AY629307.1', 'XM_020900528.1', 'XM_052635569.1', 'EF629535.1',  
'NM_001009428.3', 'XM_040227852.1', 'JN662463.1', 'AM992883.1', 'AY629305.1', 'AF019622.1', 'KM371731.1',  
'JX840482.1', 'JN639006.1', 'HM462261.1', 'HM462259.1', 'NM_001285737.1', 'FM207636.1', 'AY629309.1',  
'AY629306.1', 'AY436347.1', 'AM992884.1', 'GU377303.1', 'XM_007104442.2', 'XM_022568276.1', 'XM_061203308.1',  
'XM_057551429.1', 'XM_036859085.1', 'AY629308.1', 'XM_029225345.1', 'XM_027114903.1', 'XM_024733638.1',  
'XM_004323907.2', 'XM_030847723.2', 'XM_060151388.1', 'XM_060015612.1', 'XM_060106598.1', 'XM_004276934.2',  
'XM_032637329.1', 'XM_059051852.1', 'XM_059928344.1', 'XM_057745280.1', 'XM_047770464.1', 'HM241657.1',  
'AF019623.1', 'JN630464.1', 'EF612791.1', 'NM_214435.2', 'XM_006209983.3', 'XM_006189223.3', 'XM_028125258.1',  
'XM_027590490.1', 'XM_025887402.1', 'XM_004426733.2', 'XM_010960036.2', 'XM_021703117.1', 'XM_004392403.2',  
'XM_046659551.1', 'XM_046650639.1', 'XM_014837576.2', 'XM_032417983.1', 'XM_010991955.2', 'XM_058548651.1',  
'XM_008516515.1', 'XM_036075506.1', 'NM_001081817.1', 'XM_006726961.2', 'XM_019626478.1', 'XM_054562700.1',  
'XM_036253439.1', 'XM_019740713.1', 'MZ169554.1', 'XM_035007537.1', 'XM_026490450.4', 'XM_045868351.2',  
'XM_045806119.1', 'XM_008687262.2', 'XM_029932956.1', 'XM_016215509.1', 'XM_036881965.2', 'XM_047086026.1',  
'XM_045480514.1')
```


La razza Belga e la miostatina

```
> x = paste("AF0196", 19:27, sep = "")  
> x = x[-c(1:8)]  
> x  
[1] "AF019627"  
> x = x[9]  
> x  
[1] "AF019627"  
>
```

perché l'output di questi due comandi è il medesimo?

La razza Belga e la miostatina

```
> y = c(x, myostatin.numbers)
> myostatin.seq = read.GenBank(x, as.character = TRUE)
> install.packages("seqinr")
> library(seqinr)
```

nel terminale

```
$ mkdir DNA_SEQUENCES
$ ls
$ pwd
```

in R

alt gr+ì → ~

```
> setwd("~/DNA_SEQUENCES")
> getwd()
> write.fasta(sequences = myostatin.seq, names = names(myostatin.seq), nbchar
=80, file.out = "myostatin.fas")
```

nel terminale

```
$ cd DNA_SEQUENCES
$ gedit myostatin.fas
```

La razza Belga e la miostatina

dopo
>AF019620

Aggiungere

>bovine_belgian
atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatatttacctatttatgctgattgttgctgggccagtggatctgaatgagaacag
cgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaacactacatcctcaagactag
aagccataaaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctatcagacaactt
ttgcccagggtcctccactcctggaactgattgatcagttcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttgga
agacgatgactaccacgccaggacggaaacgggtcattaccatgcccacggagtctgatcttctaacgcaagtggaaggaa
aacccaaagtgttgcttctttaaattagctctaagatacaatacaataaaactagtaaaggcccaactgtggatataatctg
aggcctgtcaagactcctgcgacagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaaccatgaaagacgggtacaaggtatac
tggaatccgatctctgaaacttgacatgaaccaggcactggatatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaga
actggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggccatgatcttgctgtaacc
ttcccagaaccaggagaagatggactgactccttttttagaagtcaaggtaacagacacaccaaaaagatctaggagaga
ttttgggcttgattgtgacagaatctcgatgctgtcgttaccctctaactgtggattttgaagcttttggtgggattgg
attattgcacctaaaagatataggccaattactgctctggagaatgtgaatttgtatttttgcaaaagtatcctcatac
ccatcttgctgcaccaagcaaaccagaggttcagccggccccctgctgtactcctacaaagatgtctccaattaatatgc
tatattttaatggcgaaggacaaataatatcggggaagattccagccatggtagtagatcgctgtgggtgttcatga
>bovine_piedmontese
atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatatttacctatttatgctgattgttgctgggccagtggatctgaatgagaacag
cgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaacactacatcctcaagactag
aagccataaaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctatcagacaactt
ttgcccagggtcctccactcctggaactgattgatcagttcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttgga
agacgatgactaccacgccaggacggaaacgggtcattaccatgcccacggagtctgatcttctaacgcaagtggaaggaa
aacccaaagtgttgcttctttaaattagctctaagatacaatacaataaaactagtaaaggcccaactgtggatataatctg
aggcctgtcaagactcctgcgacagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaaccatgaaagacgggtacaaggtatac
tggaatccgatctctgaaacttgacatgaaccaggcactggatatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaga
actggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagctttagatgagaatggccatgatcttgctgtaacc
ttcccagaaccaggagaagatggactgactccttttttagaagtcaaggtaacagacacaccaaaaagatctaggagaga
ttttgggcttgattgtgatgaacactccacagaatctcgatgctgtcgttaccctctaactgtggattttgaagcttttg
gatgggattggattattgcacctaaaagatataggccaattactgctctggagaatatgaatttgtatttttgcaaaag
taccctcatacccatcttgctgcaccaagcaaaccagaggttcagccggccccctgctgtactcctacaaagatgtctcc
aattaatatgctatatattttaatggcgaaggacaaataatatcggggaagattccagccatggtagtagatcgctgtgggt
gttcatga


La razza Belga e la miostatina

ctrl+MAIUSC+s

save as myostatin_mod.fas

\$ **clustalx**

Multiple Alignment Mode Font: 10



La razza Belga e la miostatina

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/all/?term=AF019620

An official website of the United States government [Here's how you know](#) ▾

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Search NCBI

AF019620 × **Search**

Results found in 5 databases

NUCLEOTIDE SEQUENCE

Bos taurus myostatin (MSTN) mRNA, complete cds

Bos taurus

1,128 bp mRNA sequence

AF019620.1

 [FASTA](#) [Gene](#)

[BLAST](#) [Download](#)

FASTA ▾

Send to: ▾

Change region shown

Customize view

Bos taurus myostatin (MSTN) mRNA, complete cds

GenBank: AF019620.1

[GenBank](#) [Graphics](#)

```
>AF019620.1 Bos taurus myostatin (MSTN) mRNA, complete cds
ATGCAAAACTGCAAATCTCTGTTTATATTTACCTATTTATGCTGATTGTTGCTGGCCCAGTGGATCTGA
ATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAATGTGGAAAAAGAGGGGCTGTGTAATGCATGTTTGTGGAGGGAAAA
CACTACATCCTCAAGACTAGAAGCCATAAAAATCCAAATCCTCAGTAACTTCGCCTGGAAACAGCTCCT
AACATCAGCAAAGATGCTATCAGACAACTTTTGCCCAAGGCTCCTCCACTCCTGGAAGTATTGATCAGT
TCGATGTCCAGAGAGATGCCAGCAGTGACGGCTCCTTGGAAAGACGATGACTACCACGCCAGGACGGAAAC
GGTCATTACCATGCCCACGGAGTCTGATCTTCTAACGCAAGTGGAAAGGAAAACCCAAATGTTGCTTCTTT
AAATTTAGCTCTAAGATACAATAACAATAAACTAGTAAAGGCCCAACTGTGGATATATCTGAGGCCTGTCA
AGACTCCTGCGACAGTGTTTGTGCAAATCCTGAGACTCATCAAACCCATGAAAGACGGTACAAGGTATAC
TGGAATCCGATCTCTGAAACTTGACATGAACCCAGGCACTGGTATTTGGCAGAGCATTGATGTGAAGACA
GTGTTGCAGAACTGGCTCAAACAACCTGAATCCAACCTTAGGCATTGAAATCAAAGCTTTAGATGAGAATG
GCCATGATCTTGCTGTAACCTTCCCAGAACCAGGAGAAGATGGACTGACTCCTTTTTTAGAAGTCAAGGT
AACAGACACACCAAAAAGATCTAGGAGAGATTTTGGGCTTGATTGTGATGAACACTCCACAGAATCTCGA
TGCTGTCGTTACCCTCTAACTGTGGATTTTGAAGCTTTTGGATGGGATTGGATTATTGCACCTAAAAGAT
ATAAGGCCAATTACTGCTCTGGAGAATGTGAATTTGTATTTTGCAAAAGTATCCTCATACCCATCTTGT
GCACCAAGCAAACCCAGAGGTTTCAGCCGGCCCCTGCTGTACTCCTACAAAGATGTCTCCAATTAATATG
CTATATTTTAATGGCGAAGGACAAATAATATACGGGAAGATTCCAGCCATGGTAGTAGATCGCTGTGGGT
GTTTCATGA
```

Analyze this sequence

[Run BLAST](#)

[Pick Primers](#)

Articles about the MSTN gene

[Combined Transcriptome and Metabolome Analysis](#) [Int J Mol Sci. 2

[Myostatin site-directed mutation and simultaneous PPAF](#) [J Cell Physiol. 2

[Association between polymorphisms Myf5, MSTN and](#) [Anim Biotechnol. 2

[See](#)

Reference sequence information

[RefSeq mRNA](#)

See reference mRNA sequence for t
MSTN gene (NM_001001525.3)

Miostatina: allineamento multi-sequenza

```
> x = paste("AF0196", 19:27, sep = "")  
> setwd('~ /DNA_SEQUENCES/')  
> load('piero.RData')  
> library(ape)  
> library(seqinr)  
> myostatin_x.seq = read.GenBank(x, as.character = TRUE)
```

usando la funzione `<read.GenBank>` del pacchetto APE (Analysis of Phylogenetics and Evolution), viene creata una lista delle sequenze nucleotidiche corrispondenti ai numeri di accesso a **GenBank** contenuti nel vettore **x**

GenBank Overview

What is GenBank?

GenBank[®] is the NIH genetic sequence database, an annotated collection of all publicly available DNA sequences ([Nucleic Acids Research, 2013 Jan;41\(D1\):D36-42](#)). GenBank is part of the [International Nucleotide Sequence Database Collaboration](#), which comprises the DNA DataBank of Japan (DDBJ), the European Nucleotide Archive (ENA), and GenBank at NCBI. These three organizations exchange data on a daily basis.

A GenBank release occurs every two months and is available from the [ftp site](#). The [release notes](#) for the current version of GenBank provide detailed information about the release and notifications of upcoming changes to GenBank. Release notes for [previous GenBank releases](#) are also available. GenBank growth [statistics](#) for both the traditional GenBank divisions and the WGS division are available from each release.

An [annotated sample GenBank record](#) for a *Saccharomyces cerevisiae* gene demonstrates many of the features of the GenBank flat file format.

Access to GenBank

There are several ways to search and retrieve data from GenBank.

- Search GenBank for sequence identifiers and annotations with [Entrez Nucleotide](#).

GenBank Resourc

[GenBank Home](#)

[Submission Types](#)

[Submission Tools](#)

[Search GenBank](#)

[Update GenBank Rec](#)

Home > Packages > ape

ape package^{5.8-1}

Analyses of Phylogenetics and Evolution

```
install.packages("ape")
```

Copy

Functions Readme Datasets Dependencies Imports Versions

subtreeplot

Zoom on a Portion of a
Phylogeny by Successive
Clicks

subtrees

All subtrees of a
Phylogenetic Tree

summary.phylo

Print Summary of a
Phylogeny

 Download source package

 Read PDF manual

Functions for reading, writing, plotting, and
manipulating phylogenetic trees, analyses of
comparative data in a phylogenetic
framework, ancestral character analyses

where

which.edge

write.dna

Miostatina: allineamento multi-sequenza

```
> str(myostatin_x.seq)
List of 9
 $ AF019619: chr [1:1128] "a" "t" "g" "c" ...
 $ AF019620: chr [1:1128] "a" "t" "g" "c" ...
 $ AF019621: chr [1:1128] "a" "t" "g" "c" ...
 $ AF019622: chr [1:1128] "a" "t" "g" "c" ...
 $ AF019623: chr [1:1128] "a" "t" "g" "c" ...
 $ AF019624: chr [1:1131] "a" "t" "g" "a" ...
 $ AF019625: chr [1:1128] "a" "t" "g" "c" ...
 $ AF019626: chr [1:1125] "a" "t" "g" "c" ...
 $ AF019627: chr [1:1128] "a" "t" "g" "c" ...
 - attr(*, "species")= chr [1:9] "Papio_hamadryas" "Bos_taurus"
"Gallus_gallus" "Ovis_aries" ...
> length(myostatin_x.seq)
[1] 9
```

Miostatina: allineamento multi-sequenza

```
> myostatin_x.seq[1]
$AF019619
  [1] "a" "t" "g" "c" "a" "a" "a" "a" "a" "a" "c" "t" "g" "c" "a" "a" "c" "t" "c"
 [19] "t" "g" "t" "g" "t" "t" "t" "a" "t" "a" "t" "t" "t" "a" "c" "c" "t" "g"
 [37] "t" "t" "t" "a" "t" "g" "c" "t" "g" "a" "t" "t" "g" "t" "t" "g" "c" "t"
   ...
[1099] "a" "t" "g" "g" "t" "a" "g" "t" "a" "g" "a" "c" "c" "g" "c" "t" "g" "c"
[1117] "g" "g" "g" "t" "g" "c" "t" "c" "a" "t" "g" "a"
```

Miostatina: allineamento multi-sequenza

```
> myostatin_x.seq = read.GenBank(x, as.character = FALSE)
> str(myostatin_x.seq)
List of 9
 $ AF019619: raw [1:1128] 88 18 48 28 ...
 $ AF019620: raw [1:1128] 88 18 48 28 ...
 $ AF019621: raw [1:1128] 88 18 48 28 ...
 $ AF019622: raw [1:1128] 88 18 48 28 ...
 $ AF019623: raw [1:1128] 88 18 48 28 ...
 $ AF019624: raw [1:1131] 88 18 48 88 ...
 $ AF019625: raw [1:1128] 88 18 48 28 ...
 $ AF019626: raw [1:1125] 88 18 48 28 ...
 $ AF019627: raw [1:1128] 88 18 48 28 ...
- attr(*, "class")= chr "DNABin"
- attr(*, "description")= chr [1:9] "AF019619.1 Papio hamadryas myostatin
(MSTN) mRNA, complete cds" "AF019620.1 Bos taurus myostatin (MSTN) mRNA,
complete cds" "AF019621.1 Gallus gallus myostatin (MSTN) mRNA, complete cds"
"AF019622.1 Ovis aries myostatin (MSTN) mRNA, complete cds" ...
- attr(*, "species")= chr [1:9] "Papio_hamadryas" "Bos_taurus"
"Gallus_gallus" "Ovis_aries" ...
>
```


Miostatina: allineamento multi-sequenza

```
> attributes(myostatin_x.seq)
$names
[1] "AF019619" "AF019620" "AF019621" "AF019622" "AF019623" "AF019624" "AF019625"
[8] "AF019626" "AF019627"

$class
[1] "DNABin"

$description
[1] "AF019619.1 Papio hamadryas myostatin (MSTN) mRNA, complete cds"
[2] "AF019620.1 Bos taurus myostatin (MSTN) mRNA, complete cds"
[3] "AF019621.1 Gallus gallus myostatin (MSTN) mRNA, complete cds"
[4] "AF019622.1 Ovis aries myostatin (MSTN) mRNA, complete cds"
[5] "AF019623.1 Sus scrofa myostatin (MSTN) mRNA, complete cds"
[6] "AF019624.1 Rattus norvegicus myostatin (MSTN) mRNA, complete cds"
[7] "AF019625.1 Meleagris gallopavo myostatin (MSTN) mRNA, complete cds"
[8] "AF019626.1 Danio rerio myostatin (MSTN) mRNA, complete cds"
[9] "AF019627.1 Homo sapiens myostatin (MSTN) mRNA, complete cds"

$species
[1] "Papio_hamadryas"      "Bos_taurus"           "Gallus_gallus"
[4] "Ovis_aries"           "Sus_scrofa"           "Rattus_norvegicus"
[7] "Meleagris_gallopavo"  "Danio_rerio"          "Homo_sapiens"

>
```

Miostatina: allineamento multi-sequenza

```
> myostatin_x.seq = read.GenBank(x, as.character = TRUE)
> attributes(myostatin_x.seq)
$names
[1] "AF019619" "AF019620" "AF019621" "AF019622" "AF019623" "AF019624"
"AF019625"
[8] "AF019626" "AF019627"

$species
[1] "Papio_hamadryas"      "Bos_taurus"           "Gallus_gallus"
[4] "Ovis_aries"           "Sus_scrofa"           "Rattus_norvegicus"
[7] "Meleagris_gallopavo"  "Danio_rerio"          "Homo_sapiens"

>
```

Miostatina: allineamento multi-sequenza

```
> library(seqinr)
> write.fasta(sequences = myostatin_x.seq, names = names(myostatin_x.seq),
nbchar = 80, file.out = "myostatin_x.fas")
>
```

uso la funzione `<write.fasta>` del pacchetto SEQINR (Biological Sequences Retrieval and Analysis) per creare il file di testo in formato «fasta» `<myostatin_x.fas>`, contenente le sequenze elencate nella list `<myostatin_x.seq>`

Home > Packages > seqinr

seqinr package 42-36

Biological Sequences Retrieval and Analysis

```
install.packages("seqinr")
```

Copy

Functions Datasets Dependencies Imports Versions

a

Converts amino-acid
three-letter code into the
one-letter one

aaa

Converts amino-acid one-
letter code into the three-
letter one

AAstat

To Get Some Protein
Statistics

⬇ Download source package

📖 Read PDF manual

Exploratory data analysis and data
visualization for biological sequence (DNA
and protein) data. Seqinr includes utilities
for sequence data management under the

acnucopen

al2bp

allistranks

Miostatina: allineamento multi-sequenza

nel terminale

```
$ locate myostatin_x.fas
```

```
/home/piero/myostatin_x.fas
```

```
/home/piero/DNA_SEQUENCES/myostatin_x.fas
```

questo è il «percorso» (PATH) del file <myostatin_x.fas>

```
$ pwd
```

```
/home/piero
```

sono già nella home, quindi non è necessario specificare l'intero PATH

```
$ gedit DNA_SEQUENCES/myostatin_x.fas
```

oppure

```
piero@piero-XPS-9320:~$ cd DNA_SEQUENCES/
```

```
piero@piero-XPS-9320:~/DNA_SEQUENCES$ pwd
```

```
/home/piero/DNA_SEQUENCES
```

```
piero@piero-XPS-9320:~/DNA_SEQUENCES$ gedit myostatin_x.fas
```

```
1 >AF019619
2 atgcaaaactgcaactctgtgtttatatattacctgtttatgctgattgttgctggccagtggaatcctaaatgagaacag
3 tgagcaaaaagaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtacttgagacaaaactaaatcttcaagaatag
4 aagccattaaaaatacaaatcctcagtaaaacttcgtctggaaacagctcctaatacagcaaaagatgctataagacaactt
5 ttaccctaaagctcctccactcgggaactgattgatcagatgatgttcagagggatgacagcagcgatggctctttgga
6 agatgacgattatcacgctacaacggaacaatcattaccatgcctacagagcttgatttttaaatgcaagtggatggaa
7 aaccctaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaatacaataaagtggtaaaggcccaactatggatatattg
8 agaccgctcgagactcctacaacagtggttggtgcaaatcctgagactcatcaaacctatgaaagacggtacaaggtatac
9 tggaaatccgatctctgaaacttgacatgaaccaggcactgggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtggtgcaaa
10 attggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaataaaagccttagatgagaatggctcatgatcttgctgtaacc
11 ttccaggaccaggagaagatgggctgaatcccttttagagggtcaaggtaacagacacacacaaaagatccagaaggga
12 ttttggtcttgactgtgatgagcactcaacagaatcgcgatgctgtgttaccctctaacttggaattttgaagctcttg
13 gatgggattggattatcgctcctaaaagatataaggccaattactgctctggagagtgtaatttgaatttttacaacaa
14 tatcctcatactcatctggtacaccaagcaaacccagagggttcagcaggcccttgctgtactcccacaagatgtctcc
15 aattaatatgctatattttaatggcaagaacaataatatatgggaaaattccagccatggtagtagaccgctgcgggt
16 gctcatga
17 >AF019620
18 atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatattacctatttatgctgattgttgctggccagtggaatcgaatgagaacag
19 cgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaacactacatcctcaagactag
20 aagccataaaaaatccaaatcctcagtaaaacttcgcctggaaacagctcctaatacagcaaaagatgctatcagacaactt
21 ttgccaaggctcctccactcctggaactgattgatcaggttcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttggga
22 agacgatgactaccacgcccaggacggaacgggtcattaccatgcccacggagctgatcttctaacgcaagtggaaaggaa
23 aaccctaaatgttgcttctttaaatttagctctaaagatatacaataaaacttagtaaaaggcccaactgtggatatatctg
24 aggcctgtcaagactcctgcgacagtggttggtgcaaatcctgagactcatcaaacctatgaaagacggtacaaggtatac
25 tggaaatccgatctctgaaacttgacatgaaccaggcactgggtatttggcagagcattgatgtgaagacagtggtgcaga
26 actggctcaaacacactgaatccaacttaggcattgaaatcaaaagccttagatgagaatggccatgatcttgctgtaacc
27 ttccagaaccaggagaagatggactgactcctttttagaagtcaaggtaacagacacacacaaaagatctaggagaga
28 ttttgggcttgattgtgatgaacactccacagaatctcgatgctgtcggttaccctctaacttggaattttgaagcttttg
29 gatgggattggattattgcacctaagatataaggccaattactgctctggagaatgtgaatttgaatttttgcaaaag
30 tatcctcataccatcttggtgcaccaagcaaacccagagggttcagccggcccttgctgtactcctacaagatgtctcc
31 aattaatatgctatattttaatggcgaaggacaaataataacgggaagattccagccatggtagtagatcgctgtgggt
32 gttcatga
33 >AF019621
34 atgcaaaagctagcagctctatgtttatatattacctgttcatgcagatcgcggttgatccgggtggctctggatggcagtag
35 tcagcccacagagaacgctgaaaaagacggactgtgcaatgctgtacgtggagacagaatacaaaaatcctccagaatag
36 aagccataaaaaatccaaatcctcagcaaaactgcgcctggaaacagcactaacatttagcagggacgttattaagcagctt
37 ttaccctaaagctcctccactgcaggaaactgattgatcagatgatgttcagagggagcagatagcgatggctccttggga
38 agacgatgactatcatgccacaaccgagacgattatcacaatgcctacggagcttgattttctgtacaaaatggagggaa
39 aaccctaaatgttgcttctttaaatttagctctaaaatacaataaacaagtagtaaaaggcacaattatggatatacttg
40 aggcaggtccaaaacactacaacgggtgttggtgcagatcctgagactcattaagcccatgaaagacggtacaagatatac
41 tggaaattcgatctttgaaacttgacatgaaccaggcactgggtatctggcagagatattgatgtgaagacagtgctgcaaa
42 attggctcaaacagcctgaatccaatttaggcattgaaataaaagcctttgatgagactggacgagatcttgctgtcaca
43 ttccaggaccgggtgaagatggattgaacccatttttagagggtcagagttacagacacaccgaaacgggtcccgcagaga
44 ttttggccttgactgtgatgagcactcaacggaatcccgatgttgctgctaccgctgacagtggaatttcgaagcttttg
45 gatgggactggattatagcactaaaagatataaaagccaattactgctccggagaatgcgaatttgtgtttctacagaaa
46 taccgcacactcacctggtacaccaagcaaatcccagagggttcagcaggcccttgctgcacaccaccaagatgtcccc
47 tataaacatgctgtatttcaatggaaaagaacaataatatatggaaaagataccagccatggttgtagatcggttgcggtt
48 gctcatga
49 >AF019622
```

Sostituire ogni numero di accesso con il
nome scientifico della specie
(ATTENZIONE:
NON DEVONO ESSERCI SPAZI!)

La razza Belga e la miostatina

dopo
>Bos_taurus

Aggiungere

```
>bovine_belgian
atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatatttacctatttatgctgattgttgctgggccagtggatctgaatgagaacag
cgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaacactacatcctcaagactag
aagccataaaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctatcagacaactt
ttgcccagggtcctccactcctggaactgattgatcagttcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttgga
agacgatgactaccacgccaggacggaaacgggtcattaccatgcccacggagtctgatcttctaacgcaagtggaaggaa
aaccCAAatgTTgcttctttaaatttagctctaagatacaatacaataaaactagtaaaggcccaactgtggatataatctg
aggcctgtcaagactcctgcgacagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaaccatgaaagacgggtacaaggtatac
tggaatccgatctctgaaacttgacatgaaccaggcactggatatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaga
actggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagccttagatgagaatggccatgatcttgctgtaacc
ttcccagaaccaggagaagatggactgactccttttttagaagtcaaggtaacagacacaccaaaaagatctaggagaga
ttttgggcttgattgtgacagaatctcgatgctgtcgttaccctctaactgtggattttgaagcttttggtgggattgg
attattgcacctaaaagatataggccaattactgctctggagaatgtgaatttgtattttgcaaaagtatcctcatac
ccatcttgctgcaccaagcaaaccagaggttcagccggccctgctgtactcctacaaagatgtctccaattaatatgc
tatattttaatggcgaaggacaaataatatacgggaagattccagccatggtagtagatcgctgtgggtgttcatga
>bovine_piedmontese
atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatatttacctatttatgctgattgttgctgggccagtggatctgaatgagaacag
cgagcagaaggaaaatgtggaaaaagaggggctgtgtaatgcatgtttgtggagggaaaacactacatcctcaagactag
aagccataaaaaatccaaatcctcagtaaacttcgcctggaaacagctcctaacatcagcaaagatgctatcagacaactt
ttgcccagggtcctccactcctggaactgattgatcagttcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttgga
agacgatgactaccacgccaggacggaaacgggtcattaccatgcccacggagtctgatcttctaacgcaagtggaaggaa
aaccCAAatgTTgcttctttaaatttagctctaagatacaatacaataaaactagtaaaggcccaactgtggatataatctg
aggcctgtcaagactcctgcgacagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaaccatgaaagacgggtacaaggtatac
tggaatccgatctctgaaacttgacatgaaccaggcactggatatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaga
actggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaatcaaagccttagatgagaatggccatgatcttgctgtaacc
ttcccagaaccaggagaagatggactgactccttttttagaagtcaaggtaacagacacaccaaaaagatctaggagaga
ttttgggcttgattgtgatgaacactccacagaatctcgatgctgtcgttaccctctaactgtggattttgaagcttttg
gatgggattggattattgcacctaaaagatataggccaattactgctctggagaatatgaatttgtattttgcaaaag
taccctcatacccatcttgctgcaccaagcaaaccagaggttcagccggccctgctgtactcctacaaagatgtctcc
aattaatatgctatatattttaatggcgaaggacaaataatatacgggaagattccagccatggtagtagatcgctgtgggt
gttcatga
```


La razza Belga e la miostatina

ctrl+MAIUSC+s

save as myostatin_x_mod.fas

Editor di testo

myostatin_x.fas
~/DNA_SEQUENCES

Salva

1 >Papio_hamadryas
2 atgcaaaaactgcaactctgtgtt
3 tgagcaaaaagaaaatgtggaaaa
4 aagccattaaaatacaaatcctcag
5 ttacccaaagctcctccactccgg
6 agatgacgattatcacgctacaac
7 aaccctaatgttgcttctttaaat
8 agaccgctcgagactcctacaacag
9 tggaatccgatctctgaaacttgac
10 attggctcaaacaacctgaatccaa
11 ttcccaggaccaggagaagatggg
12 ttttggtcttgactgtgatgagcac
13 gatgggattggattatcgctcctaa
14 tatcctcatactcatctggtacac
15 aattaatatgctatattttaatgg
16 gttcatga
17 >Bos_taurus
18 atgcaaaaactgcaaactctgtgtt
19 cgagcagaaggaaaatgtggaaaa
20 aagccataaaaatccaaatcctcag
21 ttgccaaggctcctccactcctg
22 agacgatgactaccacgccaggac
23 aaccctaatgttgcttctttaaat
24 aggcctgtcaagactcctgcgacag
25 tggaatccgatctctgaaacttgac
26 actggctcaaacaacctgaatccaa
27 ttcccagaaccaggagaagatggag
28 ttttgggcttgattgtgatgaacac
29 gatgggattggattattgcaccta
30 tatcctcataccatcttgtgcac
31 aattaatatgctatattttaatgg
32 gttcatga
33 >bovine_belgian
34 atgcaaaaactgcaaactctgtgtt
35 cgagcagaaggaaaatgtggaaaa
36 aagccataaaaatccaaatcctcag
37 ttgccaaggctcctccactcctg
38 agacgatgactaccacgccaggac
39 aaccctaatgttgcttctttaaat
40 aggcctgtcaagactcctgcgacag
41 tggaatccgatctctgaaacttgac
42 actggctcaaacaacctgaatccaa
43 ttcccagaaccaggagaagatggag
44 ttttgggcttgattgtgacagaat
45 attattgcacctaagaatataagg
46 ccatctgtgcaccaagcaaaccc
47 tatatttaattggcgaaggacaa
48 >bovine_piedmontese
49 atgcaaaaactgcaaactctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggccagtggaatcgaatgagaacag

Apri

Nome myostatin_x_mod.fas

Salva

Home
Documenti
Immagini
Musica
Scaricati
Video
DNA_SEQUENCES
+ Altre posizioni

< piero DNA_SEQUENCES >

Nome	Dimensione	Tipo	Data di modifica
Bovidae_myostatin.fasta	8,6 kB	Testo	15 nov 2024
database_completo_miostatina.txt	480,1 kB	Testo	13 gen 2024
dexter.fasta	88,6 kB	Testo	3 set 2024
fcodons.R	210 byte	Testo	11 nov 2024
link_Cervidae.txt	344 byte	Testo	10 gen 2024
MT_Cervidae	333,7 kB	Testo	10 gen 2024
MT_Cervidae.fasta	448,4 kB	Testo	11 gen 2024
my_data.txt	98,9 kB	Testo	27 dic 2023
myostatin.dnd	3,7 kB	Testo	19 nov 2024
myostatin.fas	220,0 kB	Testo	gio
myostatin.fasta	714,6 kB	Testo	19 nov 2024
myostatin.nexus	1,2 MB	Testo	1 ott 2024
MYOSTATIN_ACCESSION_NUMBERS.txt	1,7 kB	Testo	29 set 2024
MYOSTATIN_DATA.txt	17,3 kB	Testo	29 set 2024
myostatin_mod.aln	0 byte	Testo	gio
myostatin_mod.dnd	3,8 kB	Testo	gio
myostatin_mod.fas	222,3 kB	Testo	gio
myostatin_mod.fasta	727,8 kB	Testo	gio
myostatin_species_names.dnd	4,3 kB	Testo	ven
myostatin_species_names.fas	222,9 kB	Testo	ven
myostatin_species_names.fasta	740,2 kB	Testo	ven
myostatin_x.fas	12,7 kB	Testo	15:16
myostatin_x_mod.dnd	359 byte	Testo	09:50
myostatin_x_mod.fasta	13,0 kB	Testo	09:50
Phocoena_sinus_myostatin.fas	3,0 kB	Testo	21 nov 2024
piero.fas	1,2 kB	Testo	6 dic 2024
Rhinolophus_sinicus_myostatin.fas	2,9 kB	Testo	28 nov 2024
Sus_scrofa_myostatin.fas	1,2 kB	Testo	21 nov 2024
sylvia.fas	31,5 kB	Testo	14 nov 2024
wolves.csv	1,1 kB	Testo	25 dic 2023

Codifica caratteri: Locale attuale (UTF-8)


Fine riga: Unix/Linux

Tutti i file di testo

La razza Belga e la miostatina

nel terminale

```
$ clustalx
```



Load Sequence File				
< piero DNA_SEQUENCES >				
Nome	Dimensione	Tipo	Data di modifica	
Bos_taurus_myostatin.fas	2,9 kB	Testo	15 nov 2024	
Bovidae_myostatin.dnd	75 byte	Testo	15 nov 2024	
Bovidae_myostatin.fas	8,6 kB	Testo	15 nov 2024	
Bovidae_myostatin.fasta	8,6 kB	Testo	15 nov 2024	
database_completo_miostatina.txt	480,1 kB	Testo	13 gen 2024	
dexter.fasta	88,6 kB	Testo	3 set 2024	
fcodons.R	210 byte	Testo	11 nov 2024	
link_Cervidae.txt	344 byte	Testo	10 gen 2024	
mcpherron-lee-1997-double-muscling-in-cattle-due-to-mu...	537,5 kB	Documento	27 set 2024	
MT_Cervidae	333,7 kB	Testo	10 gen 2024	
MT_Cervidae.fasta	448,4 kB	Testo	11 gen 2024	
my_data.txt	98,9 kB	Testo	27 dic 2023	
myostatin.dnd	3,7 kB	Testo	19 nov 2024	
myostatin.fas	220,0 kB	Testo	gio	
myostatin.fasta	714,6 kB	Testo	19 nov 2024	
myostatin.nexus	1,2 MB	Testo	1 ott 2024	
myostatin.RData	8,8 MB	R Data File	28 set 2024	
MYOSTATIN_ACCESSION_NUMBERS.txt	1,7 kB	Testo	29 set 2024	
MYOSTATIN_DATA.txt	17,3 kB	Testo	29 set 2024	
myostatin_mod.aln	0 byte	Testo	gio	
myostatin_mod.dnd	3,8 kB	Testo	gio	
myostatin_mod.fas	222,3 kB	Testo	gio	
myostatin_mod.fasta	727,8 kB	Testo	gio	
myostatin_species_names.dnd	4,3 kB	Testo	ven	
myostatin_species_names.fas	222,9 kB	Testo	ven	
myostatin_species_names.fasta	740,2 kB	Testo	ven	
myostatin_x.fas	12,7 kB	Testo	15:16	
myostatin_x_mod.dnd	359 byte	Testo	09:50	
myostatin_x_mod.fas	12,7 kB	Testo	15:22	
myostatin_x_mod.fasta	13,0 kB	Testo	09:50	

La razza Belga e la miostatina

[illegible]

	GAOPEN	GAPEXTENSION	DNA TRANSITION WEIGHT
PAIRWISE ALIGNMENT PARAMETERS	10.0	0.2	
MULTIPLE ALIGNMENT PARAMETERS	10.0	0.1	0.5

Mode: Multip

Do Complete Alignment Ctrl+L
Do Guide Tree Only Ctrl+G

Do Alignment from Guide Tree

Realign Selected Sequences

Realign Selected Residue Range

Align Profile 2 to Profile 1

Align Profiles from Guide Trees

Align Sequences to Profile 1

Align Sequences to Profile 1 from Tree

Alignment Parameters

Iteration

Output Format Options

Set All Parameters to default

☐ Reset New Gaps before Alignment


☐ Reset All Gaps before Alignment

Pairwise Alignment Parameters

Multiple Alignment Parameters

Protein Gap Parameters

Secondary Structure Parameters



The screenshot shows the 'Pairwise Parameters' dialog box in Geneious. The 'Slow/Accurate Pairwise Parameters' option is selected. The 'Gap Opening [0-100]' is set to 10. The background displays a DNA sequence alignment with a color-coded gap penalty scale.

Pairwise Parameters

OK

Slow-Accurate

Slow/Accurate Pairwise Parameters Fast/Approx F

Gap Opening [0-100]: 10

Gap Extend [0-100]: 0.2

Protein Weight Matrix

☐ BLOSUM 30 ☐ PAM 350 ☒ Gonnet 250

☐ Identity matrix ☐ User defined

Load protein matrix:

DNA Weight Matrix

☒ IUB ☐ CLUSTALW(1.6) ☐ User defined

Load DNA matrix:

Do Complete Alignment	Ctrl+L
Do Guide Tree Only	Ctrl+G

Do Alignment from Guide Tree

Realign Selected Sequences

Realign Selected Residue Range

Align Profile 2 to Profile 1

Align Profiles from Guide Trees

Align Sequences to Profile 1

Align Sequences to Profile 1 from Tree

Alignment Parameters

Iteration

Output Format Options

Set All Parameters to default

Danio rerio

Homo sapiens

Figure 1: Multiple sequence alignment of 100 protein sequences. The alignment is shown as a grid of colored blocks representing different amino acids. A legend on the left indicates the color coding for amino acids: A (blue), C (green), E (red), G (yellow), I (purple), L (orange), M (brown), P (pink), Q (light blue), R (dark red), S (light green), T (light blue), V (dark blue), W (dark green), and Y (yellow). The alignment is divided into five regions marked with asterisks (*). The first region (1-20) shows a high degree of conservation, while the second region (21-40) shows a high degree of variability. The third region (41-60) shows a high degree of conservation, while the fourth region (61-80) shows a high degree of variability. The fifth region (81-100) shows a high degree of conservation.

Mode: Multiple Alignment Mode Font: 24

Papio_hamadryas
Bos_taurus
bovine_belgian
bovine_piedmontese
Gallus_gallus
Ovis_aries
Sus_scrofa
Rattus_norvegicus
Meleagris_gallopavo
Danio_rerio
Homo_sapiens

*** * * * *

ATGCAAAAACCTGCAACTCTGTGTTTATATTTACCTGTTTATGCTGATTGTTGCTGGTCCAGTGGATCTAAATGAGAACAGTGAGCAAAAAGAAAAATGTG
ATGCAAAAACCTGCAAAATCTCTGTTTATATTTACCTATTTATGCTGATTGTTGCTGGCCCCAGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAAATGTG
ATGCAAAAACCTGCAAAATCTCTCTCCAGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAAATGTG
ATGCAAAAACCTGCAAAATCTCTCTCCAGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAAATGTG
ATGCAAAAAGCTAGCAGTCTATCCGGTGGCTCTGGATGGCAGTAGTCAGCCCACAGAGAACGCT
ATGCAAAAACCTGCAAAATCTTTCCAGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAAATGTG
ATGCAAAAACCTGCAAAATCTATCCCGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAAAAAGGAAAAATGTG
ATGATTCAAAAACCGCAAAATGCCCCAGTGGATCTAAATGAGGACAGTGAGAGAGAGGCGAAT
ATGCAAAAAGCTAGCAGTCTATCCGGTGGCTCTTGATGGCAGTAGTCAGCCCACAGAGAACGCT
ATGCATTTTACACAGGTTTAAAGGTTATGGAGATATAACGGCGCACCAGCAGCCTTCCACAGCC
ATGCAAAAACCTGCAACTCTGTCCAGTGGATCTAAATGAGAACAGTGAGCAAAAAGAAAAATGTG

Alignment Parameters

OK

Multiple Parameters

Gap Opening [0-100]: 10

Gap Extension [0-100]: 0.1

Delay Divergent Sequences(%): 30

DNA Transition Weight[0-1] 0.5

Use Negative Matrix Off

Protein Weight Matrix

☐ BLOSUM series ☐ PAM series ☐ User defined
☒ Gonnet series ☐ Identity matrix

Load protein matrix:

DNA Weight Matrix

☒ IUB ☐ CLUSTALW(1.6) ☐ User defined

Load DNA matrix:

Ctrl+L

Ctrl+G

Realign Selected Sequences

Align Profile 2 to Profile 1

Align Sequences to Profile 1

Alignment Parameters

Set All Parameters to default

Danio rerio

Homo sapiens

* * * * *
 AACTCTGTGTTTATATTTACCTGTTTATGCTGATTGTTGCTGGTCCAGTGGATCTAAATGAGAACAGTGAGCAAAAAGAAAATGTG
 AATCTCTGTGTTTATATTTACCTATTTTATGCTGATTGTTGCTGGCCCAGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAATGTG
 AATCTCTGTGTTTATATTTACCTATTTTATGCTGATTGTTGCTGGCCCAGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAATGTG
 AATCTCTGTGTTTATATTTACCTATTTTATGCTGATTGTTGCTGGCCCAGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAATGTG
 AGTCTATGTTTATATTTACCTGTTTCATGCAGATCGCGGTTGATCCGGTGGCTCTGGATGGCAGTAGTCAGCCCACAGAGAACGCT
 AATCTTTGTTTATATTTACCTATTTTATGCTGCTTGTTGCTGGCCCAGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAATGTG
 AATCTATGTTTATATTTACCTGTTTATGCTGATTGTTGCTGGTCCCGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAAAAGGAAAATGTG
 GCAAATGTATGTTTATATTTACCTGTTTGTGCTGATTGCTGCTGGCCCAGTGGATCTAAATGAGGACAGTGAGAGAGAGGCGAAT
 AGTCTATGTTTATATTTACCTGTTTCATGCAGATTTTAGTTTCATCCGGTGGCTCTTGATGGCAGTAGTCAGCCCACAGAGAACGCT
 AGGTTTTAATTTCTCTAAGTGTAATTAATTGCATGTGGTCCAGTGGGTTATGGAGATATAACGGCGCACCAGCAGCCTTCCACAGCC
 AACTCTGTGTTTATATTTACCTGTTTATGCTGATTGTTGCTGGTCCAGTGGATCTAAATGAGAACAGTGAGCAAAAAGAAAATGTG

Mode: Multiple Alignment Mode Font: 24

Papio_hamadryas
Bos_taurus
bovine_belgian
bovine_piedmontese
Gallus_gallus
Ovis_aries
Sus_scrofa
Rattus_norvegicus
Meleagris_gallopavo
Danio_rerio
Homo_sapiens

*** * * * *

```
ATGCAAAAACCTGCAACTCTGTGTTTATATTTACCTGTTTATGCTGATTGTTGCTGGTCCAGTGGATCTAAATGAGAACAGTGAGCAAAAAGAAAAATGTG
ATGCAAAAACCTGCAAAATCTCTGTTTATATTTACCTATTTATGCTGATTGTTGCTGGCCCAGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAAATGTG
ATGCAAAAACCTGCAAAATCTCTGTTTATATTTACCTATTTATGCTGATTGTTGCTGGCCCAGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAAATGTG
ATGCAAAAACCTGCAAAATCTCTGTTTATATTTACCTATTTATGCTGATTGTTGCTGGCCCAGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAAATGTG
ATGCAAAAAGCTAGCAGTCTATGTTTCTGGTCCAGTGGCTCTGGATGGCAGTAGTCAGCCCACAGAGAACGCT
CTGGCCCAGTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAAATGTG
CTGGTCCCCTGGATCTGAATGAGAACAGCGAGCAGAAGGAAAAATGTG
CTGCTGGCCCAGTGGATCTAAATGAGGACAGTGAGAGAGAGGCGAAT
TTCATCCGGTGGCTCTTGATGGCAGTAGTCAGCCCACAGAGAACGCT
CAGTGGGTTATGGAGATATAACGGCGCACCCAGCAGCCTTCCACAGCC
CTGGTCCAGTGGATCTAAATGAGAACAGTGAGCAAAAAGAAAAATGTG
```

Output Format Options

OK

Output Files

- ☐ CLUSTAL format ☐ NBRF/PIR format
☐ GCG/MSF format ☐ PHYLIP format
☐ GDE format ☐ NEXUS format
☒ FASTA format

GDE output case : Lower ▾
CLUSTALW sequence numbers : Off ▾
Output order : Aligned ▾
Parameters output : Off ▾

Do Complete Alignment Ctrl+L

Do Guide Tree Only Ctrl+G

Do Alignment from Guide Tree

Realign Selected Sequences

Realign Selected Residue Range

Align Profile 2 to Profile 1

Align Profiles from Guide Trees

Align Sequences to Profile 1

Align Sequences to Profile 1 from Tree

Alignment Parameters

Iteration

Output Format Options

Set All Parameters to default

Danio_rerio

Homo_sapiens

*

*

*

*

*

AA	CT	CT	GT	GT	TTT	AT	ATTT	ACCT	GT	TTT	AT	GT	CT	GA	TT	GT	TT	GT	CT	GG	TCC	AGT	GG	AT	CT	AAA	AT	GAGA	AC	AGT	GT	GAG	CA	AAAA	AG	AAAA	AT	GT	G					
AA	AT	CT	CT	GT	TTT	AT	ATTT	ACCT	ATTT	AT	GT	CT	GA	TT	GT	TT	GT	CT	GG	CCC	AGT	GG	AT	CT	GA	AT	GAGA	AC	AGC	GAG	CAG	AA	AGG	AAAA	AT	GT	G							
AA	AT	CT	CT	GT	TTT	AT	ATTT	ACCT	ATTT	AT	GT	CT	GA	TT	GT	TT	GT	CT	GG	CCC	AGT	GG	AT	CT	GA	AT	GAGA	AC	AGC	GAG	CAG	AA	AGG	AAAA	AT	GT	G							
AA	AT	CT	CT	GT	TTT	AT	ATTT	ACCT	ATTT	AT	GT	CT	GA	TT	GT	TT	GT	CT	GG	CCC	AGT	GG	AT	CT	GA	AT	GAGA	AC	AGC	GAG	CAG	AA	AGG	AAAA	AT	GT	G							
CA	GT	CT	AT	GT	TTT	AT	ATTT	ACCT	GT	TC	AT	GT	CA	GA	TC	GC	CGG	TT	GA	TCC	GGT	GG	CT	CT	GG	AT	GG	CAG	TAG	TC	AG	CCC	AC	AG	AGA	AC	GC	T						
AA	AT	CT	TTT	G	TTT	AT	ATTT	ACCT	ATTT	AT	GT	CT	GA	TT	GT	TT	GT	CT	GG	CCC	AGT	GG	AT	CT	GA	AT	GAGA	AC	AGC	GAG	CAG	AA	AGG	AAAA	AT	GT	G							
AA	AT	CT	AT	GT	TTT	AT	ATTT	ACCT	GT	TTT	AT	GT	CT	GA	TT	GT	TT	GT	CT	GG	TCCC	GT	GG	AT	CT	GA	AT	GAGA	AC	AGC	GAG	CA	AAA	AGG	AAAA	AT	GT	G						
CG	CAA	AT	GT	AT	GT	TTT	AT	ATTT	ACCT	GT	TTT	GT	GT	CT	GA	TT	GT	CT	GG	CCC	AGT	GG	AT	CT	AAA	AT	GAGG	AC	AGT	GT	GAG	AG	AG	AGG	CG	GA	AT							
CA	GT	CT	AT	GT	TTT	AT	ATTT	ACCT	GT	TC	AT	GT	CA	GA	TTT	T	AG	TT	CA	TCC	GGT	GG	CT	CT	T	GAT	GG	CAG	TAG	TC	AG	CCC	AC	AG	AGA	AC	GC	T						
AT	GC	AT	TTTT	A	CAC	AGG	TTTT	AATTT	CT	CT	AA	GT	GT	AT	TAAT	T	GC	AT	GT	GGT	TCC	AGT	GGG	TT	AT	GG	AG	AT	TA	AC	GG	CG	CACC	AGC	AG	CCTT	CC	AC	AG	CC				
AT	GC	AAAA	ACT	GT	CA	ACT	CT	GT	GT	TTT	AT	ATTT	ACCT	GT	TTT	AT	GT	CT	GA	TT	GT	TT	GT	CT	GG	TCC	AGT	GG	AT	CT	AAA	AT	GAGA	AC	AGT	GT	GAG	CA	AAAA	AG	AAAA	AT	GT	G

Mode: Multiple Alignment Mode Font: 24

Papio_hamadryas
Bos_taurus
bovine_belgian
bovine_piedmontese
Gallus_gallus
Ovis_aries
Sus_scrofa
Rattus_norvegicus
Meleagris_gallopavo
Danio_rerio
Homo_sapiens

*** * * * *

ATGCAAAA	ACTGCA	ACTCTG	TGTTT	TATAT	TTTAC	CTGTT	TATG	CTGAT	TGTT	GCTGG	TCCAG	TGGAT	CTAA	ATGAG	AACAG	TGAG	CAAAA	AGAAA	ATGT	G	
ATGCAAAA	ACTGCA	AAATCT	CTGT	TTTAT	ATTTA	CTAT	TTTAT	GCTG	ATTG	TTGCT	GGCCC	AGTGG	ATCT	GAA	TGAG	AACAG	CGAG	CAGA	AGGAA	ATGT	G
ATGCAAAA	ACTGCA	AAATCT	CTGT	TTTAT	ATTTA	CTAT	TTTAT	GCTG	ATTG	TTGCT	GGCCC	AGTGG	ATCT	GAA	TGAG	AACAG	CGAG	CAGA	AGGAA	ATGT	G
ATGCAAAA	ACTGCA	AAATCT	CTGT	TTTAT	ATTTA	CTAT	TTTAT	GCTG	ATTG	TTGCT	GGCCC	AGTGG	ATCT	GAA	TGAG	AACAG	CGAG	CAGA	AGGAA	ATGT	G
ATGCAAAA	AGCTAG	CAGTCT	ATGT	TTTAT	ATTTA	CTGTT	CATG	CAGAT	CGCG	GTGAT	CCGGT	GGCT	CTGG	ATGG	CAGT	AGT	CAGC	CCAC	AGAGA	ACGCT	G
ATGCAAAA	ACTGCA	AAATCT	TTGT	TTTAT	ATTTA	CTAT	TTTAT	GCTG	CTTG	TTGCT	GGCCC	AGTGG	ATCT	GAA	TGAG	AACAG	CGAG	CAGA	AGGAA	ATGT	G
ATGCAAAA	ACTGCA	AAATCT	ATGT	TTTAT	ATTTA	CTGTT	TATG	CTGAT	TGTT	GCTGG	TCCCG	TGGAT	CTGA	ATGAG	AACAG	CGAG	CAAA	AGGAA	ATGT	G	
ATGATT	CAAAA	ACCG	CAAA																		
ATGCAAAA	AGCTAG	CAGTCT																			
ATGCAT	TTTTA	CACAG	GTTT																		
ATGCAAAA	ACTGCA	AACTCT																			

Complete Alignment

Output Guide Tree:

Browse

Output Alignment Files

Fasta:

Browse

OK

Cancel

Prima

--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dopo

		**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
--	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


TGAACACTCCA

[illegible]

La razza Belga e la miostatina

La razza Piemontese e la miostatina

Transizione G → A




Le razze bovine Belga e Piemontese, se venissero classificate nella stessa categoria in base alla somiglianza fenotipica dovuta all'iperplasia muscolare congenita, formerebbero un **gruppo polifiletico**, ossia artificiale.


Ciò evidenzia i limiti della classificazione basata sul fenotipo, ossia sui caratteri morfologici.



Belga



Piemontese



Files

main + 🔍

🔍 Go to file t

- 📄 Apis_mellifera_mtDNA.fas
- 📄 BASAL_METABOLIC_RATE_DATA...
- 📄 E1_MIOSTATINA_10.12.2025.pdf
- 📄 E3_PESO_CORPOREO_VS_MET...
- 📄 E4_EARLY_HOLOGENE_SAHAR...
- 📄 E5_STUDI_DI_ASSOCIAZIONE_...
- 📄 INDICAZIONI_X_LA_STESURA_D...
- 📄 Papio_hamadryas_myostatin.fas
- 📄 README.md
- 📄 grafico_con_animali.jpg
- 📄 jane_1672_sm_supplementarymat...
- 📄 metabolismo_basale.xlsx
- 📄 myostatin_species_names.fas**

ESERCITAZIONI / myostatin_species_names.fas 📄

 **privoira** Add files via upload cdecaa6 · last month ⌚ History

Download raw file

Code Blame Raw 📄 ⬇ ✎ ⌵

```
1 >baboon
2 atgcaaaaactgcaactctgtgtttatatttacctgtttatgctgattgttgctggccagtgatctaatgagaacag
3 tgagcaaaaagaaaatgtggaaaagaggggctgtgtaatgcattgctgacttgagacaaaactaatcttcaagaatag
4 aagccattaaaatacaaatcctcagtaaaacttcgctcgaaacagctcctaacatcagcaaagatgctataagacaactt
5 ttacccaaagctcctccactccgggaactgattgatcagtatgatgtccagagggatgacagcagcgatggctctttgga
6 agatgacgattatcacgtacaacggaaacaatcattaccatgcctacagagtctgatttttaaatgcaagtggatggaa
7 aacccaaatgttgcttctttaaataggctctaaatacaataaaagtggtaaaggcccaactatggatatatttg
8 agaccgctcgagactcctacaacagtgtttgtgcaaatcctgagactcatcaaacctatgaaagacggtacaaggtatac
9 tggaaatccgatctctgaaacttgacatgaaccaggcactggatttggcagagcattgatgtgaagacagtgttgcaaa
10 attggctcaaacaacctgaatccaacttaggcattgaaataaaagctttagatgagaatggatcatgatttgcgtgaacc
11 tccccaggaccaggagaagatgggctgaatcccttttagaggtaaggtaacagacacacaaaaagatccagaaggga
12 ttttggctctgactgtgatgagcactcaacagaatcgcgatgctgctgtaccctctaactgtggattttgaagctcttg
13 gatgggattggattatcgctcctaaaagatataaggccaattactgctctggagagtgtgaatttgtattttacaaaaa
14 taccctcactcatctggtacaccaagcaaacccagagggttcagcaggcccttgctgtactcccacaaagatgtctcc
15 aattaatatgctatatattttaatggcaaagaacaaataatatatgggaaaattccagccatggtagtagaccgctgcgggt
16 gctcatga
17 >bovine_wild
18 atgcaaaaactgcaaatctctgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtgatctgaatgagaacag
19 cgagcagaaggaaaatgtggaaaagaggggctgtgtaatgcattgttgaggggaaaactacatcctcaagactag
20 aagccataaaaaatccaaatcctcagtaaaacttcgctcgaaacagctcctaacatcagcaaagatgctatcagacaactt
21 ttgccaaggtcctccactcctggaactgattgatcagttcgatgtccagagagatgccagcagtgacggctccttggga
```



Miostatina: allineamento multi-sequenza

Mode: Multiple Alignment Mode Font: 10

Cancel

Load Sequence File

Q Open

Recenti

Home

Documenti

Immagini

Musica

Scaricati

Video


DNA_SEQUENCES

+ Altre posizioni

< piero DNA_SEQUENCES >

Nome	Dimensione	Tipo	Data di modifica
.RData	10,2 MB	R Data File	leri
.Rhistory	15,5 kB	Testo	leri
allineamento_miostatina_blast.txt	480,1 kB	Testo	11 gen 2024
Bos_taurus_myostatin.fas	2,9 kB	Testo	15 nov 2024
Bovidae_myostatin.dnd	75 byte	Testo	15 nov 2024
Bovidae_myostatin.fas	8,6 kB	Testo	15 nov 2024
Bovidae_myostatin.fasta	8,6 kB	Testo	15 nov 2024
database_completo_miostatina.txt	480,1 kB	Testo	13 gen 2024
dexter.fasta	88,6 kB	Testo	3 set 2024
fcodons.R	210 byte	Testo	11 nov 2024
link_Cervidae.txt	344 byte	Testo	10 gen 2024
mcpherron-lee-1997-double-muscling-in-cattle-due-to-mu...	537,5 kB	Documento	27 set 2024
MT_Cervidae	333,7 kB	Testo	10 gen 2024
MT_Cervidae.fasta	448,4 kB	Testo	11 gen 2024
my_data.txt	98,9 kB	Testo	27 dic 2023
myostatin.dnd	3,7 kB	Testo	19 nov 2024
myostatin.fas	220,0 kB	Testo	leri
myostatin.fasta	714,6 kB	Testo	19 nov 2024
myostatin.nexus	1,2 MB	Testo	1 ott 2024
myostatin.RData	8,8 MB	R Data File	28 set 2024
MYOSTATIN_ACCESSION_NUMBERS.txt	1,7 kB	Testo	29 set 2024
MYOSTATIN_DATA.txt	17,3 kB	Testo	29 set 2024
myostatin_mod.aln	0 byte	Testo	leri
myostatin_mod.dnd	3,8 kB	Testo	leri
myostatin_mod.fas	222,3 kB	Testo	leri
myostatin_mod.fasta	727,8 kB	Testo	leri
myostatin_species_names.fas	222,9 kB	Testo	21:40
myostatin_x.fas	10,4 kB	Testo	17:03
myostatin_x_mod.dnd	265 byte	Testo	17:39
myostatin_x_mod.fas	11,5 kB	Testo	17:38

All Files

[illegible]

baboon
bovine_wild
bovine_belgian
bovine_piedmontese
Bos_taurus
Bison_bison
Bos_mutus
Bos_taurus_1
Bos_taurus_2
Bos_javanicus
Bos_taurus
Bos_taurus_4
Bos_indicus_x_Bos_taurus
Bos_indicus
Bos_taurus_5
Bubalus_bubalis
Bubalus_carabanensis
Bubalus_bubalis_1
Taurotragus_derbianus
Moschus_berezovskii
Dama_dama
Cervus_elaphus
Cervus_canadensis
Aepyceros_melampus
Odocoileus_virginianus
Budorcas_taxicolor
Cervus_elaphus_xianthopygus
Ovis_aries
Oryx_dammah
Capra_hircus_breed_qianbei_ma_goat
Ovis_aries_1
Capra_ibex
Ovis_aries_3
Ovis_aries_4
Capra_hircus_breed_guizhou_white
Capra_hircus_1
Capra_hircus_breed_black_bengal
Capra_hircus_breed_sirohi
Capra_hircus_2
Ovis_aries_5
Antilocapra_americanana
Hemitragus_jemlahicus
Capra_hircus_3
Ovis_aries_6
Capra_hircus_breed_laoshan
Physeter_catodon
Delphinapterus_leucas
Eubalaena_glacialis
Balaenoptera_acutorostrata
Balaenoptera_musculus
Sylvicapra_grimmia
Monodon_monoceros
Lagenorhynchus_obliquidens
Neophocaena_asiaorientalis
Turlops truncatus
Globicephala_melas
Lagenorhynchus_albirostris
Delphinus_dolphin
Mesoplodon_densirostris
Orcinus_orca
Phocoena_ginus
Kogia_breviceps
Balaenoptera_ricei
Hippopotamus_amphibius_kiboko
Phacochoerus_africanus
Sus_scrofa
Sus_scrofa_1
Sus_scrofa_breed_banna_minipig
Sus_scrofa_breed_tibetan
Sus_scrofa_2
Vicugna_pacos

[illegible]

A horizontal bar chart showing the distribution of 240 data points across 24 categories. The x-axis is labeled from 1 to 240 in increments of 10. The y-axis lists 24 categories. The bars are light blue and their heights vary across the categories.

La razza Belga e la miostatina

```
> setwd('~ /DNA_SEQUENCES / ' )
> load('myostatin.RData')
# [sostituire <myostatin.RData> con il nome del file che avete creato (es.: <piero.Rdata>)]

> library(ape)
> library(seqinr)

> myostatin.fas = read.dna("myostatin_species_names.fas", format="fasta")
> myostatin.fasta = read.dna("myostatin_species_names.fasta", format="fasta")

> myostatin.fas

> myostatin.fasta
```

La razza Belga e la miostatina

```
> myostatin.fasta
```

```
111 DNA sequences in binary format stored in a matrix.
```

```
all sequences of same length: 6434
```

```
Labels:
```

```
chicken
```

```
turkey
```

```
baboon
```

```
human
```

```
Manis_pentadactyla
```

```
Capra_hircus_breed_qianbei_ma_goat
```

```
...
```

```
Base composition:
```

```
      a      c      g      t  
a.337 a.181 a.189 a.293  
(Total: 714.17 kb)
```

La razza Belga e la miostatina

```
> str(myostatin.fasta)
'DNabin' raw [1:111, 1:6434] - - - - ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : chr [1:111] "chicken" "turkey" "baboon" "human" ...
..$ : NULL
```

```
> myostatin.dist=dist.dna(myostatin.fasta,model="raw")
> myostatin.dist
```

	chicken	turkey	baboon
turkey	a.a26484a18		
baboon	a.15a684932	a.143378995	
human	a.149771689	a.142465753	a.aa8219178
Manis_pentadactyla	a.1652968a4	a.153424658	a.a54794521
Capra_hircus_breed_qianbei_ma_goat	a.175342466	a.168a3653a	a.a76712329
Capra_hircus_breed_laoshan	a.1762557a8	a.169863a14	a.a78538813
Capra_hircus_breed_guizhou_white	a.1762557a8	a.168949772	a.a77625571
Capra_hircus_1	a.174429224	a.167123288	a.a75799a87
Capra_hircus_3	a.173515982	a.168a3653a	a.a76712329
Budorcas_taxicolor	a.1762557a8	a.167123288	a.a739726a3


La razza Belga e la miostatina

```
> myostatin.tree = hclust(myostatin.dist,"average")
```

```
> plot(as.dendrogram(myostatin.tree))  
# (orientamento verticale)
```

oppure

```
> plot(as.phylo(myostatin.tree))  
# (orientamento orizzontale)
```



La razza Belga e la miostatina

- Scegliere 20 specie di Mammiferi, max 2 della stessa famiglia
- Uno dei taxa dev'essere *Bos taurus*, un altro **Zebra fish**
- Costruire l'albero UPGMA basato sull'**analisi del DNA mitocondriale** (mtDNA)
- Come si distribuiscono i vari taxa sui rami dell'albero? Perché?
(rispondere sul quaderno)

Search NCBI

Felis silvestris mitochondrial genome



Search

Results found in 7 databases

Literature

Bookshelf	0
MeSH	0
NLM Catalog	0
PubMed	5
PubMed Central	277

Genes

Gene	1
GEO DataSets	0
GEO Profiles	0

Proteins

Conserved Domains	0
Identical Protein Groups	0
Protein	200
Protein Family Models	0
Structure	0

Genomes

Assembly / Genome	NCBI Datasets
BioCollections	0
BioProject	1
BioSample	0
Nucleotide	37
SRA	0

Clinical

ClinicalTrials.gov	0
ClinVar	2,786
dbGaP	0
dbSNP	0
dbVar	0
GTR	0

PubChem

BioAssays	0
Compounds	0
Pathways	0
Substances	0



www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=Felis silvestris mitochondrial genome

An official website of the United States government [Here's how you know](#)

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Log in

Nucleotide

Create alert Advanced Help

Species
Animals (1)
Fungi (35)
Bacteria (1)
Customize ...

Molecule types
genomic DNA/RNA (37)
Customize ...

Source databases
INSDC (GenBank) (36)
RefSeq (1)
Customize ...

Sequence Type
Nucleotide (37)

Genetic compartments
Mitochondrion (1)

Sequence length
Custom range...

Release date
Custom range...

Revision date
Custom range...

Clear all
[Show additional filters](#)

Summary 20 per page Sort by Default order

Send to: Filters: [Manage Filters](#)

See [ATPQ \(MITOCHONDRIAL\) ATP synthase D chain](#) in the Gene database
mitochondrial reference sequences [Transcript \(2\)](#) [Protein \(2\)](#)

Items: 1 to 20 of 37

<< First < Prev Page 1 of 2 Next > Last >>

☐ [Felis silvestris mitochondrion, complete genome](#) 

1. 16,437 bp circular DNA
Accession: OR095103.1 GI: 2531342991
[Protein](#) [Taxonomy](#)
[GenBank](#) [FASTA](#) [Graphics](#)

☐ [Fonsecaea multimorphosa strain CBS 980.96 Scaff3, whole genome shotgun sequence](#)

2. 444,857 bp linear DNA
Accession: LVCI01000003.1 GI: 1029155904
[Assembly](#) [BioProject](#) [BioSample](#) [Protein](#) [Taxonomy](#)
[GenBank](#) [FASTA](#) [Graphics](#)

☐ [Fonsecaea multimorphosa strain CBS 980.96 Scaff7, whole genome shotgun sequence](#)

3. 926,531 bp linear DNA
Accession: LVCI01000007.1 GI: 1029155199
[Assembly](#) [BioProject](#) [BioSample](#) [Protein](#) [Taxonomy](#)
[GenBank](#) [FASTA](#) [Graphics](#)

☐ [Fonsecaea multimorphosa strain CBS 980.96 Scaff12, whole genome shotgun sequence](#)

4. 688,162 bp linear DNA
Accession: LVCI01000012.1 GI: 1029154316
[Assembly](#) [BioProject](#) [BioSample](#) [Protein](#) [Taxonomy](#)
[GenBank](#) [FASTA](#) [Graphics](#)

Results by taxon

Top Organisms [Tree](#)

Fonsecaea multimorphosa (30)
Aspergillus niger (2)
Aspergillus luchuensis (2)
Penicillium rubens Wisconsin 54-1255 (1)
Felis silvestris (1)
All other taxa (1)
[More...](#)

Find related data

Database:

Search details

("Felis silvestris"[Organism] OR Felis silvestris[All Fields]) AND mitochondrial[All Fields] AND genome[All Fields]

[See more...](#)

Recent activity

[Turn Off](#) [Clear](#)

Felis silvestris mitochondrial genome (37)
Nucleotide

Limited historical admixture between

All Databases ▾

Canis lupus mitochondrial genome



Search

NCBI Home

Resource List (A-Z)

All Resources

Chemicals & Bioassays

Data & Software

DNA & RNA

Domains & Structures

Genes & Expression

Genetics & Medicine

Genomes & Maps

Homology

Literature

Proteins

Sequence Analysis

Taxonomy

Training & Tutorials

Variation

Welcome to NCBI

The National Center for Biotechnology Information advances science and health by providing access to biomedical and genomic information.

[About the NCBI](#) | [Mission](#) | [Organization](#) | [NCBI News & Blog](#)

Submit

Deposit data or manuscripts into NCBI databases



Download

Transfer NCBI data to your computer



Learn

Find help documents, attend a class or watch a tutorial



Develop

Use NCBI APIs and code libraries to build applications



Analyze

Identify an NCBI tool for your data analysis task



Research

Explore NCBI research and collaborative projects



Popular Resources

PubMed

Bookshelf

PubMed Central

BLAST

Nucleotide

Genome

SNP

Gene

Protein

PubChem

NCBI News & Blog

GenBank Now Supports EGAPx-Based Annotation

14 Jan 2026

With the latest release of EGAPx, we're excited to announce

An Updated Bacterial and Archaeal Reference Genome Collection is Available!

13 Jan 2026

Download the updated bacterial and

Search NCBI

Canis lupus mitochondrial genome × Search

Results found in 12 databases

ORGANELLE

Was this helpful? 👍 👎

Wolf mitochondrial reference genome

Canis lupus (wolf)

RefSeq: NC_008092.1 Length: 16,729 bp circular



Genome Data Viewer
Browse the reference genome



Organelle Table
Browse organelle records



Genes
Browse all 13 genes

Literature

Bookshelf 14

Genes

Gene 2 755

Proteins

Conserved Domains 0

Nucleotide Nucleotide Search
[Advanced](#)

GenBank

Send to:


Change region shown

Customize view

Canis lupus mitochondrion, complete genome

NCBI Reference Sequence: NC_008092.1

[FASTA](#)



Go to:

Analyze this sequence

[Run BLAST](#)

[Pick Primers](#)

[Highlight Sequence Features](#)

[Find in this Sequence](#)

Related information

[BioProject](#)

[Protein](#)

[PubMed](#)

[Taxonomy](#)

[Full text in PMC](#)

[Gene](#)

[PubMed \(Weighted\)](#)

LOCUS NC_008092 16729 bp DNA circular MAM 03-APR-2023
DEFINITION Canis lupus mitochondrion, complete genome.
ACCESSION NC_008092
VERSION NC_008092.1
DBLINK BioProject: [PRJNA927338](#)
KEYWORDS RefSeq.
SOURCE mitochondrion Canis lupus (wolf)
ORGANISM [Canis lupus](#)
Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi;
Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae;
Canis.
REFERENCE 1 (bases 1 to 16729)
AUTHORS Bjornerfeldt,S., Webster,M.T. and Vila,C.
TITLE Relaxation of selective constraint on dog mitochondrial DNA
following domestication
JOURNAL Genome Res. 16 (8), 990-994 (2006)
PUBMED [16809672](#)
REFERENCE 2 (bases 1 to 16729)
CONSRMT NCBI Genome Project

Un po' scomodo...
(si dovrebbe selezionare tutta la sequenza ma è molto lunga)

www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_008092.1?report=fasta

Accedi

An official website of the United States government

Here's how you know

NIH

National Library of Medicine

National Center for Biotechnology Information

Log in

Nucleotide

Nucleotide

Search

Advanced

Help

FASTA

Send to

Change region shown

Customize view

Analyze this sequence

Run BLAST

Pick Primers

Related information

BioProject

Protein

PubMed

Taxonomy

Full text in PMC

Gene

PubMed (Weighted)

LinkOut to external resources

Canis lupus mitochondrion, complete genome

NCBI Reference Sequence: NC_008092.1

GenBank

Graphics

>NC_008092.1 Canis lupus mitochondrion, complete genome
GTTAATGTAGCTTAACATAAAGCAAGGCACTGAAAAATGCCAAGATGAGTCGCACGACTCCATAAACAT
AAAGGTTTGGTCCTAGCCTTCCTATTAGTTTTTAGTAGACTTACACATGCAAGCCTCCACGCCCCAGTGA
GAATGCCCTTAAATCACCAGTGATCTAAAGGAGCAGGTATCAAGCACACTCTTAAGTAGCTCATAACAC
CTTGCTAAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGATAGAAATTAAGCCATAAACGAAAGTTTGACTAAG
CCATACTAAATAGGGTTGGTAAATTCGTGCCAGCCACGCGGTACATCGATTAAACCAAATAATAGGC
CTACGGCGTAAAGCGTGTTCAAGATACTTTAACTAAAGTTAAACTTAACTAAGCCGTAAAAAGCTAC
AGTTATCATAAAATAAACACGAAAGTGACTTTATAAATCTGACTACACGATAGCTAAGACCCAACT
GGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGCCCTAAACATAGATAATTTTACAACAAAATAATTCGCCAGAGGA
CTACTAGCAATAGCTTAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTATATCCCTCTAGAGGAGCCTGTTCTAT
AATCGATAAACCCCGATAAACCTCACCACCTTCGCTAATTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAAC
CCTCAAAAGGTAGAACAGTAAGCACAATCATTTTACATAAAAAAGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGAGG
TGGAAGAAATGGGCTACATTTTACCCAAGAACATTTACGAATGTTTTATGAAATTAATACTGAA
GGAGGATTTAGTAGTAAATTAAGAATAGAGAGCTTAATTGAATAGGGCCATGAAGCACGCACACACCGCC
CGTACCCTCCTCAAGTAATAAGACACAACCATAACCATATTAACCTTAACTAAAACACAAGAGGAGACAA
GTCGTAACAAGGTAAGCATACCGGAAGGTGTGCTTGGATTAATCAAAGTGTAGCTTAACTAAAGCGTCTG
GCCTACACCCAGAAGATTTTATTACTTATGGCCACTTTGAACAAAAGCTAGCCCACTAACCCCAAATTT
AAGTATTACAGACACATAAAATAAACATTTAGTTAAACAATAAAAGTATAGGAGATAGAAATTTTAATT
GGAGCGATAGAGATAGTACCGTAAGGGAATGATGAAAGACATCTTAACAGTATTAACAGCAAAGATTAC
CCCTTCTACCTTTTGCATAATGAAGTACGAGAAACAACTTAACAAAGAGAACTTAAGCTAAGCTCCCCG
AAACCAGACGAGCTACCCATAAACAATCTAAAAGGATCAACTCATCTATGTAGCAAAATAGTGAGAAGAT
TTGTGGGTAGAGGTGAAAAGCCTAACGAGCCTGGTGATAGCTGGTTACCCACAAACAGAATTTTAGTTCA

Meglio

www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_008092.1?report=fasta

120%

Accedi

An official website of the United States government

Here's how you know

NIH

National Library of Medicine

National Center for Biotechnology Information

Log in

Nucleotide

Nucleotide

Search

Advanced

Help

FASTA

Send to:

Complete Record

Coding Sequences

Gene Features

Choose Destination

File

Collections

Clipboard

Analysis Tool

Change region shown

W

sequence

Pick Primers

Related information

BioProject

Protein

PubMed

Taxonomy

Full text in PMC

Gene

PubMed (Weighted)

LinkOut to external resources

Canis lupus mitochondrion, complete genome

NCBI Reference Sequence: NC_008092.1

[GenBank](#) [Graphics](#)

>NC_008092.1 Canis lupus mitochondrion, complete genome
GTTAATGTAGCTTAACATAAAGCAAGGCACTGAAAAATGCCAAGATGAGTCGCACGACTCCATAAACAT
AAAGGTTTGGTCCTAGCCTTCCTATTAGTTTTTAGTAGACTTACACATGCAAGCCTCCACGCCCCAGTGA
GAATGCCCTTAAATCACCAGTGATCTAAAGGAGCAGGTATCAAGCACACTCTTAAGTAGCTCATAACAC
CTTGCTAAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGATAGAAATTAAGCCATAAACGAAAGTTTGACTAAG
CCATACTAAATAGGGTTGGTAAATTCGTGCCAGCCACCGGGTCATACGATTAACCCAACTAATAGGC
CTACGGCGTAAAGCGTGTTCAAGATACTTTAACATAAAGTTAAACTTAACTAAGCCGTAAAAAGCTAC
AGTTATCATAAAATAAACACGAAAGTGACTTTATAAATCTGACTACACGATAGCTAAGACCCAACT
GGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGCCCTAAACATAGATAATTTTACAACAAAATAATTCGCCAGAGGA
CTACTAGCAATAGCTTAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTATATCCCTCTAGAGGAGCCTGTTCTAT
AATCGATAAACCCCGATAAACCTCACCACCTTCGCTAATTCAGTCTATATACCGCCATCTTCAGCAAAC
CCTCAAAAGGTAGAACAGTAAGCACAATCATTTTACATAAAAAAGTTAGGTCAAGGTGTAACCTTATGAGG
TGGAAGAAATGGGCTACATTTTCTACCCAAGAACATTTACGAATGTTTTATGAAATTAATAACTGAA
GGAGGATTTAGTAGTAAATTAAGAATAGAGAGCTTAATTGAATAGGGCCATGAAGCACGCACACACCGCC
CGTACCCTCCTCAAGTAATAAGACACAACCATAACCATATTAAGTTAACTAAAACACAAGAGGAGACAA
GTCGTAACAAGGTAAGCATACCGGAAGGTGTGCTTGGATTAATCAAAGTGTAGCTTAACTAAAGCGTCTG
GCCTACACCCAGAAGATTTTATTACTTATGGCCACTTTGAACAAAAGCTAGCCCACTAACCCCAAATTT
AAGTATTACAGACACATAAAATAAACATTTAGTTAAACAATAAAAGTATAGGAGATAGAAATTTTAATT
GGAGCGATAGAGATAGTACCGTAAGGGAATGATGAAAGACATCTTAACAGTATTAACAGCAAAGATTAC
CCCTTCTACCTTTTGCATAATGAACTAGCCAGAAACAACTTAACAAAGAGAACTTAAGCTAAGCTCCCCG
AAACCAGACGAGCTACCCATAAACAATCTAAAAGGATCAACTCATCTATGTAGCAAAATAGTGAGAAGAT
TTGTGGGTAGAGGTGAAAAGCCTAACGAGCCTGGTGATAGCTGGTTACCCACAAACAGAATTTTAGTTCA

Nucleotide Nucleotide Search

Advanced Help

FASTA

Canis lupus mitochondrion, complete genome

NCBI Reference Sequence: NC_008092.1

[GenBank](#) [Graphics](#)

>NC_008092.1 Canis lupus mitochondrion, complete genome
GTTAATGTAGCTTAAC TAATAAAGCAAGGCACTGAAAAAGCAAGATGAGTCGCACGACTCCATAAACAT
AAAGGTTTGGTCCTAGCCTTCTATTAGTTTTAGTAGACTTACACATGCAAGCCTCCACGCCCCAGTGA
GAATGCCCTTAAATCACCAGTGATCTAAAGGAGCAGGTATCAAGCACACTCTTAAGTAGCTCATAACAC
CTTGCTAAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGATAGAAATTAAGCCATAAACGAAAGTTTGACTAAG
CCATACTAAATAGGGTTGGTAAATTCGTGCCAGCCACCGCGGTACATCGATTAAACCAAATAATAGGC
CTACGGCGTAAAGCGTGTTCAAGATACTTTAACTAAAGTTAACTTAAGCCGTAAGGCTAC
AGTTATCATAAATAAACACGAAAGTGACTTTATAATAATCTGACTACACGATAGCTAAGACCCAACT
GGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGCCCTAAACATAGATAATTTACAACAAATAATTCGCCAGAGGA
CTACTAGCAATAGCTTAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTATATCCCTCTAGAGGAGCCTGTTCTAT
AATCGATAAACCCCGATAAACCTCACCACCTTCGCTAATTCAGTCTATATACCGCATCTTCAGCAAAC
CCTCAAAAGGTAGAACAGTAAGCACAATCATTTTACATAAAAAAGTTAGGTCAAGGTGTAACCTTATGAGG
TGGAAGAAATGGGCTACATTTTCTACCCAAGAACATTTACGAATGTTTTATGAAATTAAGGCTGAA
GGAGGATTTAGTAGTAAATTAAGAATAGAGAGCTTAATTGAATAGGGCCATGAAGCACGCACACACCGCC
CGTACCCTCCTCAAGTAATAAGACACAACCATAACCATATTAAGTTAACTAAACACAAGAGGAGACAA
GTCGTAACAAGGTAAGCATACCGGAAGGTGTGCTTGGATTAATCAAAGTGTAGCTTAAGGCTGCTG
GCCTACACCCAGAAGATTTTATTACTTATGGCCACTTTGAACAAAAGCTAGCCCACTAACCCAACTT
AAGTATTACAGACACATAAAATAAACATTTAGTTAAACAATAAAAGTATAGGAGATAGAAATTTAATT
GGAGCGATAGAGATAGTACCGTAAGGGAATGATGAAAGACATCTTAACAGTATTAACAGCAAAGATTAC
CCCTTCTACCTTTTGCATAATGAACTAGCCAGAAACAACTTAACAAAGAGAACTTAAGCTAAGCTCCCCG
AAACCAGACGAGCTACCCATAAACAACTTAAAGGATCACTCATCTATGTAGCAAAATAGTGAGAAGAT
TTGTGGGTAGAGGTGAAAAGCCTAACGAGCTGGTGATAGCTGGTTACCCACAAACAGAATTTTAGTTCA

Send to: Change selection shown

☒ Complete Record
☐ Coding Sequences
☐ Gene Features

Choose Destination

☒ File ☐ Clipboard
☐ Collections ☐ Analysis Tool

Download 1 item.

Format
FASTA

Show GI ☐

Create File

- Taxonomy
- Full text in PMC
- Gene
- PubMed (Weighted)

LinkOut to external resources

Fatto!

→ ↺

www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_008092.1?report=fasta

🔍 120% ☆

📄 Accedi

🔖 ☰

An official website of the United States government [Here's how you know](#) ▼

National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

sequence.fasta

Completato — 16,6 kB

Visualizza tutti i download

Log in

Nucleotide

Nucleotide ▼

Search

Advanced

Help

FASTA ▼

Send to: ▼

Change region shown ▼

Customize view ▼

Analyze this sequence

Run BLAST

Pick Primers

Related information

BioProject

Protein

PubMed

Taxonomy

Full text in PMC

Gene

PubMed (Weighted)

LinkOut to external resources

Canis lupus mitochondrion, complete genome

NCBI Reference Sequence: NC_008092.1

[GenBank](#) [Graphics](#)

>NC_008092.1 Canis lupus mitochondrion, complete genome

GTTAATGTAGCTTAAC TAATAAAGCAAGGCACTGAAAA TGCCAAGATGAGTCGCACGACTCCATAAACAT
AAAGGTTTGGTCCTAGCCTTCCTATTAGTTTTTAGTAGACTTACACATGCAAGCCTCCACGCCCCAGTGA
GAATGCCCTTAAATCACCAGTGATCTAAAGGAGCAGGTATCAAGCACACTCTTAAGTAGCTCATAACAC
CTTGCTAAGCCACACCCCCACGGGATACAGCAGTGATAGAAATTAAGCCATAAACGAAAGTTTGACTAAG
CCATACTAAATAGGGTTGGTAAATTCGTGCCAGCCACCGGGTCATACGATTAACCCAACTAATAGGC
CTACGGCGTAAAGCGTGTTCAAGATACTTTAACACTAAAGTTAAACTTAACTAAGCCGTAAAAAGCTAC
AGTTATCATAAAATAAACACGAAAGTGACTTTATAATAATCTGACTACACGATAGCTAAGACCCAACT
GGGATTAGATACCCCACTATGCTTAGCCCTAAACATAGATAATTTTACAACAAAATAATTCGCCAGAGGA
CTACTAGCAATAGCTTAAACTCAAAGGACTTGGCGGTGCTTTATATCCCTCTAGAGGAGCCTGTTCTAT
AATCGATAAACCCCGATAAACCTCACCACCTTTCGCTAATTCAGTCTATATACCGCATCTTCAGCAAAC
CCTCAAAAGGTAGAACAGTAAGCACAATCATTTTACATAAAAAAGTTAGGTCAAGGTGTAACCTATGAGG
TGGGAAGAAATGGGCTACATTTTCTACCCAAGAACATTTACGAATGTTTTTATGAAATTA AAAACTGAA
GGAGGATTTAGTAGTAAATTAAGAATAGAGAGCTTAATTGAATAGGGCCATGAAGCACGCACACACCGCC
CGTCACCCTCCTCAAGTAATAAGACACAACCATAACCATATTA ACTTAACTAAAACACAAGAGGAGACAA
GTCGTAACAAGGTAAGCATACCGGAAGGTGTGCTTGGATTAATCAAAGTGTAGCTTAACTAAAGCGTCTG
GCCTACACCCAGAAGATTTTATTACTTATGGCCACTTTGAACAAAAGCTAGCCCACTAACCCCAACTT
AAGTATTACAGACACATAAAATAAAACATTTAGTTAAACAATAAAAGTATAGGAGATAGAAATTTTAATT
GGAGCGATAGAGATAGTACCGTAAGGGAATGATGAAAGACATCTTAACAGTATTAACAGCAAAGATTAC
CCCTTCTACCTTTTGCATAATGAACTAGCCAGAAACAACTTAACAAAGAGAACTTAAGCTAAGCTCCCCG
AAACCAGACGAGCTACCCATAAACAATCTAAAAGGATCAACTCATCTATGTAGCAAAATAGTGAGAAGAT
TTGTGGGTAGAGGTGAAAAGCCTAACGAGCTGGTGATAGCTGGTTACCCACAAACAGAATTTTAGTTCA


```
> library(ape)
> setwd('~ /MATERIALE_DIDATTICO_A.S._2025-2026/ESERCITAZIONI/MIOSTATINA/')
# sostituire il PATH
# <~/MATERIALE_DIDATTICO_A.S._2025-2026/ESERCITAZIONI/MIOSTATINA/>
# con un percorso compatibile con il proprio albero di cartelle
# Es. <~/DNA_SEQUENCES/>

> myostatin.fasta = read.dna("myostatin_5_species_100_bp.fasta",
format="fasta")
> X = myostatin.fasta
> myostatin.dist = dist.dna(X, model="raw")
```

raw: This is simply the proportion or the number of sites that differ between each pair of sequences.

```
> library(ape)
> setwd('~\\MATERIALE_DIDATTICO_A.S._2024-2025\\ESERCITAZIONI\\MIOSTATINA\\')
> X = read.dna("myostatin_5_species_100_bp.fasta", format="fasta",
as.character = FALSE)
> str(X)
'DNABin' raw [1:5, 1:100] a a a a ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
 ..$ : chr [1:5] "baboon" "bovine" "chicken" "ovine" ...
 ..$ : NULL
> X
5 DNA sequences in binary format stored in a matrix.
```

All sequences of same length: 100

Labels:
baboon
bovine
chicken
ovine
zebra_fish

Base composition:

a	c	g	t
0.286	0.178	0.240	0.296

(Total: 500 bases)


```

> myostatin.dist = dist.dna(X, model="raw")
> myostatin.dist

```

	baboon	bovine	chicken	ovine
bovine	0.08			
chicken	0.29	0.32		
ovine	0.09	0.02	0.33	
zebra_fish	0.67	0.64	0.70	0.63






```
> myostatin.UPGMA = hclust(myostatin.dist, "average")
```

```
# simple UPGMA
```

```
> myostatin.UPGMA
```

```
Call:
```

```
hclust(d = myostatin.dist, method = "average")
```

```
Cluster method      : average
```

```
Distance             : raw
```

```
Number of objects: 5
```

La funzione hclust effettua una *cluster analysis* gerarchica utilizzando, in questo caso, l'algoritmo **UPGMA** (*Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean*).

L'idea alla base della *cluster analysis* gerarchica è di rappresentare graficamente quali elementi (singoli esemplari di una stessa o di specie diverse, sequenze di DNA ecc.) di un certo campione sono più simili tra di loro, raggruppandoli a due a due sullo stesso ramo dell'albero.

Gli oggetti che sono più diversi fra loro vengono collocati in rami differenti.

```
> myostatin.dist
      baboon bovine chicken ovine
bovine      0.08
chicken      0.29    0.32
ovine        0.09    0.02    0.33
zebra_fish   0.67    0.64    0.70    0.63
```

Matrice **D1** di distanze genetiche
(n° di nucleotidi differenti su 100)
fra coppie di specie

Il bovino e la pecora sono le specie
tra le quali la D1 è <, quindi le
mettiamo insieme

Quindi calcoliamo la distanza media
tra bov-ovi e ciascuna delle altre
specie

$$D2((\text{bov}, \text{ovi}), \text{bab}) = [D1(\text{bov}, \text{bab}) + D1(\text{ovi}, \text{bab})] / 2 = (8 + 9) / 2 = 8,5$$
$$D2((\text{bov}, \text{ovi}), \text{gal}) = [D1(\text{bov}, \text{gal}) + D1(\text{ovi}, \text{gal})] / 2 = (32 + 33) / 2 = 32,5$$
$$D2((\text{bov}, \text{ovi}), \text{zeb}) = [D1(\text{bov}, \text{zeb}) + D1(\text{ovi}, \text{zeb})] / 2 = (64 + 63) / 2 = 63,5$$

	bab	bov	gal	ovi	zeb
bab	0	8	29	9	67
bov	8	0	32	2	64
gal	29	32	0	33	70
ovi	9	2	33	0	63
zeb	67	64	70	63	0

	bab	bov- ovi	gal	zeb
bab	0	8,5	29	67
bov- ovi	8,5	0	32,5	63,5
gal	29	32,5	0	70
zeb	67	63,5	70	0

	(bov-ovi)bab	gal	zeb
(bov-ovi)bab	0	30,75	65,25
gal	30,75	0	70
zeb	65,25	70	0

$D3(((\text{bov}, \text{ovi}), \text{bab}), \text{gal}) = [D2((\text{bov}, \text{ovi}), \text{gal}) + (D2(\text{bab}, \text{gal}))] / 2 = (32,5 + 29) / 2 = 30,75$
 $D3(((\text{bov}, \text{ovi}), \text{bab}), \text{zeb}) = [D2((\text{bov}, \text{ovi}), \text{zeb}) + (D2(\text{bab}, \text{zeb}))] / 2 = (63,5 + 67) / 2 = 65,25$

	(bov-ovi)bab	gal	zeb
(bov-ovi)bab	0	30,75	65,25
gal	30,75	0	70
zeb	65,25	70	0

$$D4((((bov,ovi),bab),gal),zeb) = [D3((((bov,ovi),bab),zeb)+D3(gal,zeb)]/2 = (65,25+70)/2 = 67,625$$

	((bov-ovi)bab)ga	zeb
((bov-ovi)bab)gal	0	67,625
zeb	67,625	0

```
> plot(myostatin.UPGMA, main = 'UPGMA distances')
```




Scelta del modello di sostituzione nucleotidica

L'analisi filogenetica più semplice si basa sul calcolo delle distanze fra coppie di sequenze nucleotidiche, le quali diventano gli ingressi di una matrice che, tramite algoritmi di clusterizzazione, viene convertita in un albero filogenetico.

La distanza fra due sequenze è definita come numero atteso di sostituzioni nucleotidiche per sito (generalmente < 1) e può essere espressa come semplice proporzione dei siti variabili o distanza **p**.

```
> myostatin.dist
      baboon bovine chicken ovine
bovine      0.08
chicken      0.29    0.32
ovine        0.09    0.02    0.33
zebra_fish   0.67    0.64    0.70    0.63
```



[Home](#)

[Organization](#)

[Citations & Statistics](#)

[Partners](#)

[Online programs](#)

PhyML

[Benchmarks](#)

[Datasets](#)

[Forum & FAQ](#)

[Online execution](#)

[Source code on GitHub](#)

[Papers & contacts](#)

[PhyML versions](#)

[User guide](#)

[Binaries](#)

[Databases](#)

[Datasets](#)

[NGS](#)



Contact: [Webmaster](#), LIRMM.



PhyML 3.0: new algorithms, methods and utilities

Please cite:


"New Algorithms and Methods to Estimate Maximum-Likelihood Phylogenies: Assessing the Performance of PhyML 3.0."

Guindon S., Dufayard J.F., Lefort V., Anisimova M., Hordijk W., Gascuel O.

Systematic Biology, 59(3):307-21, 2010.

Get the latest PhyML releases from [GitHub](#).

Download PhyML binaries

Click [here](#) to  binaries

The binaries you have compiled on various Mac, Windows or LINUX systems are much welcome ([Stéphane Guindon](#)) and will be displayed on this web page.

Il formato PHYLIP interleaved

```
5 100
baboon
atgcaaaaactgcaactctgtgtttatatttacctgtttatgctgattgttgctgggtccagtggtatctaaatgagaacagtgagcaaaaagaaaatgtgg
bovine
atgcaaaaactgcaaactctgtgtttatatttacctatttatgctgattgttgctggcccagtggtatctgaatgagaacagcgagcagaaggaaaatgtgg
chicken
atgcaaaagctagcagtcctatgttttatatttacctgttcatgcagatcgcggttgatccggtggctctggatggcagtagtcagccacagagaaacgctg
ovine
atgcaaaaactgcaaactcttggttttatatttacctatttatgctgcttggttgctggcccagtggtatctgaatgagaacagcgagcagaaggaaaatgtgg
zebrafish
atgcattttacacagggttttaatttctctaagtgtattaattgcatgtggtccagtggggttatggagatatataacggcgcaccagcagccttccacagcca
```

```
> substitution_model_test = phymltest('myostatin_5_species_100_bp.phy', format
= "interleaved", itree = NULL, exclude = NULL, execname = '/home/piero/PhyML-
3.1/PhyML-3.1_linux64', append = TRUE)
```

```
. Sequence filename:          myostatin_5_species_100_bp.phy
. Data set:                #1
. Tree topology search :    NNIs
. Initial tree:            BioNJ
. Model of nucleotides substitution:    GTR
. Number of taxa:          5
. Log-likelihood:          -402.43191
. Unconstrained likelihood:    -343.80642
. Parsimony:                100
. Tree size:                4.55423
. Nucleotides frequencies:
  - f(A)= 0.28600
  - f(C)= 0.17800
  - f(G)= 0.24000
  - f(T)= 0.29600
. GTR relative rate parameters :
A <-> C    11.85779
A <-> G    14.05957
A <-> T     0.00993
C <-> G     8.42143
C <-> T    13.46606
G <-> T     1.00000
```

```
. Instantaneous rate matrix :
[A-----C-----G-----T-----]
-1.01259    0.38945    0.62260    0.00054
 0.62574   -1.73412    0.37293    0.73546
 0.74193    0.27659   -1.07313    0.05462
 0.00052    0.44227    0.04428   -0.48708
```


L'output del test

```
> substitution_model_test
      nb.free.para      loglik      AIC
JC69      1 -414.3124  830.6248
JC69+I     2 -414.1910  832.3821
JC69+G     2 -413.8407  831.6814
JC69+I+G   3 -413.8313  833.6625
K80        2 -411.0496  826.0993
K80+I      3 -408.3180  822.6359
K80+G      3 -408.8849  823.7699
K80+I+G    4 -407.9957  823.9915
F81        4 -414.1411  836.2823
F81+I      5 -414.0996  838.1992
F81+G      5 -413.7568  837.5136
F81+I+G    6 -413.7486  839.4972
F84        5 -409.8965  829.7931
F84+I      6 -407.9673  827.9346
F84+G      6 -408.0924  828.1848
F84+I+G    7 -407.5650  829.1301
HKY85      5 -409.8806  829.7612
HKY85+I    6 -407.9661  827.9323
HKY85+G    6 -408.0732  828.1464
HKY85+I+G  7 -407.5730  829.1460
TN93       6 -409.8804  831.7607
TN93+I     7 -407.9637  829.9274
TN93+G     7 -408.0700  830.1400
TN93+I+G   8 -407.5648  831.1297
GTR        9 -402.4319  822.8638
GTR+I     10 -401.2392  822.4784
GTR+G     10 -400.2603  820.5205
GTR+I+G    11 -400.2379  822.4758
>
```

ll file <myostatin_5_species_100_bp.phy_phyml_tree.txt>

```
(bovine:0.00000202,(ovine:0.00002963,zebrafish:9.99805710)0.000000:0.02049504,
(baboon:0.00008628,chicken:0.50886609)0.842000:0.09067509);
(baboon:0.01048862,(bovine:0.00000001,(zebrafish:1.37441488,ovine:0.00000508):0.02026739):0.07447686,chicken:0.35829670);
(baboon:0.00972686,chicken:0.36497752,(bovine:0.00000118,(ovine:0.00000029,zebrafish:1.54101437):0.02030498):0.07560156);
(baboon:0.00007584,chicken:0.44219573,(ovine:0.02056245,(bovine:0.00000001,zebrafish:3.54999086):0.00000001):0.08826723);
(baboon:0.00000910,chicken:0.45531080,(bovine:0.00000001,(zebrafish:4.16221975,ovine:0.00001874):0.02059383):0.08887950);
(bovine:0.00000099,(ovine:0.02028732,zebrafish:3.09237767):0.00003742,(baboon:0.01122146,chicken:0.36941408):0.07398107);
(zebrafish:8.82019763,(bovine:0.00000175,ovine:0.02039573):0.02277632,(chicken:0.39408351,baboon:0.01090682):0.05227845);
(bovine:0.00000099,(ovine:0.02044652,zebrafish:10.00000000):0.00002146,(baboon:0.00002629,chicken:0.50356626):0.08929782);
(chicken:0.43223177,baboon:0.00713230,(bovine:0.00000126,(zebrafish:8.89223736,ovine:0.01973263):0.00074093):0.08047846);
(baboon:0.01115834,chicken:0.36143405,(bovine:0.00000181,(zebrafish:1.42016394,ovine:0.00000268):0.02033915):0.07448850);
(bovine:0.00000091,(chicken:0.36579093,baboon:0.01074355):0.07520598,(zebrafish:1.52463974,ovine:0.00000001):0.02037077);
(bovine:0.00000117,(zebrafish:3.58786252,(chicken:0.44228493,baboon:0.00171289):0.08712725):0.00000872,ovine:0.02063859);
(baboon:0.00000824,chicken:0.46731497,(bovine:0.00000001,(zebrafish:4.82711651,ovine:0.00000756):0.02070614):0.08999625);
(bovine:0.00000101,(ovine:0.02042293,zebrafish:3.77229889):0.00003150,(baboon:0.01338516,chicken:0.37881952):0.07317730);
(zebrafish:8.98214792,(bovine:0.00000182,ovine:0.02045418):0.02675688,(chicken:0.39647730,baboon:0.01296603):0.04725382);
(bovine:0.00000204,(ovine:0.00002615,zebrafish:9.99812034):0.02054687,(baboon:0.00002661,chicken:0.50940308):0.09100487);
(chicken:0.44286719,zebrafish:9.08352240,(baboon:0.00942811,(bovine:0.00000132,ovine:0.02057252):0.07969971):0.00014779);
(bovine:0.00000099,(ovine:0.02039898,zebrafish:3.70535167):0.00003159,(baboon:0.01300483,chicken:0.37844433):0.07338886);
(zebrafish:8.98429384,(bovine:0.00000180,ovine:0.02042441):0.02673440,(chicken:0.39638088,baboon:0.01260347):0.04745109);
(bovine:0.00000202,(ovine:0.00002963,zebrafish:9.99805710):0.02049504,(baboon:0.00008628,chicken:0.50886609):0.09067509);
(chicken:0.44246753,zebrafish:9.08528623,(baboon:0.00898618,(bovine:0.00000130,ovine:0.02053515):0.07990025):0.00016885);
(bovine:0.00000099,(ovine:0.02039408,zebrafish:3.68224905):0.00003166,(baboon:0.01293915,chicken:0.37829051):0.07342438);
(zebrafish:8.98269671,(bovine:0.00000180,ovine:0.02044070):0.03061041,(chicken:0.39640554,baboon:0.01278578):0.04346390);
(bovine:0.00000205,(ovine:0.00003700,zebrafish:9.99683005):0.02045292,(baboon:0.00008704,chicken:0.50879952):0.09053445);
(chicken:0.44280285,zebrafish:9.08381557,(baboon:0.00936629,(bovine:0.00000130,ovine:0.02056699):0.07972586):0.00014726);
(bovine:0.00000001,(zebrafish:4.05071318,(baboon:0.00593667,chicken:0.39542302):0.08161689):0.00000004,ovine:0.02053827);
(zebrafish:4.34749500,(bovine:0.00000057,(chicken:0.40630281,baboon:0.00316606):0.08445039):0.02051856,ovine:0.00000251);
(zebrafish:10.00000000,(bovine:0.00000056,(baboon:0.00001018,chicken:0.54408882):0.09498755):0.02116598,ovine:0.00001086);
(baboon:0.00000993,chicken:0.53213267,(bovine:0.00000001,(zebrafish:9.76620951,ovine:0.00000001):0.02114857):0.09443561);
```

Scelta del modello di sostituzione nucleotidica

```
> r = '(baboon:0.00000993,chicken:0.53213267,(bovine:0.00000001,  
(zebrafish:9.76620951,ovine:0.00000001):0.02114857):0.09443561);'  
> albero = read.tree(text = r)  
> albero
```

Phylogenetic tree with 5 tips and 3 internal nodes.

Tip labels:


baboon, chicken, bovine, zebrafish, ovine

Unrooted; includes branch lengths.

```
> plot(albero, main = 'GTR model')
```

L'albero più verosimile

GTR model




```
> alb = read.tree(text = "((bovino:1, ovino:1):1, babbuino:1);")
> alb
```

Phylogenetic tree with 3 tips and 2 internal nodes.

Tip labels:
bovino, ovino, babbuino

Rooted; includes branch lengths.

```
> plot(alb)
```




```
> alb = read.tree(text = "((bovino:1, ovino:1):1, babbuino:2);")
> alb
```

Phylogenetic tree with 3 tips and 2 internal nodes.

Tip labels:
 bovino, ovino, babbuino

Rooted; includes branch lengths.

```
> plot(alb)
```





```
> alb = read.tree(text = "((bovino:1, ovino:1):1, babbuino:2):2, gallo:3);")
> alb
```

Phylogenetic tree with 4 tips and 3 internal nodes.

Tip labels:
bovino, ovino, babbuino, gallo

Rooted; includes branch lengths.

```
> plot(alb)
```




```
> alb = read.tree(text = "((bovino:1, ovino:1):1, babbuino:2):2, gallo:4);")
> alb
```

Phylogenetic tree with 4 tips and 3 internal nodes.

Tip labels:
bovino, ovino, babbuino, gallo

Rooted; includes branch lengths.

```
> plot(alb)
```




```
> alb = read.tree(text = "(((bovino:1, ovino:1):1, babbuino:2):2, gallo:4):3, pesce_zebra:7);")
> alb
```

Phylogenetic tree with 5 tips and 4 internal nodes.

Tip labels:
 bovino, ovino, babbuino, gallo, pesce_zebra

Rooted; includes branch lengths.

```
> plot(alb)
```



STATISTICA

L'effetto additivo dei fattori genetici ed ambientali

gene normale A -> effetto fenotipico = 8 $p = 0,5$

allele mutante A' -> effetto fenotipico = 4 $q = 0,5$

omozigoti AA -> valore fenotipico = 16 $F = 0,25$

omozigoti A'A' -> valore fenotipico = 8 $F = 0,25$


eterozigoti AA' -> valore fenotipico = 12 $F = 0,25$

eterozigoti A'A -> valore fenotipico = 12 $F = 0,25$

L'effetto additivo dei fattori genetici ed ambientali


CLASSE GENOTIPICA	VALORE FENOTIPICO	FREQUENZA
AA	16	1/4 = 25%
AA' - A'A	12	2/4 = 50%
A'A'	8	1/4 = 25%

**DISTRIBUZIONE DEI VALORI FENOTIPICI
CON 1 COPPIA ALLELICA**



Due loci

DISTRIBUZIONE DEI VALORI FENOTIPICI CON 2 COPPIE ALLELICHE



Valori e frequenze dei possibili genotipi nel caso in cui un carattere quantitativo è controllato da due *loci* («a» e «B»)

Tre loci

aumentando ulteriormente il numero di coppie alleliche interessate, aumenta in numero delle classi di valori ma diminuiscono le differenze fra i valori delle varie classi


Se si considerano tre coppie di geni, $a-a'$, $B-B'$ e $C-C'$, dove gli alleli «normali» a , B e C hanno effetto 2 e gli alleli «mutanti» a' , B' e C' effetto 1, le classi genotipiche e i relativi valori fenotipici saranno:

Tre loci

Quali sono i
valori fenotipici
intermedi?

CLaSSE GENOTIPICA	VaLORE FENOTIPICO	FREQUENZA
aaBBCC	12	1/64 = 2%
aaBBCC' – aaBBC'C – aaBB'CC aaB'BCC – aa'BBCC – a'aBBCC		6/64 = 9%
aaBBC'C' – aaBB'CC' – aaB'BCC' aa'BBCC' – a'aBBCC' – aaBB'C'C aaB'BC'C – aa'BBC'C – a'aBBC'C aaB'B'CC – aa'BB'CC – a'aBB'CC aa'B'BCC – a'aB'BCC – a'a'BBCC		15/64 = 23%
aaBB'C'C' – aaB'BC'C' – aaB'B'CC' aaB'B'C'C – aa'BBC'C' – aa'BB'CC' aa'B'BCC' – aa'BB'C'C – aa'B'BC'C aa'B'B'CC – a'aBBC'C' – a'aBB'CC' a'aB'BCC' – a'aBB'C'C – a'aB'BC'C a'aB'B'CC – a'a'B'BCC – a'a'BB'CC, a'a'BBC'C – a'a'BBCC'		2a/64 = 31%
aaB'B'C'C' – aa'BB'C'C' – a'aBB'C'C' a'aBBC'C' – aa'B'BC'C' – a'aB'BC'C' a'a'B'BCC' – aa'B'B'CC' – a'aB'B'CC' a'a'B'BC'C – aa'B'B'C'C – a'aB'B'C'C a'a'B'B'CC – a'a'BB'CC' – a'a'BB'C'C		15/64 = 23%
aa'B'B'C'C' – a'aB'B'C'C' – a'a'B'B'C'C a'a'B'B'CC' – a'a'BB'C'C' – a'a'B'BC'C'		6/64 = 9%
a'a'B'B'C'C'	6	1/64 = 2%


DISTRIBUZIONE DEI VALORI FENOTIPICI CON 3 COPPIE ALLELICHE



Tre loci


Distribuzione di probabilità cumulativa

Carattere quantitativo controllato da 3 loci



Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

```
> curve(pnorm(x), -5, 5, col="red", lwd="5")
```




Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

Il N° di campioni compresi fra 33,5 e 34 è uguale a ≈ 950

Quindi l'h di ogni barra rappresenta...

Se ci sono 1aaaa campioni, la somma delle h di tutte le barre sarà uguale a...




Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

Il N° di campioni compresi fra 33,5 e 34 è uguale a $\approx 95a$

Quindi l'h di ogni barra rappresenta...

Se ci sono 1aaaaa campioni, la somma delle h di tutte le barre sarà uguale a...




Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

Il N° di campioni compresi fra 33,5 e 34 è uguale a $\approx 95a$

Quindi l'h di ogni barra rappresenta...

Se ci sono 1aaaa campioni, la somma delle h di tutte le barre sarà uguale a...



Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

per disegnare l'istogramma

```
> x = rnorm(1aaaa, mean = 35, sd = 1.2)
> hist(x, xlab = 'Quantità di latte (kg) = x', ylab = 'Frequenza')
> hist(x, prob = TRUE, xlab = 'Quantità di latte (kg) = x', ylab = 'Frequenza
= p(x)')
> x_values = seq(min(x), max(x), length = 1aa)
> fun = dnorm(x_values, mean = mean(x), sd = sd(x))
> lines(x_values, fun, col = 'orange', lwd = 5)
```

per disegnare la densità


attenzione: x ha un significato diverso

```
> y = rnorm(1aaaaaaaa, mean = 35, sd = 1.2)
> den = density(y)
> plot(den, col = 'red', lwd = 5.a, xlab = 'Quantità di latte (in kg) = x',
ylab = 'densità di probabilità = dy/dx')
> polygon(den, col = 'slateblue1')
> value1 = 33
> value2 = 34
> l = min(which(den$x >= value1))
> h = max(which(den$x < value2))
> polygon(c(den$x[c(l, 1:h, h)]), c(a, den$y[1:h], a), col = 'slateblue1')
```

Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici


dy = probabilità che la quantità di latte sia compresa fra due valori, x e $x+dx$, in cui $dx \rightarrow a$
(densità di probabilità)

L'area sotto la curva rappresenta la probabilità che x sia compreso tra il suo valore min ($\approx 3a$ kg) e il suo valore max ($\approx 4a$ kg), che equivale al 100% (evento certo).




Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

La probabilità che la quantità di latte sia compresa fra 33 e 34 Kg è data dall'area blu, che può essere calcolata utilizzando un'operazione che prende il nome di «**integrazione**».




Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

La probabilità che la quantità di latte sia compresa fra 33 e 34 Kg è data dall'area blu, che può essere calcolata utilizzando un'operazione che prende il nome di «**integrazione**».




Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

La probabilità che la quantità di latte sia compresa fra 33 e 34 Kg è data dall'area blu, che può essere calcolata utilizzando un'operazione che prende il nome di «**integrazione**».




Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

La probabilità che la quantità di latte sia compresa fra 33 e 34 Kg è data dall'area blu, che può essere calcolata utilizzando un'operazione che prende il nome di «**integrazione**».




Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

La probabilità che la quantità di latte sia compresa fra 33 e 34 Kg è data dall'area blu, che può essere calcolata utilizzando un'operazione che prende il nome di «**integrazione**».



Un numero (quasi) infinito di fattori ambientali e genetici

La probabilità che la quantità di latte sia compresa fra 33 e 34 Kg è data dall'area blu, che può essere calcolata utilizzando un'operazione che prende il nome di «**integrazione**».



oo
--- PhyML 20120412 ---
http://www.atgc-montpellier.fr/phyml
Copyright CNRS - Universite Montpellier II
oo

. Instantaneous rate matrix :
[A-----C-----G-----T-----]
-0.99555 0.39721 0.59777 0.00057
0.63822 -1.84503 0.45935 0.74746
0.71234 0.34068 -1.05494 0.00191
0.00055 0.44949 0.00155 -0.45159


```
> x = seq(0, 10, by = 0.1)
> y = dgamma(x, shape = 0.997)
> plot(y, type = 'l', lwd = 5, col = 'red', xlab = 'Tasso di
sostituzione nucleotidica', ylab = 'Densità di probabilità')
```

Densità di probabilità

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0

20


40

60


80

100

Tasso di sostituzione nucleotidica



Il modello JC69




STATISTICA: concetti fondamentali

- **Esperimento:** processo che genera un'osservazione (per es., il lancio di un dado o di una moneta)
- **Evento:** ognuno dei possibili risultati di un esperimento (contrassegnati da lettere maiuscole)
- **Evento elementare:** evento che non può essere decomposto e che corrisponde ad un «punto campione» indivisibile

STATISTICA: spazio campione Ω

- Insieme di tutti i possibili risultati di un esperimento
Es. lancio di un dado
- 6 risultati equiprobabili (se il dado non è truccato)



$$\Omega = 1$$

Evento certo


Evento elementare a

Cosa succede se lancio il dado una seconda volta?

- Vinco se esce di nuovo il numero 6: che probabilità ho di vincere?
- Lo spazio campione Ω diventa uguale ad $1/6$
- Poiché si tratta di EVENTI INDIPENDENTI, la $P(6, 6) = 1/6 * 1/6 = 1/36$
- Probabilità congiunta di eventi indipendenti = = prodotto delle probabilità dei singoli eventi

$$\Omega = 1/6$$

Evento certo



Evento elementare B

STATISTICA: probabilità di due eventi indipendenti

- **a** = evento elementare esce 6 al primo lancio
- **B** = evento elementare esce 6 al secondo lancio


Quindi, noi vogliamo calcolare la Prob dell'intersezione fra il cerchio medio e il cerchio piccolo:

$$P(a \cap B) = P(a) * P(B|a)$$

Ma, poiché i due eventi sono indipendenti, $P(B|a) = P(B)$ e si applica la regola del prodotto

$$P(a \cap B) = P(a) * P(B)$$

$$P(a \cap B) = 1/6 * 1/6 = 1/36$$



$$\Omega = 1/6$$

Evento certo

Evento
elementare a

Evento elementare B

STATISTICA: la probabilità condizionata

Da

$$P(a \cap B) = P(a) * P(B|a)$$

si ricava:

$$P(B|a) = P(a \cap B) / P(a)$$

La sostituzione nucleotidica è un processo di Markov

Nel corso del tempo sono stati elaborati vari modelli di sostituzione nucleotidica, più complessi, i quali prevedono che i quattro differenti nucleotidi, che possono essere presenti ad ogni sito, siano gli stati di una catena di Markov.

Ogni nucleotide può essere sostituito da ogni altro ed anche da un nucleotide identico. Le probabilità di tali cambiamenti si chiamano **probabilità di transizione** e sono gli ingressi di una matrice quadrata $\mathbf{P}(t)$ di dimensioni 4 X 4:

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \end{matrix} \\ \begin{matrix} p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \\ p_{41} & p_{42} & p_{43} & p_{44} \end{matrix} & \end{matrix}$$

La sostituzione nucleotidica è un processo di Markov

I **processi di Markov**, chiamati così in onore del grande matematico russo Andrey Andreyevich Markov, sono catene di eventi che si presentano uno dopo l'altro in istanti successivi di tempo.

Nel nostro caso gli eventi sono le sostituzioni nucleotidiche casuali, in seguito alle quali lo stato X del carattere che si osserva ad un determinato sito nucleotidico, ossia la base azotata, può cambiare al trascorrere del tempo.

Esso dipende, però, soltanto dall'ultimo stato in cui il processo si trovava e non da quelli precedenti: la Prob che una certa base azotata venga sostituita da ciascuna delle altre tre dipende dalla base “attuale” e non da quelle che si trovavano in quella posizione della sequenza in passato.

$$P\{X_{t+1}=j \mid X_t=i, X_{t-1}=i-1, \dots, X_0=0\} = P\{X_{t+1}=j \mid X_t=i\} = P_{ij}$$

per tutti i valori di j , i , X_{t-1} , ..., X_0 e t . P_{ij} è costante nel tempo e non dipende da alcuno stato precedente; in altri termini, il processo non ha memoria degli stati precedenti a quello corrente, ad eccezione dell'ultimo (*proprietà di Markov*).

La sostituzione nucleotidica è un processo di Markov

$$P\{X_{t+1}=j \mid X_t=i, X_{t-1}=i-1, \dots, X_0=0\} = P\{X_{t+1}=j \mid X_t=i\} = P_{ij}$$

per tutti i valori di j , i , X_{t-1} , ..., X_0 e t .

P_{ij} = **probabilità di transizione** dallo stato i allo stato j (probabilità che il processo si sposti da uno stato ad un altro in un singolo passaggio) è costante nel tempo e non dipende da alcuno stato precedente; in altri termini, il processo non ha memoria degli stati precedenti a quello corrente, ad eccezione dell'ultimo (*proprietà di Markov*).

X_{t+1} = stato del processo nell'istante $t+1$

Ogni processo di Markov ha uno *spazio campione* Ω , definito come l'insieme, finito, dei possibili stati del processo (spazio degli stati):

$$\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$$

con n stati possibili.

Stati transitori e stati definitivi

Gli **stati transitori**, dopo essere stati visitati, possono essere abbandonati mentre da quelli **definitivi** la catena, una volta entrata, non può più uscire. Gli stati definitivi, per cui $P_{ii} = 1$, si presentano nella matrice di transizione $\mathbf{P}$ come altrettanti 1 (uno) collocati nella diagonale principale, mentre in tutti gli altri ingressi ci sono solo zeri.

Per gli stati transitori $P_{ii} < 1$ cosicché almeno qualche altro ingresso della i -esima riga è > 0 .

Per definizione, la catena deve trovarsi in uno degli stati possibili ad ogni *step*; per qualsiasi valore di i e j , $0 \leq P_{ij} \leq 1$ e

$$\sum_{j=1}^n P_{ij} = 1$$

per tutti gli i , ossia la somma delle probabilità che il processo si sposti dallo stato attuale i ad uno stato j qualsiasi (che può anche coincidere con i stesso) è uguale a 1.

La sostituzione nucleotidica è un processo di Markov

```
> mdat = matrix(c(2,1,3,4,1,3,1,5,7,1,1,1,4,2,1,3), nrow = 4, ncol = 4, byrow = TRUE)
```

```
> mdat
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
[1,]	2	1	3	4
[2,]	1	3	1	5
[3,]	7	1	1	1
[4,]	4	2	1	3

```
>
```

Come passare da i a j in due passaggi

Le probabilità di transizione per $t = 1$ sono date dagli ingressi della matrice $\mathbf{P}$.

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \end{matrix} \\ \begin{matrix} p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \\ p_{41} & p_{42} & p_{43} & p_{44} \end{matrix} & \end{matrix}$$

Per $t = 2$, invece, occorre tener conto del fatto che il processo può passare dallo stato i allo stato j attraversando un qualsivoglia stato intermedio k :

$$P_{ij}(2) = \sum_{k=1}^n P_{ik} P_{kj}$$

per tutti gli stati i, j .

Per ogni possibile stato intermedio k si calcola la probabilità congiunta che il processo passi da i a k e, successivamente, da k a j , quindi si sommano le singole probabilità congiunte, tante quanti sono i possibili stati k , ossia n

Come passare da i a j in due passaggi

Per calcolare la probabilità che il sistema passi dallo stato iniziale $i = \textcircled{1}$ allo stato finale $j = \textcircled{3}$ passando per un qualsivoglia stato intermedio k occorre applicare la regola della **moltiplicazione di due matrici**: riga X colonna

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \end{matrix} \\ \begin{matrix} p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \\ p_{41} & p_{42} & p_{43} & p_{44} \end{matrix} & \end{matrix}$$

k					j				
i					k				
	1	2	3	4		1	2	$\textcircled{3}$	4
$\textcircled{1}$	P_{11}	P_{12}	P_{13}	P_{14}	1	P_{11}	P_{12}	P_{13}	P_{14}
2	P_{21}	P_{22}	P_{23}	P_{24}	2	P_{21}	P_{22}	P_{23}	P_{24}
3	P_{31}	P_{32}	P_{33}	P_{34}	3	P_{31}	P_{32}	P_{33}	P_{34}
4	P_{41}	P_{42}	P_{43}	P_{44}	4	P_{41}	P_{42}	P_{43}	P_{44}

Come passare da A a C in due passaggi

	A	T	C	G		A	T	C	G		
	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]		[,1]	[,2]	[,3]	[,4]		
A[1,]	2	1	3	4	*	A[1,]	2	1	3	= Q _{AC}	
T[2,]	1	3	1	5		T[2,]	1	3	1		5
C[3,]	7	1	1	1		C[3,]	7	1	1		1
G[4,]	4	2	1	3		G[4,]	4	2	1		3

$2*3+1*1+3*1+4*1 = \mathbf{14}$

```
> mdat%*%mdat
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]   42   16  14   28
[2,]   32   21   12   35
[3,]   26   13   24   37
[4,]   29   17   18   36
>
```

Come passare da A a C in due passaggi

```
piero@piero-XPS-9320:~$ octave
QSocketNotifier: Can only be used with threads started with QThread
GNU Octave, version 8.3.0
Copyright (C) 1993-2023 The Octave Project Developers.
This is free software; see the source code for copying conditions.
There is ABSOLUTELY NO WARRANTY; not even for MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  For details, type 'warranty'.

Octave was configured for "x86_64-pc-linux-gnu".

Additional information about Octave is available at https://www.octave.org.

Please contribute if you find this software useful.
For more information, visit https://www.octave.org/get-involved.html

Read https://www.octave.org/bugs.html to learn how to submit bug reports.
For information about changes from previous versions, type 'news'.

octave:1>
```

Come passare da A a C in due passaggi

```
octave:1> a = [2, 1, 3, 4; 1, 3, 1, 5; 7, 1, 1, 1; 4, 2, 1, 3]  
a =
```

```
     2     1     3     4  
     1     3     1     5  
     7     1     1     1  
     4     2     1     3
```

```
octave:2> a^2  
ans =
```

```
    42    16    14    28  
    32    21    12    35  
    26    13    24    37  
    29    17    18    36
```

```
octave:3>
```

Stati transitori e stati definitivi

Gli **stati transitori**, dopo essere stati visitati, possono essere abbandonati mentre da quelli **definitivi** la catena, una volta entrata, non può più uscire. Gli stati definitivi, per cui $P_{ii} = 1$, si presentano nella matrice di transizione $\mathbf{P}$ come altrettanti 1 (uno) collocati nella diagonale principale, mentre in tutti gli altri ingressi ci sono solo zeri.

Per gli stati transitori $P_{ii} < 1$ cosicché almeno qualche altro ingresso della i -esima riga è > 0 .

Per definizione, la catena deve trovarsi in uno degli stati possibili ad ogni *step*; per qualsiasi valore di i e j , $0 \leq P_{ij} \leq 1$ e

$$\sum_{j=1}^n P_{ij} = 1$$

per tutti gli i , ossia la somma delle probabilità che il processo si sposti dallo stato attuale i ad uno stato j qualsiasi (che può anche coincidere con i stesso) è uguale a 1.

Il magico numero <e>

```
> 10*9*8*7*6*5*4*3*2*1
```

```
[1] 3628800
```

```
> factorial(10)
```

```
[1] 3628800
```

```
> Euler = function(n,z)
```

```
+ {
```

```
+ result = NULL
```

```
+ numbers = seq(1:n)
```

```
+ for (i in numbers)
```

```
+ {
```

```
+ result[i] = (z^i)/factorial(i)
```

```
+ }
```

```
+ return(1 + sum(result))
```

```
+ }
```

```
> Euler(100,1)
```

```
[1] 2.718282
```

```
> Euler(100,10)
```

```
[1] 22026.47
```

```
> exp(10)
```

```
[1] 22026.47
```

$$e = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + \dots \cong 2.718282$$

$$e^z = 1 + z/1! + z^2/2! + z^3/3! + z^4/4! + \dots \cong 2.718282$$

Per $z < 1$:

$$e^z \cong 1 + z$$

Es.

$$\text{se } z = 0.1$$

$$e^{0.1} \cong 1 + 0.1 \cong 1.1$$

```
> exp(0.1)
```

```
[1] 1.105171
```

```
> Euler(10,0.1)
```

```
[1] 1.105171
```

Da
 $e^z = 1 + z/1! + z^2/2! + z^3/3! + z^4/4! + \dots \cong 1 + z$
 per $z < 1$ (al limite per z che tende a a)

Si ricava che:
 $e^{\mathbf{A}} = \mathbf{I} + \mathbf{A}/1! + \mathbf{A}^2/2! + \mathbf{A}^3/3! + \mathbf{A}^4/4! + \dots \cong (\mathbf{I} + \mathbf{A}) = \mathbf{P}$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & p_{14} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & p_{24} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & p_{34} \\ p_{41} & p_{42} & p_{43} & p_{44} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{I} + \mathbf{A} = \mathbf{P}$$

1	0	0	0		a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃	a ₁₄		p ₁₁	p ₁₂	p ₁₃	p ₁₄
0	1	0	0		a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃	a ₂₄		p ₂₁	p ₂₂	p ₂₃	p ₂₄
				+					=				
0	0	1	0		a ₃₁	a ₃₂	a ₃₃	a ₃₄		p ₃₁	p ₃₂	p ₃₃	p ₃₄
0	0	0	1		a ₄₁	a ₄₂	a ₄₃	a ₄₄		p ₄₁	p ₄₂	p ₄₃	p ₄₄