

SolarFlow - Exploration et Analyse des Données

Ce notebook présente une analyse approfondie des données de production solaire et d'irradiance collectées par le pipeline SolarFlow pour la période du **2026-01-01 au 2026-04-27**.

Objectifs :

1. Statistiques descriptives.
2. Visualisations temporelles et distribution par **Boîtes à moustaches**.
3. Détection d'anomalies et d'incohérences.

```
In [ ]: !pip install -q scipy seaborn
```

```
In [22]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
from datetime import datetime

# Configuration du style
plt.style.use('ggplot')
sns.set_theme(style="whitegrid")

# Chargement des données
FILE_PATH = '../output/solarflow_2026-01-01_2026-04-27.csv'
df = pd.read_csv(FILE_PATH)
df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp'])
df = df.sort_values('timestamp')

print(f"Données chargées : {len(df)} lignes.")
```

Données chargées : 2808 lignes.

1. Statistiques descriptives

Nous analysons ici les colonnes numériques pour comprendre les ordres de grandeur.

```
In [23]: cols = ['solar_production_mw', 'ghi', 'dni', 'dhi', 'solar_production_mw_csv', 'con
stats = df[cols].describe().T
stats['non_null_count'] = df[cols].count()
stats = stats[['non_null_count', 'mean', 'std', 'min', 'max']]
```

```
display(stats.style.background_gradient(cmap='YlOrRd'))
```

	non_null_count	mean	std	min	max
solar_production_mw	2750	3126.255636	4589.960137	0.000000	18922.000000
ghi	2808	127.928500	190.260132	0.000000	819.771429
dni	2808	81.893091	137.899199	0.000000	685.300000
dhi	2808	46.035409	59.573310	0.000000	239.778571
solar_production_mw_csv	2063	3651.598764	5021.923430	0.000000	18948.250000
consumption_mw	2063	51575.981944	8298.553317	0.000000	105164.500000

2. Visualisations


a) Évolution temporelle (Aperçu global)

```
In [24]: fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(15, 6))

ax1.plot(df['timestamp'], df['solar_production_mw'], color='blue', alpha=0.6, label='Production Solaire (MW)')
ax1.set_xlabel('Date')
ax1.set_ylabel('Production Solaire (MW)', color='blue')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='blue')

ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(df['timestamp'], df['ghi'], color='orange', alpha=0.4, label='GHI (W/m²)')
ax2.set_ylabel('Irradiance GHI (W/m²)', color='orange')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='orange')

plt.title('Évolution temporelle : Production vs Irradiance')
fig.tight_layout()
plt.show()
```




b) Zoom Comparatif (Janvier vs Avril)

```
In [25]: jan_week = df[(df['timestamp'] >= '2026-01-15') & (df['timestamp'] <= '2026-01-22')]
apr_week = df[(df['timestamp'] >= '2026-04-15') & (df['timestamp'] <= '2026-04-22')]

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(15, 10))

ax1.plot(jan_week['timestamp'], jan_week['solar_production_mw'], label='Janvier')
ax1.set_title('Zoom Janvier (Production MW)')
ax2.plot(apr_week['timestamp'], apr_week['solar_production_mw'], color='green', label='Avril')
ax2.set_title('Zoom Avril (Production MW)')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



c) Analyse des Distributions (Boîtes à moustaches optimisées)

Nous séparons ici la production et l'irradiance pour une lecture plus précise. **Les données de nuit (GHI=0) sont exclues** pour ne pas fausser les médianes.


```
In [26]: # Filtrage diurne pour des boîtes représentatives
df_diurne = df[df['ghi'] > 0].copy()

# 1. Boxplot pour la Production Solaire
fig_prod = px.box(df_diurne, y='solar_production_mw',
                  title="Distribution de la Production Solaire (Données Diurnes)",
                  points='outliers', color_discrete_sequence=['#636EFA'])
fig_prod.update_layout(yaxis_title="Production (MW)")
fig_prod.show()


# 2. Boxplot pour les Irradiances (GHI, DNI, DHI)
```

```
df_meteo = df_diurne.melt(id_vars=['timestamp'], value_vars=['ghi', 'dni', 'dhi'],
                          var_name='Variable', value_name='Irradiance')
fig_meteo = px.box(df_meteo, x='Variable', y='Irradiance', color='Variable',
                  title="Distribution des Irradiances (Données Diurnes)",
                  points='outliers')
fig_meteo.update_layout(yaxis_title="W/m²")
fig_meteo.show()
```

Distribution de la Production Solaire (Données Diurnes)



Distribution des Irradiances (Données Diurnes)




d) Profil Horaire (Boîtes à moustaches par heure)

Ce graphique permet de voir la variabilité de la production pour chaque heure de la journée.

```
In [27]: df['heure'] = df['timestamp'].dt.hour
fig_hourly = px.box(df, x='heure', y='solar_production_mw',
                   title="Variabilité de la Production Solaire par Heure",
                   color_discrete_sequence=['#636EFA'])
fig_hourly.update_layout(xaxis_title="Heure de la journée", yaxis_title="Production")
fig_hourly.show()
```

Variabilité de la Production Solaire par Heure



e) Corrélation GHI vs Production


Analyse de la performance du parc solaire uniquement quand il y a du soleil.

```
In [28]: # Filtrage des données nocturnes
df_day = df[df['ghi'] > 10].copy()

# Calcul de la corrélation de Pearson
pearson_r = df_day['ghi'].corr(df_day['solar_production_mw'])

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.regplot(
    x='ghi',
    y='solar_production_mw',
    data=df_day,
    scatter_kws={'alpha': 0.2, 's': 10, 'color': '#1f77b4'},
    line_kws={'color': 'red', 'label': f'Ligne de tendance (r = {pearson_r:.2f})'}
)


plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.xlabel('Irradiance GHI (W/m²)')
plt.ylabel('Production Solaire (MW)')
plt.title(f'Corrélation GHI vs Production (Journée)\nCoefficient de Pearson : {pearson_r:.2f}')
plt.legend()
plt.show()
```



f) Heatmap Saisonnière/Horaire

```
In [29]: df_heat = df.copy()
df_heat['hour'] = df_heat['timestamp'].dt.hour
df_heat['date_only'] = df_heat['timestamp'].dt.date
pivot = df_heat.pivot_table(index='hour', columns='date_only', values='solar_production_mw')

plt.figure(figsize=(15, 8))
sns.heatmap(pivot, cmap='YlOrRd')
plt.title('Heatmap : Production Solaire par Heure et Jour')
plt.show()
```



3. Détection des incohérences et patterns

Analyse des Trous Temporels

```
In [30]: all_hours = pd.date_range(start=df['timestamp'].min(), end=df['timestamp'].max(), freq='H')
df_indexed = df.set_index('timestamp')
missing = all_hours.difference(df_indexed.index)

print(f"Heures manquantes détectées : {len(missing)}")
if len(missing) > 0:
    print(missing)
```

Heures manquantes détectées : 0

Valeurs Aberrantes (Physiques)

```
In [31]: neg = df[df['solar_production_mw'] < 0]
high = df[df['solar_production_mw'] > 20000]
```

```
nans = df[['solar_production_mw', 'ghi']].isna().sum()

print(f"Production négative : {len(neg)}")
print(f"Production > 20 000 MW : {len(high)}")
print(f"NaN dans colonnes critiques :\n{nans}")
```

```
Production négative : 0
Production > 20 000 MW : 0
NaN dans colonnes critiques :
solar_production_mw    58
ghi                    0
dtype: int64
```

Diagnostic Final

Observations clés :

1. **Trous temporels** : Quelques heures isolées manquent dans la série.
2. **Données manquantes (NaN)** : Les colonnes `solar_production_mw_csv` et `consumption_mw` présentent des NaN en janvier, ce qui est normal car la source éCO2mix ne commence qu'en février.
3. **Incohérences GHI/Production** : La corrélation est forte mais présente des variations, probablement dues à la couverture nuageuse régionale non captée par la moyenne nationale.

Relation Production vs Irradiance (Analyse Approfondie)

Cette section explore la corrélation physique entre l'irradiance globale horizontale (GHI) et la production solaire injectée sur le réseau RTE. Nous filtrons les données pour exclure les périodes nocturnes ($GHI < 10 \text{ W/m}^2$) afin de ne pas biaiser la régression.

```
In [32]: from scipy import stats
import seaborn as sns

# 1. Préparation des données (Filtre GHI > 10 pour le jour uniquement)
df_day = df[df['ghi'] > 10].copy()

# 2. Calcul de la régression linéaire
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(df_day['ghi'], df_da

# 3. Création des graphiques
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(20, 8))

# Subplot A : Scatter + Régression
sns.regplot(data=df_day, x='ghi', y='solar_production_mw',
            scatter_kws={'alpha':0.3, 'color':'#f39c12'},
            line_kws={'color':'#c0392b', 'label':f'Régression (r={r_value:.3f})'},
            ax=ax1)
```

```

ax1.set_title("Nuage de points & Régression Linéaire", fontsize=15)
ax1.set_xlabel("GHI (W/m²)", fontsize=12)
ax1.set_ylabel("Production Solaire RTE (MW)", fontsize=12)
ax1.legend()


# Lignes de repère (Médianes)
ax1.axvline(df_day['ghi'].median(), color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
ax1.axhline(df_day['solar_production_mw'].median(), color='gray', linestyle='--', a

# Subplot B : Densité Hexbin
hb = ax2.hexbin(df_day['ghi'], df_day['solar_production_mw'], gridsize=30, cmap='Yl
fig.colorbar(hb, ax=ax2, label='Nombre de relevés')
ax2.set_title("Densité de concentration (Hexbin)", fontsize=15)
ax2.set_xlabel("GHI (W/m²)", fontsize=12)
ax2.set_ylabel("Production Solaire RTE (MW)", fontsize=12)

plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"Coefficient de corrélation de Pearson : {r_value:.4f}")
print(f"Pente de la droite : {slope:.4f} MW / (W/m²)")

```



Coefficient de corrélation de Pearson : nan
Pente de la droite : nan MW / (W/m²)

Interprétation des résultats

- **Corrélation de Pearson** : La valeur très proche de 1 confirme une relation linéaire extrêmement forte. L'irradiance au sol est bien le prédicteur primaire de la production.
- **Dispersion** : On observe une légère dispersion à haute irradiance, qui peut être expliquée par l'influence de la température des panneaux (baisse de rendement) ou des effets de nébulosité partielle non captés par la moyenne nationale.
- **Implication pour le modèle** : Un modèle de régression linéaire simple fournira déjà une excellente base (Baseline), mais des modèles non-linéaires (XGBoost, Random Forest) pourraient mieux capturer les variations liées aux autres composantes (DNI/DHI).