


Entrainement à l'Evaluation (Chap. 8 et 9)

Durée : 50 minutes

Notions évaluées : Exercice 1 : Lentille convergente, distance focale, Foyers, image, objet,
Exercice 2 : Mole, quantité de matière

Exercice 1 : Paul est-il myope ou hypermétrope ?



Paul a rendez-vous chez l'ophtalmologue pour savoir s'il doit porter des lunettes.

- 1- Comment s'appelle l'organe dans l'œil qui fonctionne comme une lentille convergente : _____
Comment s'appelle l'organe dans l'œil qui capte les rayons lumineux ? : _____
- 2- Placer l'axe optique sur le schéma ci-dessus. (La lentille, déjà tracée sur le schéma, modélise le cristallin).

Le cristallin de Paul a une distance focale de 14 cm.

- 3- Placer le foyer objet et le foyer image sur le schéma (**Attention à l'échelle !**).

Paul regarde un objet (noté AB), situé à 44 cm du cristallin. Cet objet mesure 12 cm de haut. Le point A est situé sur l'axe optique et le point B verticalement au-dessus.

- 4- Dessiner cet objet sur le schéma ci-dessus.
- 5- Tracer l'image A' B' de l'objet AB. Mesurer le grandissement de l'image ? _____
- 6- Paul a-t-il besoin de lunettes ?

Les hypermétropes portent des verres de lunettes convergent alors que les myopes portent des verres de lunettes divergent. Les verres convergent permettent de rapprocher l'image A'B' vers le cristallin alors que les verres divergent éloignent l'image A'B'.

- 7- Paul est-il myope ou hypermétrope ? Justifier.

Exercice 2 : Entraînement sur la mole

Le saccharose $C_{12}H_{22}O_{11}$ est la molécule qui constitue le sucre en poudre que nous utilisons en cuisine.

Calculer la **quantité de matière** (en mol) correspondant à une masse $m_{ech} = 10g$ de sucre ($C_{12}H_{22}O_{11}$).

Toutes les étapes de votre raisonnement (même non abouties) seront valorisées.

Données :

$$m(H) = 1,67 \cdot 10^{-27} kg$$

$$m(C) = 1,99 \cdot 10^{-26} kg$$

$$m(O) = 2,66 \cdot 10^{-23} g$$