

Mathématiques en TSI2

Pierre Pageault

2026-09-24

Table des matières

Preface	3
1 Intégrales généralisées	4
Introduction	4
1.1 Convergence d'une intégrale généralisée	6
1.1.1 Intégrales généralisées	6
1.1.2 Convergence d'une intégrale généralisée	6
1.1.3 Intégrales faussement généralisées	11
1.2 Les théorèmes de comparaison	12
1.2.1 Le théorème de comparaison pour les fonctions positives	12
1.2.2 Intégrales absolument convergentes et fonctions intégrables	14
1.2.3 Intégrales et fonctions intégrables de références	16
1.3 Calculer avec des intégrales convergentes	19
1.3.1 Propriétés des intégrales convergentes	19
1.3.2 Intégrations par parties et changement de variable	21
Exercices	26
1.3.1 Convergence d'une intégrale généralisée	26
1.3.2 Les théorèmes de comparaison	26
1.3.3 Calculer avec des intégrales convergentes	27
1.3.4 Divers	28
2 Séries numériques	30
Introduction	30
2.1 Convergence d'une série numérique	30
2.1.1 Définitions	30
2.1.2 Calculer avec des séries convergentes	33
2.1.3 Séries géométriques et séries télescopiques	34
2.2 Séries à termes positifs	37
2.3 Autres résultats de convergence	40
2.3.1 Le critère de d'Alembert	41
2.3.2 Critère des séries alternées	41
Exercices	43
2.3.1 Convergence d'une série numérique	43
2.3.2 Séries à termes positifs	44
2.3.3 Autres résultats de convergence	45

2.3.4 Divers	47
3 Compléments d'algèbre linéaire	49
Introduction	49
3.1 Familles quelconques de vecteurs	49
3.1.1 Combinaisons linéaires	49
3.1.2 Familles libres, génératrices	50
3.1.3 Bases	50
3.2 Sous-espaces vectoriels	51
3.2.1 Sous espaces vectoriels	51
3.2.2 Somme de sous espaces vectoriels	52
3.2.3 Définir une application linéaire à l'aide d'une somme directe	54
3.2.4 Sous espaces stables par un endomorphisme	56
3.3 Projecteurs et symétries	57
3.3.1 Projecteurs	57
3.4 Matrices	58
Exercices	59
3.4.1 Familles quelconques de vecteurs	59
3.4.2 Sous espaces vectoriels	59
3.4.3 Projecteurs et symétries	61
3.4.4 Matrices	62
3.4.5 Divers	63
Programmes de colle	65
Programme 01 - du 14/09 au 18/09	65
Programme 02 - du 21/09 au 26/09	65
Programme 03 - du 28/09 au 02/10	65
DM	66

Preface

Ce document contient les documents pédagogiques relatifs au cours de mathématiques de deuxième année dispensé en TSI2 au lycée Etienne Mimard de Saint Etienne.

1 Intégrales généralisées

Introduction

Le but de ce chapitre est de généraliser la théorie de l'intégration vue en première année – qui se limite à des segments – à des intervalles *quelconques*. On donnera par exemple un sens à des intégrales comme $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ ou $\int_0^1 \ln(x)dx$.

La théorie de l'intégration vue en première année est héritée de Riemann¹ qui l'introduit dans son article fondateur « Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe » (Sur la représentabilité d'une fonction par une série trigonométrique) en 1854.

L'intégrale y est définie via des *sommes*, qui portent aujourd'hui le nom de *sommes de Riemann*.




FIGURE 1.1 : La définition initiale de Riemann de l'intégrale à l'aide de sommes.

1. Georg Friedrich Bernhard Riemann, mathématicien allemand né le 17 septembre 1826 à Breselenz, et mort le 20 juillet 1866 à Selasca, en Italie.

L'énoncé moderne correspondant est le suivant :

Définition 1.1 (Sommes de Riemann). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, avec $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$. Pour tout $n \geq 1$, on définit

$$U_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

et

$$V_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Alors les suites (U_n) et (V_n) convergent vers une limite commune appelée intégrale de f sur $[a, b]$ et notée $\int_a^b f(t)dt$.

On peut montrer alors que la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est une *primitive* de f sur $[a, b]$ et on aboutit à la définition usuelle de l'intégrale donnée en première année : pour toute primitive F de f sur $[a, b]$,

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a).$$

Puisqu'une telle primitive F est nécessairement continue sur $[a, b]$ (elle y est de classe C^1), on a en particulier

$$\int_a^b f(t)dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t)dt.$$

Cette relation présente l'avantage de garder éventuellement un sens lorsque f n'est pas définie en b , par exemple lorsque $b = +\infty$; on parlera alors d'intégrale *généralisée* de f sur $[a, b]$.

Les intégrales généralisées seront donc définies comme des *limites* d'intégrales usuelles – à condition que ces limites existent ! Contrairement aux intégrales usuelles, les intégrales généralisées ne seront donc pas toujours bien définies, et il faudra prendre plus de précaution lors de leurs manipulations.

Ces précautions étant prises, les intégrales généralisées se comporteront essentiellement de la même manière que les intégrales usuelles.

Les intégrales généralisées sont d'un usage constant en mathématiques et en physique (transformée de Laplace, de Fourier, fonction Γ d'Euler, intégrale de Gauss,...)

1.1 Convergence d'une intégrale généralisée

Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, d'extrémités $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, avec $a \leq b$, et $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1.1 Intégrales généralisées

Définition 1.2. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction *continue* sur I et α une extrémité de I . On dit que l'intégrale de f sur I est **généralisée en α** si I est *ouvert* en α . On dit que l'intégrale de f sur I est **généralisée** si elle est généralisée en au moins une des extrémités de I .

Note 1

La phrase “l'intégrale de f sur I ” s'abrège usuellement $\int_I f$, $\int_I f(t)dt$ ou $\int_a^b f(t)dt$. Il faut noter l'*ambiguïté* de cette dernière notation (qui est pourtant la plus utilisée) car elle ne précise pas si les bornes a et b sont incluses ou exclues. C'est justement à vous que revient de lever cette ambiguïté pour étudier l'aspect généralisé ou non de l'intégrale.

Exemple 1.1. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ est généralisée en $+\infty$ uniquement car la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ est continue sur $[1, +\infty[$.

Exemple 1.2. L'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1-t} dt$ est généralisée en 0 et en 1 car la fonction $t \mapsto \frac{\ln(t)}{1-t}$ est continue sur $]0, 1[$. On dit qu'elle est *doublement* généralisée.

Astuce

L'aspect généralisée d'une intégrale se lit sur le *domaine* de la fonction intégrée.

Que dire maintenant de l'intégrale de la fonction $x \mapsto x^2$ sur l'intervalle $]0, 1]$? Certes l'extrémité gauche est ouverte mais la fonction $x \mapsto x^2$ est continue sur $[0, 1]$... On peut de même se poser la question de l'intégrale de la fonction $x \mapsto x \ln(x)$ sur l'intervalle $]0, 1]$ qui se *prolonge par continuité* en 0. Ces situations correspondent au cas des intégrales *faussement généralisées*, étudiées plus en détail dans la Section 1.1.3.

1.1.2 Convergence d'une intégrale généralisée

Jusqu'à présent, on s'est seulement entendu sur le sens de la phrase “l'intégrale de f sur I est généralisée”. Nous n'avons pas attribué de *valeur numérique* à cette “intégrale”. C'est le rôle de la notion de *convergence*.

Définition 1.3 (Cas d'un intervalle semi ouvert à droite). Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. On dit que l'intégrale de f sur $[a, b[$ **converge** si l'intégrale partielle $\int_a^x f(t)dt$ admet une limite *finie* quand $x \rightarrow b^-$. On pose alors

$$\int_a^b f(t)dt = \lim_{\text{def } x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t)dt$$

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale de f sur I **diverge**. La convergence ou la divergence d'une intégrale s'appelle sa **nature**.




FIGURE 1.2 : Intégrale partielle et généralisée dans le cas $b = +\infty$.

i Note 2

On dit aussi qu'une intégrale généralisée **bien définie** ou **existe** (en référence à la limite qui la définit) pour signifier qu'elle *converge*; ce sont des synonymes.

Exemple 1.3. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ converge et vaut 1.

Pour tout $x \geq 1$, on a

$$\int_1^x \frac{dt}{t^2} = 1 - \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

Donc l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ converge et vaut 1.

Exemple 1.4. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ diverge.

Pour tout $x \geq 1$, on a

$$\int_1^x \frac{dt}{t} = \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty,$$

donc l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ diverge.

Remarque 1.1. Les exemples précédents montrent qu'il ne faut pas confondre la convergence en $+\infty$ de l'intégrale et de la fonction intégrée (l'intégrande). Par exemple, la fonction $x \mapsto 1/x$ admet une limite en $+\infty$, mais l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ diverge.




FIGURE 1.3 : Des fonctions peuvent avoir des graphes similaires mais des intégrales de nature tout à fait différente.

⚠ Avertissement 1

Il ne faut pas confondre la convergence de l'intégrale en $\pm\infty$ et la convergence de la fonction intégrée (l'intégrande).

Voici un autre exemple classique d'intégrale convergente.

Exemple 1.5. L'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ converge et vaut 1.

Pour tout $x \geq 0$, on

$$\int_0^x e^{-t} dt = 1 - e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

Donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ converge et vaut 1.

Remarque 1.2. On définit de même la convergence d'une intégrale sur un intervalle semi ouvert à gauche $]a, b]$ en considérant les intégrales partielles $\int_x^b f(t)dt$ quand $x \rightarrow a^+$ et en posant, en cas de convergence

$$\int_a^b f(t)dt \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t)dt$$




FIGURE 1.4 : Intégrale partielle et intégrale généralisée dans le cas $a = 0$.

Exemple 1.6. L'intégrale $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ diverge.

Pour tout $\varepsilon > 0$, on a

$$\int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{\varepsilon} - 1 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} +\infty.$$

Donc l'intégrale $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ diverge.

On vient d'associer à certaines intégrales une valeur numérique. On va donc pouvoir commencer à *calculer* avec des intégrales généralisées. Ce point sera abordé plus en détail dans la Section 1.3 mais nous énonçons dès maintenant la *relation de Chasles*, attendue de toute théorie satisfaisante de l'intégration.

Proposition 1.1 (Relation de Chasles sur un intervalle semi ouvert). *Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. Alors pour tout point $c \in [a, b[$, les intégrales $\int_a^b f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ ont même nature et, en cas de convergence, on a*

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt.$$

 Astuce 1

Si elles sont généralisées uniquement en b , les intégrales $\int_a^b f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ ont *même nature*.

Remarque 1.3. La Proposition 1.1 et le Tip 1 se généralisent naturellement au cas d'un intervalle semi ouvert à gauche $]a, b]$.

Une fois la convergence définie dans le cas d'intervalles semi ouverts, la relation de Chasles – que l'on veut valide pour les intégrales généralisées – suggère la définition suivante dans le cas d'un intervalle ouvert.

Définition 1.4 (Cas d'un intervalle ouvert). Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. On dit que l'intégrale de f sur $]a, b[$ **converge** si elle converge **en** a et **en** b , c.-à.d s'il existe un réel $c \in]a, b[$, tel que les *deux* intégrales $\int_a^c f(t)dt$ et $\int_c^b f(t)dt$ convergent. On pose alors

$$\int_a^b f(t)dt \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt.$$

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale de f sur $]a, b[$ **diverge**. La convergence ou la divergence d'une intégrale s'appelle sa **nature**.

Remarque 1.4. Cette définition et la valeur de l'intégrale ne dépendent pas du point c utilisé par la relation de Chasles satisfaite par les intégrales généralisées sur un intervalle semi ouvert (Proposition 1.1).

Exemple 1.7. L'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ converge et vaut π .

Pour tout $w \geq 0$, on a

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \arctan(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}.$$

Donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ converge et vaut $\pi/2$.

De même, pour tout $x \leq 0$, on a

$$\int_x^0 \frac{dt}{1+t^2} = -\arctan(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi}{2}.$$

Donc par *définition* l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ converge et vaut π .

Exemple 1.8. L'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ diverge car elle diverge en 0.

 Astuce 2

Montrer la convergence d'une intégrale sur un espace *ouvert*, c'est montrer la convergence de *deux* intégrales "simplement" généralisées.

1.1.3 Intégrales faussement généralisées

Nous traitons ici le cas des intégrales dites *faussement généralisées*, comme $\int_{]0,1]} x^2 dx$ ou $\int_{]0,1]} x \ln(x) dx$, très fréquentes en pratique.

L'intuition voudrait que ces intégrales soient convergentes, et que la valeur de l'intégrale ne dépende pas de l'inclusion ou de l'exclusion des bornes de l'intégrale car "il n'y a pas d'aire sous un point". La Proposition 1.2 montre que c'est effectivement le cas.

Définition 1.5. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue et α une extrémité ouverte de I . On dit que l'intégrale de f sur I est **faussement généralisée en α** si f se prolonge par continuité en α . On dit que l'intégrale de f sur I est **faussement généralisée** si f se prolonge par continuité en chaque extrémité ouverte de I .

La note suivante est à comparer au Warning 1.

 Note 3

Le prolongement par continuité est réservé aux extrémités *finies* de I . On ne peut donc pas parler d'intégrales "faussement généralisées en $\pm\infty$ " lorsque la fonction intégrée admet une limite finie en $\pm\infty$.

Exemple 1.9. Les intégrales $\int_{]0,1]} x^2 dx$ et $\int_{]0,1]} x \ln(x) dx$ sont toutes les deux faussement généralisées en 0 car $x^2 \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$ et $x \ln(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$ par *croissance comparée*.

Proposition 1.2 (Convergence des intégrales faussement généralisées). *Si l'intégrale de f sur I est faussement généralisée, elle est convergente et*

$$\int_I f = \int_{\bar{I}} f.$$

Note 4

Ici, $\bar{I}$ désigne l'*adhérence* de l'intervalle I ; il s'agit du même intervalle dans lequel on a refermé toutes les bornes ouvertes différentes de $\pm\infty$.

Note 5

Dans le théorème précédent, le prolongement par continuité de f à $\bar{I}$ est encore noté f . La rigueur voudrait qu'on le note d'une autre manière, mais l'usage prévaut.

C'est l'occasion de rappeler qu'en mathématiques, une fonction vient toujours avec un espace de *départ* et un espace d'*arrivée*, dont dépendent ses propriétés (injectivité, surjectivité, régularité,...). Les changer, c'est changer de fonction.

Bien souvent, on "oublie" ces espaces pour ne préciser que l'*action* de f ; ils sont alors présents de manière *sous-jacente*.

Exemple 1.10. Les intégrales $\int_{[0,1]} x^2 dx$ et $\int_{[0,1]} x \ln(x) dx$ sont toutes les deux convergentes et on peut noter sans ambiguïté leur valeur $\int_0^1 x^2 dx$ et $\int_0^1 x \ln(x) dx$.

1.2 Les théorèmes de comparaison

Les seules intégrales réellement intéressantes sont les intégrales convergentes. Actuellement, nous disposons d'un seul outil pour montrer la convergence d'une intégrale généralisée : revenir à une intégrale partielle et espérer être capable de la calculer pour étudier sa limite.

Malheureusement, peu d'intégrales sont effectivement calculables car il est difficile de calculer des primitives, voir impossible².

Face à ce constat, il est nécessaire de développer des outils permettant de montrer qu'une intégrale converge sans pour autant calculer explicitement une primitive de la fonction intégrée; c'est le rôle des théorèmes de comparaison.

1.2.1 Le théorème de comparaison pour les fonctions positives

Tous les théorèmes de comparaison que nous allons démontrer sont basés sur le théorème suivant, lui même conséquence du théorème de la limite monotone, qui est un théorème abstrait d'existence de *limites*.

2. Un théorème de Liouville affirme par exemple qu'il n'existe pas de primitive de la fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ exprimable à l'aide de fonctions usuelles (polynômes, exponentielles, logarithmes, trigonométriques).

Théorème 1.1 (Comparaison à l'aide de la relation $\leq$ pour les fonctions positives). Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continues sur I . On suppose que

1. $\forall t \in I, 0 \leq f(t) \leq g(t)$,
2. l'intégrale de g sur I converge.

Alors l'intégrale de f sur I converge.

Remarque 1.5. Le théorème de comparaison permet donc un *transfert de technicité* ; on passe d'un calcul de *primitive* à une *majoration*.

Exemple 1.11. Nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)}{t^2} dt$.

L'intégrale proposée est généralisée en 0 et en $+\infty$ car la fonction $t \mapsto \frac{1-\cos(t)}{t^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$. Un développement limité montre que cette intégrale est faussement généralisée en 0 car

$$\frac{1-\cos(t)}{t^2} = \frac{t^2/2 + o(t^2)}{t^2} \sim \frac{1}{2} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{2}.$$

De plus, on a

$$\forall t \geq 1, 0 \leq \frac{1-\cos(t)}{t^2} \leq \frac{2}{t^2}, \quad (1)$$

et l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ converge. Donc par comparaison de fonctions *positives*, l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)}{t^2} dt$ converge en $+\infty$ ³. Donc par définition l'intégrale converge.

Attention, on ne peut pas utiliser directement la majoration (1) et le Théorème 1.1 sur l'intervalle $]0, +\infty[$ car l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ diverge.

Remarque 1.6. On peut aussi utiliser la *contraposée* de ce théorème ; si l'intégrale de f sur I diverge, alors l'intégrale de g sur I diverge. On utilisera ce résultat en TD pour montrer la divergence de l'intégrale de Dirichlet.

3. On utilise ici implicitement la linéarité de l'intégrale convergente : si l'intégrale de f sur I converge, alors l'intégrale de λf sur I converge pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$.

1.2.2 Intégrales absolument convergentes et fonctions intégrables

Le théorème de comparaison pour les fonctions positives permet déjà de démontrer la convergence (ou la divergence) de beaucoup d'intégrales, mais il ne s'applique qu'à des fonctions à valeurs *positives*; il ne permet pas de traiter les fonctions à valeurs complexes, ou les fonctions dont le signe alterne. La notion d'intégrales *absolument convergentes* et de fonctions *intégrables* vient pallier efficacement cet inconvénient.

Définition 1.6. On dit que l'intégrale de f sur I est **absolument convergente** si l'intégrale de $|f|$ sur I converge.

Proposition 1.3. *Si l'intégrale de f sur I converge absolument, alors elle converge.*

Remarque 1.7. On verra en TD avec l'exemple de l'intégrale de Dirichlet que la réciproque est fausse.

Cette proposition est fondamentale car elle permet de montrer la convergence d'une intégrale en se ramenant à l'intégrale d'une fonction *positive* à laquelle on peut appliquer le théorème de comparaison.

Exemple 1.12. Nature de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \sin(t)e^{-t} dt$.

On a

$$\forall t \geq 0, 0 \leq |\sin(t)e^{-t}| \leq e^{-t}.$$

De plus, l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ converge. Donc par comparaison de fonctions positives, l'intégrale proposée converge *absolument*, donc converge.

Remarque 1.8. Si f est de *signe constant* sur I , il n'y a pas de différence entre la convergence absolue et la convergence de l'intégrale de f sur I .

Une fonction dont l'intégrale sur I est absolument convergente est dite *intégrable* sur I .

Définition 1.7. On dit qu'une fonction continue $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est **intégrable** sur I si l'intégrale de f sur I est absolument convergente.

Avertissement 2

L'intégrabilité signifie plus que la simple *existence* de l'intégrale.

Lorsqu'une fonction est intégrable, on dispose d'une généralisation de l'inégalité triangulaire usuelle qui stipule que *la valeur absolue d'une somme est plus petite que la somme des valeurs absolues*. C'est une inégalité très utile en analyse pour *majorer en valeur absolue* une intégrale.

Proposition 1.4. *Si f est intégrable sur I alors*

$$\left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|.$$

Le résultat suivant est une manière commode de dire que les fonctions intégrables sont stables par *combinaison linéaire*.

Proposition 1.5. *L'ensemble des fonctions intégrables sur I est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$.*

Remarque 1.9. L'application $f \mapsto N(f) = \int_I |f|$ munit cet ensemble d'une structure d'*espace vectoriel normé*. Cette notion, fondamentale en analyse, dépasse le cadre de ce cours. C'est elle qui justifie l'intérêt de la notion d'intégrabilité.

On énonce maintenant les théorèmes de comparaison pour les fonctions intégrables. Ce sont eux que l'on utilisera le plus souvent en pratique pour montrer qu'une intégrale converge.

Théorème 1.2 (Comparaison à l'aide des relations o et O). *Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions continues sur I et soit α une extrémité ouverte de I . On suppose que g est intégrable au voisinage de α et que $f = o_\alpha(g)$ ou $f = O_\alpha(g)$. Alors f est intégrable au voisinage de α .*

Théorème 1.3 (Comparaison à l'aide de la relation $\sim$). *Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions continues sur I et soit α une extrémité ouverte de I . On suppose que $f \sim_\alpha g$. Alors f est intégrable au voisinage de α ssi g est intégrable au voisinage de α .*

Remarque 1.10. Dans ces théorèmes, les signes de f et g sont sans importance ; c'est l'intérêt de la notion d'*intégrabilité*.

i Note 6 : Voisinages

Soit α une extrémité ouverte de I . Un **voisinage** de α dans I est un intervalle non vide V du type $[c, \alpha[$ (ou $]\alpha, c]$) avec $c \in I$.

Si $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ est une fonction de I dans $\mathbb{K}$, on dit qu'une propriété de f est satisfaite **au voisinage de α** s'il existe un voisinage V de α dans I sur lequel la propriété est effectivement satisfaite.

i Note 7 : Rappels sur les relations de comparaison

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$ et α une extrémité ouverte de I . On suppose que f et g ne s'annulent pas au voisinage de α . On dit que

1. la fonction f est **négligeable** devant g au voisinage de α , et on note $f = o_\alpha(g)$, si

$$\left| \frac{f(t)}{g(t)} \right| \xrightarrow[t \in I]{t \rightarrow \alpha} 0,$$

2. la fonction f est **dominée** par g au voisinage de α , et on note $f = O_\alpha(g)$, si le quotient f/g est borné au voisinage de α i.e. s'il existe un voisinage V de α dans I et une constante $M \geq 0$ tels que

$$\forall t \in V, \left| \frac{f(t)}{g(t)} \right| \leq M$$

3. la fonction f est **équivalente** à g en α , et on note $f \sim_\alpha g$, si

$$\left| \frac{f(t)}{g(t)} \right| \xrightarrow[t \in I]{t \rightarrow \alpha} 1.$$

Astuce 3

Les relations o, O et $\sim$ se lisent sur le *quotient* f/g qui, respectivement, *tend vers 0, est borné, ou tend vers 1*.

Remarque 1.11. La relation $\sim$ est *symétrique* i.e. $f \sim g$ ssi $g \sim f$. C'est cette propriété qui est responsable de l'*équivalence* du Théorème 1.3. De plus $o \Rightarrow \tilde{O}$ et $\sim \Rightarrow O$

1.2.3 Intégrales et fonctions intégrables de références

Maintenant que l'on dispose de théorèmes de comparaison, il reste à se constituer une collection de fonctions intégrables dites de *références*, suffisamment riches pour être comparées aux fonctions rencontrées en pratique ; en l'occurrence les fonctions puissances, la fonction logarithme et les exponentielles décroissantes.

Théorème 1.4 (Intégrales de Riemann). *Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est*

1. *intégrable au voisinage de 0 ssi $\alpha < 1$,*
2. *intégrable au voisinage de $+\infty$ ssi $\alpha > 1$.*

Remarque 1.12. Les intégrales $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ sont connues sous le nom d'*intégrales de Riemann*.




FIGURE 1.5 : La différence ténue de convergence des intégrales de Riemann.

i Note 8 : Rappels sur les fonctions puissances

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, la fonction $f_\alpha : t \mapsto t^\alpha$ est définie sur $]0, +\infty[$ par

$$\forall t > 0, t^\alpha = e^{\alpha \ln(t)}.$$

La fonction f_α est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$ et

$$\forall t > 0, (t^\alpha)' = \alpha t^{\alpha-1}.$$

Une primitive de f_α sur $]0, +\infty[$ est donnée par

$$\begin{cases} t \mapsto \frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1} & \text{si } \alpha \neq -1, \\ t \mapsto \ln(t) & \text{si } \alpha = -1. \end{cases}$$

💡 Astuce 4

Si $\alpha \neq -1$, une primitive de $\frac{u'}{u^\alpha}$ est $\frac{u^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}$.

Exemple 1.13. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ converge.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Par croissance comparée, on a

$$\frac{t^n e^{-t}}{1/t^2} = t^{n+2} e^{-t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0,$$




FIGURE 1.6 : Graphes des fonctions puissances

donc $t^n e^{-t} = o_{+\infty} \left(\frac{1}{t^2} \right)$. De plus la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Donc par comparaison, la fonction $t \mapsto t^n e^{-t}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Donc l'intégrale I_n est (absolument) convergente.

💡 Astuce 5

La présence d'une *exponentielle décroissante* permet souvent de comparer la fonction intégrée à la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ via une *croissance comparée*.

Théorème 1.5 (Fonctions exponentielles). *Soit $a \in \mathbb{R}$. La fonction $t \mapsto e^{at}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$ ssi $a < 0$.*

Exemple 1.14. Si $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{C}$ est bornée, alors pour tout $p > 0$, la fonction $t \mapsto f(t)e^{-pt}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ ⁴.

Soit $p > 0$. Par définition, il existe $M \geq 0$ tel que

$$\forall t \geq 0, |f(t)| \leq M,$$

donc $f(t)e^{-pt} = O_{+\infty}(e^{-pt})$. Puisque $p > 0$, la fonction $t \mapsto e^{-pt}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$. Donc par comparaison, la fonction $t \mapsto f(t)e^{-pt}$ l'est aussi.

Théorème 1.6 (Fonction logarithme). *La fonction $\ln$ est intégrable au voisinage de 0.*

4. L'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$ est donc convergente; on reconnaît la *transformée de Laplace* de f .

Remarque 1.13. La convergence (et la valeur) de l'intégrale de $\ln$ sur $]0, 1]$ était prévisible au vu de l'Exemple 1.5 : les fonctions $\ln$ et $\exp$ sont *réciproques* l'une de l'autre, donc leur graphe sont symétriques par rapport à la première bissectrice.




FIGURE 1.7 : Convergence de l'intégrale $\int_0^1 \ln(t)dt$.

Exemple 1.15. Nature de l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1-t} dt$.

L'intégrale est généralisée en 0 et en 1 car la fonction $t \mapsto \frac{\ln(t)}{1-t}$ est continue sur $]0, 1[$.

Au voisinage de 0^+ , on a

$$\frac{\ln(t)}{1-t} \sim \frac{\ln(t)}{1} = \ln(t)$$

et la fonction $t \mapsto \ln(t)$ est intégrable au voisinage de 0. Donc par comparaison, l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1-t} dt$ converge en 0.

Remarque 1.14. En cas de convergence, il est bon de connaître les valeurs des intégrales $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$, $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$, $\int_0^{+\infty} e^{-at} dt$ et $\int_0^1 \ln(t)dt$, ou d'être capable de les retrouver rapidement.

1.3 Calculer avec des intégrales convergentes

1.3.1 Propriétés des intégrales convergentes

Les intégrales convergentes héritent de toutes les propriétés préservées par passage à la limite (égalités, inégalités larges,...). La philosophie générale est la suivante :

 Astuce

Sous réserve de convergence, les propriétés des intégrales généralisées sont les mêmes que celles des intégrales classiques.

On pourra donc manipuler des intégrales généralisées de la même manière que l'on manipule des intégrales classiques, à condition de s'assurer que les quantités manipulées existent !

Proposition 1.6 (Propriétés des intégrales convergentes). *Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions continues sur I . On suppose que les intégrales de f et g sur I convergent. Alors*

1. *pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, l'intégrale de $f + \lambda g$ sur I converge et*

$$\int_I (f + \lambda g) = \int_I f + \lambda \int_I g, \quad (\text{linéarité de l'intégrale})$$

2. *la relation de Chasles est vérifiée pour tout point c de I , (relation de Chasles)*
3. *si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et si $f \leq g$ sur I , alors*

$$\int_I f \leq \int_I g, \quad (\text{croissance de l'intégrale}).$$

Remarque 1.15. On dit aussi que l'intégrale est *positive*⁵ : si $f \geq 0$ sur I , alors $\int_I f \geq 0$. Cette propriété est équivalente à la croissance de l'intégrale par linéarité.

Exemple 1.16. En admettant (voir Exemple 1.13) que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ converge, alors pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, l'intégrale $\int_0^{+\infty} P(t) e^{-t} dt$ converge comme combinaison linéaire d'intégrales convergentes.

Exemple 1.17. Si l'intégrale de f sur $[a, +\infty[$ converge et si $f \geq 0$ sur $[a, +\infty[$, alors la relation de Chasles et la positivité de l'intégrale montre que

$$\forall x \geq a, \quad \int_a^x f(t) dt \leq \int_a^{+\infty} f(t) dt.$$

Cette propriété est par ailleurs claire graphiquement, Figure 1.2.

Exemple 1.18. Si l'intégrale de f sur I converge, et si l'intégrale de g sur I diverge, alors l'intégrale de $f + g$ sur I diverge⁶. Sinon, par différence d'intégrales convergentes, l'intégrale de g sur I serait convergente.

5. On affinera cette propriété dans le cours sur les espaces préhilbertiens en démontrant que l'intégrale est même *définie positive*.

6. On retrouve une propriété usuelle des limites : "*convergent plus divergent égale divergent*"

En pratique, ces propriétés permettent de *calculer* avec des intégrales généralisées. Il faut leur ajouter deux outils d'usage constant : le théorème d'*intégration par parties* et le *théorème de changement de variable*.

1.3.2 Intégrations pas parties et changement de variable

Note 9 : Intégration par parties

Concernant l'intégration pas parties, il n'y a pas (en TSI) d'énoncé propre aux intégrales généralisées. Il faudra systématiquement :

1. revenir à une intégrale partielle,
2. effectuer une intégration par parties classique,
3. passer à la limite pour obtenir un résultat sur des intégrales généralisées.

Théorème 1.7 (Intégration par parties). *Soit u et v des fonctions de classe C^1 sur un segment $[a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$. Alors*

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx.$$

Avertissement 3

Toute écriture du type $[\dots]_a^{+\infty}$ est à proscrire.

Exemple 1.19. A l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale $I = \int_0^1 x \ln(x)dx$ converge⁷, et calculer sa valeur.

Soit $0 < \varepsilon < 1$. Les fonctions $x \mapsto \ln(x)$ et $x \mapsto x^2/2$ sont de classe C^1 sur $]\varepsilon, 1[$. Par intégration par parties, on a donc

$$\int_{\varepsilon}^1 x \ln(x)dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln(x) \right]_{\varepsilon}^1 - \int_{\varepsilon}^1 \frac{x}{2} dx. \quad (\star)$$

Le crochet tend vers 0 quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$ par *croissance comparée*. L'intégrale de droite tend vers $\int_0^1 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{4}$ quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$ (cette intégrale n'est pas généralisée). Donc l'intégrale $\int_0^1 x \ln(x)dx$ converge et, en passant à la limite dans l'égalité $(\star)$, on obtient

7. On pourrait également remarquer que cette intégrale est faussement généralisée en 0 (Exemple 1.10).

$$\int_0^1 x \ln(x) dx = -\frac{1}{4}.$$

On utilise souvent une intégration par parties pour établir une *relation* entre deux intégrales, par exemple une relation de récurrence.

Exemple 1.20. On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ converge (voir Exemple 1.13). A l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+1} = nI_n.$$

Soit $x \geq 0$ et $n \geq 0$. Les fonctions $t \mapsto t^{n+1}$ et $t \mapsto -e^{-t}$ sont de classe C^1 sur $[0, x]$. Par intégration par parties, on obtient

$$\int_0^x t^{n+1} e^{-t} dt = [-t^{n+1} e^{-t}]_0^x + (n+1) \int_0^x t^n e^{-t} dt.$$

Le crochet tends vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$ par croissance comparée. Les deux intégrales étant convergentes, on obtient en passant à la limite dans l'égalité précédente

$$I_{n+1} = nI_n.$$

Avertissement 4

Pour pouvoir *passer à la limite*, il faut d'*abord* s'assurer que toutes les quantités en jeu convergent.

Théorème 1.8 (Changement de variable). *Soit $\varphi : I \rightarrow J$ une bijection de classe C^1 entre deux intervalles I et J de $\mathbb{R}$. Soit $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors*

1. *les intégrales $\int_J f(x) dx$ et $\int_I f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt$ ont même nature,*
2. *elles sont égales en cas de convergence.*

Note 10

On dit qu'on a effectué le changement de variable $x = \varphi(t)$, pour lequel $dx = |\varphi'(t)| dt$.

Remarque 1.16. La présence de la valeur absolue dans le calcul du dx évite de préciser la *monotonie* du changement de variable φ ; les bornes des intégrales sont toujours rangées. Cette approche est à privilégier car c'est elle qui se généralise au cas des fonctions de plusieurs variables.

Selon les cas, on disposera de l'espace de *départ* de φ , de l'espace d'*arrivée*, ou des deux. De manière générale, l'inversion de φ n'est jamais nécessaire.

Exemple 1.21 (On connaît les espaces de départ et d'arrivée). On admet que l'intégrale

$$I = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} dt$$

converge. À l'aide du changement de variable $t = \frac{1}{1+s} = \varphi(s)$, montrer que

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{ds}{\sqrt{s(1+s)}}.$$

C'est le cas d'utilisation le plus courant ; un changement de variable est utilisé pour donner une autre expression d'une intégrale que l'on sait convergente. C'est le cas le plus simple car on connaît les espaces de départ et d'arrivée, aux extrémités près (Note 1).

Dans notre cas :

L'intégrale I est généralisée en 0 et en 1. La fonction φ est une bijection de classe C^1 de $]0, +\infty[$ dans $]0, 1[$. De plus

$$\forall s \in]0, +\infty[, \varphi'(s) = -\frac{1}{(1+s)^2}$$

et

$$\forall s \in]0, +\infty[, \frac{1}{\sqrt{\varphi(s)(1-\varphi(s))}} = \frac{1+s}{\sqrt{s}}$$

donc par changement de variable

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\varphi(s)(1-\varphi(s))}} |\varphi'(s)| ds = \int_0^{+\infty} \frac{ds}{\sqrt{s(1+s)}}.$$

Exemple 1.22 (On connaît l'espace d'arrivée). Déterminer la nature et la valeur de l'intégrale $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ à l'aide du changement de variable $x = \cos(t)$.

L'intégrale $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ est généralisée en -1 et en 1 . On connaît ici l'intervalle d'arrivée $J =]-1, 1[$ de la fonction $\varphi : t \mapsto \cos(t)$. C'est à nous de déterminer l'espace de départ de φ de telle sorte qu'elle soit bijective et de classe C^1 . Par exemple, $I =]0, \pi[$ convient.

La rédaction finale devient :

La fonction $\cos$ est une bijection de classe C^1 de $]0, \pi[$ dans $] -1, 1[$.

De plus,

$$\forall t \in]0, \pi[, \cos'(t) = -\sin(t)$$

et

$$\forall t \in]0, \pi[, \frac{1}{\sqrt{1-\cos(t)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\sin(t)^2}} = \frac{1}{|\sin(t)|}.$$

Par changement de variable, l'intégrale proposée a donc même nature que l'intégrale

$$\int_0^\pi \frac{|\sin(t)| dt}{\sqrt{1-\cos(t)^2}} = \int_0^\pi dt = \pi.$$

Notez que cette intégrale a lieu sur l'intervalle *ouvert* $]0, \pi[$: elle est clairement convergente car (doublement) faussement généralisée et sa valeur ne dépend pas de l'inclusion ou de l'exclusion de ses bornes (Proposition 1.2).

Donc l'intégrale $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ converge et vaut π .

Exemple 1.23 (On connaît l'espace de départ). A l'aide du changement de variable $x = \tan(t)$, calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+\sin(t)^2}$.

Cette intégrale n'est pas généralisée car l'intégrande est continue sur $[0, \pi/2]$. Elle est donc convergente.

On connaît l'espace de départ du changement de variable $x = \tan(t)$, au extrémités près. Il faut les choisir de telle sorte que celui-ci soit bijectif et de classe C^1 sur son image. En l'occurrence, bien que les extrémités 0 et $\pi/2$ soient incluses dans l'intégrale, on va choisir d'exclure $\pi/2$ (on utilise implicitement à nouveau la Proposition 1.2).

La rédaction devient :

La fonction $\tan$ est une bijection de classe C^1 de $[0, \pi/2[$ dans $[0, +\infty[$. De plus

$$\forall t \in [0, \pi/2[, \tan'(t) = 1 + \tan(t)^2 = \frac{1}{\cos(t)^2}.$$

Donc ⁸

$$\forall t \in [0, \pi/2[, \frac{1}{1 + \sin(t)^2} = \frac{1/\cos(t)^2}{1/\cos(t)^2 + \tan(t)^2} = \frac{|\tan'(t)|}{1 + 2\tan(t)^2}.$$

Par changement de variable,

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \sin(t)^2} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + 2x^2}.$$

Une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+2x^2}$ sur $[0, +\infty[$ est $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}x)$. Donc

$$\forall X \geq 0, \int_0^X \frac{dx}{1 + 2x^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\arctan(X) - 0) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

$$\text{Donc } \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \sin(t)^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

Astuce 6

Lorsque l'on effectue un changement de variable, il faut *donner un nom* au changement de variable et préciser avec soin les espaces de *départ* et d'*arrivée* pour vérifier les hypothèses du théorème de changement de variable.

8. A ce stade, on essaye d'écrire l'intégrande sous la forme $f(\varphi(t))|\varphi'(t)|$.

Exercices

1.3.1 Convergence d'une intégrale généralisée

Exercice 1.1. (Calculs de primitives). Déterminer la nature et préciser la valeur, en cas de convergence, des intégrales suivantes :

$$I = \int_0^{+\infty} t e^{-t^2} dt, \quad J = \int_0^{+\infty} \frac{1+t}{1+t^2} dt, \quad K = \int_e^{+\infty} \frac{dt}{t \ln(t)}.$$

Exercice 1.2. (Décomposition en éléments simples).

1. Déterminer trois réels a, b et c tels que

$$\forall t \geq 0, \quad \frac{t-1}{t^3+1} = \frac{at+b}{t^2-t+1} + \frac{c}{1+t}.$$

2. En déduire la convergence et la valeur de l'intégrale $I = \int_1^{+\infty} \frac{t-1}{t^3+1} dt$.

Exercice 1.3. (Un calcul d'intégrale). Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = \ln \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right).$$

1. Exprimer la dérivée de f sur $]0, +\infty[$.

2. En déduire la convergence puis la valeur de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x - e^{-x}}$.

Exercice 1.4 (*). (Nombres complexes). Calculer $\int_0^{+\infty} e^{-at} \cos(bt) dt$ pour $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$.

1.3.2 Les théorèmes de comparaison

Exercice 1.5. (Comparaison de fonctions positives). A l'aide du théorème de comparaison pour les fonctions positives, montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.

Exercice 1.6. (Théorèmes de comparaisons). Déterminer la nature des intégrales suivantes.

$$\begin{array}{ll} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \sin(t)}{t} dt & \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t)\sqrt{t}} \\ \int_0^1 \frac{\ln(t)}{1-t} dt & \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{t} - \ln \left(1 + \frac{1}{t} \right) \right) dt \\ \int_1^{+\infty} t^2 e^{-t} dt & \int_0^{+\infty} \frac{1-e^{-t}}{t} dt. \end{array}$$

Exercice 1.7. (Une intégrale de Bertrand). Montrer que l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$ converge.

Exercice 1.8. (Une fonction intégrable). Montrer que la fonction $x \mapsto e^{-x} \ln(x)$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Exercice 1.9. (Un calcul de transformée de Fourier). Soit $a > 0$.

1. Montrer que la fonction $f(x) = e^{-a|x|}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $t \in \mathbb{R}$. Montrer que la fonction $x \mapsto e^{-ixt} f(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ et calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ixt} f(x) dx$.

1.3.3 Calculer avec des intégrales convergentes

Exercice 1.10. (Intégrations par parties). A l'aide d'intégrations par parties, calculer les intégrales suivantes :

$$\int_0^1 t \ln(t) dt, \quad \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt, \quad \int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t^3} dt.$$

Exercice 1.11. (Fonctions paires). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose que f est paire. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ converge si et seulement si $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ converge et que, dans ce cas,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

Exercice 1.12. (Relations de récurrence). Pour $(n, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$, on pose

$$I_{n,k} = \int_0^1 x^n (\ln(x))^k dx.$$

1. Justifier que, pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$, l'intégrale $I_{n,k}$ est convergente.
2. Calculer $I_{n,0}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
3. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, I_{n,k} = -\frac{k}{n+1} I_{n,k-1}.$$

4. En déduire que $I_{n,k} = \frac{(-1)^k k!}{(n+1)^{k+1}}$.

Exercice 1.13. On admet que l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$ converge (voir Exercice 1.7). A l'aide du changement de variable $u = 1/t$, montrer que $I = 0$.

Exercice 1.14 (★). (Formules de l'arc moitié).

1. Pour $\theta \in [0, \pi[$, on pose $t = \tan(\theta/2)$. Montrer que

$$\sin(\theta) = \frac{2t}{1+t^2} \quad \text{et} \quad \cos(\theta) = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

2. Calculer l'intégrale $\int_0^\pi \frac{d\theta}{1+\sin(\theta)}$ à l'aide du changement de variable $t = \tan(\theta/2)$.

Exercice 1.15 (★). (Une expression de la fonction $\ln$). Pour $x > 0$, on pose

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-xt}}{t} dt.$$

1. Justifier que la fonction f est bien définie.
2. Pour $0 < a < b$, montrer que

$$\int_a^b \frac{e^{-t} - e^{-xt}}{t} dt = \int_a^{ax} \frac{e^{-t}}{t} dt - \int_b^{bx} \frac{e^{-t}}{t} dt.$$

3. En distinguant les cas $x \geq 1$ et $0 < x < 1$, montrer que pour tout réel $u > 0$, on a

$$e^{-xu} \ln(x) \leq \int_u^{xu} \frac{e^{-t}}{t} dt \leq e^{-u} \ln(x).$$

4. En déduire que pour tout $x > 0$, $f(x) = \ln(x)$.

1.3.4 Divers

Exercice 1.16 (★). (Intégrale de Dirichlet). On pose

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt.$$

1. A l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge.
2. En déduire que I converge.

3. En utilisant la minoration, que l'on montrera soigneusement,

$$\forall t \geq 0, |\sin(t)| \geq (\sin t)^2 = \frac{1 - \cos 2t}{2},$$

montrer que l'intégrale I n'est pas absolument convergente.

Exercice 1.17 (★). (Fonction Γ d'Euler). Pour $x > 0$, on pose

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

1. Montrer que la fonction Γ est bien définie.
2. Montrer que

$$\forall x > 0, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

3. Calculer $\Gamma(1)$ et en déduire la valeur de $\Gamma(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 1.18 (★). (Fonction β d'Euler). Soient x et y deux réels.

1. Montrer que l'intégrale

$$\beta(x, y) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt$$

existe si et seulement si x et y sont strictement positifs.

2. Soient x et y deux réels strictement positifs.

- a. Montrer que $\beta(x+1, y) = \frac{x}{x+y} \beta(x, y)$.

- b. À l'aide du changement de variable $x = \frac{1}{1+t}$, montrer que

$$\beta(x, y) = \int_0^1 (1-t)^{x-1} t^{y-1} dt.$$

et en déduire que $\beta(x, y) = \beta(y, x)$.

3. Soit a un réel strictement positif.

- a. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, déterminer la valeur de $\beta(n+1, a)$.

- b. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que l'intégrale

$$I_n(a) = \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{a-1} dt$$

est convergente, puis déterminer sa valeur.

2 Séries numériques

Introduction

Ce chapitre est le pendant *discret* du chapitre précédent : les intégrales deviennent des sommes, les dérivées des différences, et il n'est plus question de faire tendre n vers autre chose que $+\infty$. A ce sujet, Euler écrit dans ses *Institutiones Calculi differentialis* (1755) :

[...], en devenant infiniment petites, les différences finissent par être des différentielles. De même alors les quantités que l'on appelait des sommes prennent le nom d'intégrales.

L'architecture générale est très similaire : on définit la convergence d'une somme infinie (une *série*) via ses *sommes partielles*, on établit les propriétés de ces nouvelles sommes, on démontre des théorèmes de comparaison, et on donne des séries de référence.

L'absence de technique de calcul infinitésimal dans le cadre discret (on ne peut pas dériver ou primitiver une fonction définie sur $\mathbb{N}$) est compensé par des techniques d'*encadrement*.

La plupart des résultats disposent de leur analogue continue, ce qui facilite leur apprentissage. D'autres sont propres aux séries ; c'est notamment le cas du *critère de d'Alembert* et du *critère des séries alternées*, qui sont traités dans une section à part.

2.1 Convergence d'une série numérique

2.1.1 Définitions

Définition 2.1. Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite de $\mathbb{K}$. On appelle **série de terme général** u_n , $n \geq n_0$, et on note $\sum_{n \geq n_0} u_n$ la suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ des **sommes partielles** définies par

$$\forall n \geq n_0, \quad S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k.$$

On dit que la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ **converge** si la suite de ses sommes partielles $(S_n)_{n \geq n_0}$ admet une limite finie. On note alors

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n_0}^n u_k.$$

Le scalaire $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ s'appelle la **somme** de la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$.

Dans le cas contraire, on dit que la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ **diverge**. La convergence ou la divergence d'une série s'appelle sa **nature**.

Exemple 2.1. La série de terme général $(\frac{1}{2^n})_{n \geq 0}$ est convergente et sa somme vaut 1.

Soit $n \geq 1$. On a

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1 - 1/2^{n+1}}{1 - 1/2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} = 2.$$

Donc la série de terme général $(1/2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2$.

Exemple 2.2. La série de terme général $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

Pour $n \geq 0$, on a

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \rightarrow +\infty \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty.$$

Donc la série de terme général $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

Comme pour les intégrales, on dispose d'une relation de Chasle pour les séries numériques.

Proposition 2.1 (Relation de Chasles). *Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite de $\mathbb{K}$. Alors pour tout $m \geq n_0$, les séries $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq m} u_n$ ont même nature et, en cas de convergence, on a*

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=n_0}^m u_n + \sum_{n=m_0+1}^{+\infty} u_n.$$

i Note 11

On résume le résultat précédent en disant que *la nature d'une série ne dépend pas de ses premiers termes*. Ainsi, tant qu'on ne parle que la *nature* d'une série, on peut se contenter de la noter $\sum u_n$, sans préciser son point de départ.

Dans le cas des séries, il existe un lien simple entre le terme général et les sommes partielles, qui s'obtient par *telescoping*¹ :

$$\forall n > n_0, u_n = \sum_{k=n_0}^n - \sum_{k=n_0}^{n-1}.$$

Cette égalité mène la condition *nécessaire* de convergence suivante.

Proposition 2.2 (Une condition nécessaire de convergence). *Le terme général d'une série convergente tend nécessairement vers 0.*

⚠ Avertissement 5

La réciproque est fausse ; ce n'est pas parce que le terme général d'une série tend vers 0 que celle-ci converge.

On montrera par exemple que la série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ *diverge*, bien que $\frac{1}{n}$ tende vers 0.

Définition 2.2. On dit que qu'une série est *grossièrement divergente* si son terme général ne tend pas vers 0.

Exemple 2.3. La série $\sum n$ étudiée dans l'Exemple 2.2 est grossièrement divergente (le calcul explicite de ses sommes partielles n'est donc même pas nécessaire).

Sauf exception – essentiellement dans le cas des séries géométriques et des séries télescopiques – il n'est pas possible de calculer *explicitement* les sommes partielles d'une série (on ne dispose même de la notion de *primitive* utilisée en calcul intégrale). Il est donc tout aussi nécessaire de développer des théorèmes de comparaison pour les séries ; c'est l'objectif de la Section 2.2.

On peut néanmoins facilement *approximer* la somme d'une série convergente via ses sommes partielles qui, elles, sont calculables (au moins numériquement). La différence entre la somme totale et une somme partielle porte le nom de *reste*. Cette notion de sens que pour les séries convergentes.

1. On peut de même reconstruire l'intégrande par *dérivation* de l'intégrale partielle ; c'est l'analogue continue de ce résultat.

Définition 2.3. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série convergente, de somme S . Pour tout $n \geq n_0$, on appelle *reste d'ordre n* de la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ la quantité

$$R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k.$$




FIGURE 2.1 : Le reste d'une série convergente, définit par $S = S_n + R_n$.

Proposition 2.3. *Le reste d'une série convergente tend vers 0.*

Exemple 2.4. On a vu que la série $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n}$ était convergente. Pour tout $n \geq 0$, son reste d'ordre n est donné par

$$\begin{aligned} R_n &= 2 - \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \\ &= 2 - 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) \\ &= \frac{1}{2^n} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

i Note 12

Le reste R_n représente l'*erreur algébrique* (i.e. avec signe) commise en approximant S par S_n . Il est donc intéressant de *majorer* R_n , à défaut d'être capable de le calculer explicitement (les séries alternées sont remarquables sur ce point).

2.1.2 Calculer avec des séries convergentes

On s'intéresse maintenant aux propriétés qui permettent de *calculer* avec des séries convergentes. Comme pour les intégrales généralisées, ce sont les mêmes que celles de la somme usuelle, *sous réserve de convergence*.

Proposition 2.4 (Propriétés de la somme). *On suppose que les séries $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ convergent. Alors*

1. pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, la série $\sum (u_n + \lambda v_n)$ converge et

$$\sum_{k=n_0}^{+\infty} (u_k + \lambda v_k) = \sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k + \lambda \sum_{k=n_0}^{+\infty} v_k, \quad (\text{linéarité de la somme})$$

2. si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et si

$$\forall n \geq n_0, \quad u_n \leq v_n,$$

alors

$$\sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k \leq \sum_{k=n_0}^{+\infty} v_k, \quad (\text{croissance de la somme})$$

3. la relation de Chasles est satisfaite pour les séries convergentes.

2.1.3 Séries géométriques et séries télescopiques

Dans cette section, on étudie deux types de séries très importantes pour lesquelles on est capable de calculer explicitement les sommes partielles et la somme en cas de convergence.

Définition 2.4. On appelle *série géométrique* de raison $q \in \mathbb{K}$ la série de terme général q^n .

Exemple 2.5. La série $\sum \frac{1}{2^n}$ est une série géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Les séries exponentielles sont englobées dans les séries géométriques.

Exemple 2.6. Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, la série $\sum e^{-\alpha n}$ est une série géométrique de raison $e^{-\alpha}$.

Proposition 2.5. Soit $q \in \mathbb{K}$. Alors

1. si $q \neq 1$, on a

$$\forall n \geq 0, \quad \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q},$$

2. la série $\sum q^n$ converge ssi $|q| < 1$ et, dans ce cas,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1 - q}.$$

Remarque 2.1. Le cas $q = 1$ est simple ; la série est grossièrement divergente et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n q^k = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1.$$

 Astuce 7

On retrouve tous les autres résultats relatifs aux séries géométriques dont le premier terme n'est pas égal à $q^0 = 1$ en *mettant en facteur par le premier terme de la somme*.

Exemple 2.7. Si $q \neq 1$, on a

$$\forall n \geq 1, \quad \sum_{k=1}^n q^k = q \sum_{k=0}^{n-1} q^k = q \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Plus généralement, pour tout $n \geq m$, on a

$$\sum_{k=m}^n q^k = q^m \sum_{k=0}^{n-m} q^k = q^m \frac{1 - q^{n-m+1}}{1 - q}.$$

Cette technique permet aussi de calculer explicitement les restes des séries géométriques convergentes :

Exemple 2.8. Soit $q \in \mathbb{K}$ avec $|q| < 1$. Alors

$$\forall n \geq 0, \quad \sum_{k=n+1}^{+\infty} q^k = q^{n+1} \sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{q^{n+1}}{1 - q}.$$

Les deux exemples précédents ne sont pas à connaître par coeur, mais il faut être capable de les retrouver très rapidement.

Exemple 2.9. Nature de la série $\sum e^{-\alpha n}$ pour $\alpha \in \mathbb{R}$.

Il s'agit d'une série géométrique de raison $e^{-\alpha}$. Celle-ci converge ssi $|e^{-\alpha}| = e^{-\alpha} < 1$ i.e. $\alpha > 0$.

Dans ce cas, on a d'ailleurs

$$\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\alpha n} = \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}.$$

Les *séries telescopiques* sont un autre exemple – fréquent en pratique – de séries dont on sait calculer les sommes partielles.

Définition 2.5. Une **série telescopique** est une série de la forme $\sum (u_{n+1} - u_n)$, où (u_n) est une suite de $\mathbb{K}$.

Théorème 2.1. La série telescopique $\sum (u_{n+1} - u_n)$ converge ssi la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Remarque 2.2. Ce théorème est un nouvel outil pour étudier la convergence d'une suite : pour montrer qu'une *suite* converge, on pourra s'intéresser à la *série* de ses *différences*. C'est une approche souvent très fructueuse car on dispose de théorèmes efficaces pour montrer la convergence d'une série.

Exemple 2.10. Convergence et somme de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$.

On remarque que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est donc une série *telescopique*, qui converge car $\frac{1}{n+1}$ converge lorsque $n \rightarrow +\infty$. De plus, par telescopage,

$$\forall n \geq 1, \sum_{k=0}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{n+1} - 1 \rightarrow 1 \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty.$$

Donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$

i Note 13

On peut voir dans l'égalité

$$\sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_0$$

un cas particulier discret du théorème fondamentale de l'analyse qui affirme que si f est une fonction de classe C^1 sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a),$$

la différence $u_{n+1} - u_n$ jouant le rôle de la dérivée de f ; dans les deux cas, le calcul de la

somme partielle est immédiat !

On reverra ce type d'analogie en TD avec la transformation d'Abel, qui est aux sommes ce que l'intégration par parties est aux intégrales.

2.2 Séries à termes positifs

Dans cette section, on démontre le théorème de comparaison pour les séries à termes positifs. De même que dans le cas des intégrales, ce théorème permettra de démontrer la convergence d'une série sans avoir à calculer explicitement ses sommes partielles.

A noter une différence importante avec les intégrales généralisées ; la notion d'intégrabilité n'est pas au programme pour les suites. Il faudra donc systématiquement se ramener à des séries *positives* ou au moins *de signe constant* au voisinage de $+\infty$.

Comme pour les intégrales, le théorème de comparaison que nous allons démontrer repose sur le théorème de la limite monotone, via le Lemme 2.1.

Définition 2.6. On dit qu'une série est à **termes positifs** si son terme général est positif ou nul.

Lemme 2.1. Si la série $\sum u_n$ est à termes positifs, la suite de ses sommes partielles est croissante. La série $\sum u_n$ est donc convergente ssi ses sommes partielles sont majorées.

Théorème 2.2 (Comparaison des séries à termes positifs). Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. Alors

1. si $u_n \leq Av_n$ avec $A \geq 0$, et si la série $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge,
2. si $u_n = o(v_n)$ et si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge,
3. si $u_n \sim v_n$, alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont même nature.

Exemple 2.11. Nature de la série $\sum \frac{1}{2^{n+1}}$.

On a

$$\forall n \geq 0, 0 \leq \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n}.$$

De plus, la série $\sum \frac{1}{2^n}$ est une série géométrique convergente. Donc par comparaison de séries à termes positifs, la série $\sum \frac{1}{2^{n+1}}$ converge.

Remarque 2.3. Puisque la nature d'une série ne dépend pas de ses premiers termes, il suffit que les hypothèses du théorème soient satisfaites *pour n assez grand*.

Rappelons à cette occasion que les équivalents *préservent les signes*. Ainsi, si $u_n \sim v_n$ et si $u_n \geq 0$ pour n assez grand, alors v_n sera également positive ou nulle au voisinage de $+\infty$.

 Astuce 8

Dans le cas de la relation $\sim$, on peut remplacer l'hypothèse de positivité par l'hypothèse plus faible : u_n (ou v_n) est de *signe constant* au voisinage de $+\infty$.

Exemple 2.12. Nature de la série $\sum \ln \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$.

Puisque $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, on a

$$\ln \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) \sim \frac{1}{2^n} \geq 0.$$

De plus, la série $\sum \frac{1}{2^n}$ est une série géométrique convergente car $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$.

Donc par comparaison, la série $\sum \ln \frac{1}{2^n}$ converge.

 Avertissement 6

Le théorème de comparaison est faux si les séries ne sont pas à termes positifs (ou au moins de signe constant au voisinage de $+\infty$ pour la relation $\sim$). Des exemples seront vus en TD.

Pour pouvoir appliquer efficacement les théorèmes de comparaison, il faut un certain nombre de séries de référence. Les séries géométriques et télescopiques ne permettent pas de couvrir suffisamment de cas en pratique ; il faut pouvoir dire quelque chose de la nature des *séries de Riemann* de la forme $\sum \frac{1}{n^\alpha}$.

Contrairement au cas des intégrales, on ne peut pas calculer explicitement les sommes partielles de ces séries. On se ramène au cas des intégrales de via le résultat suivant.

Théorème 2.3. Si $f : [n_0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction positive, continue et décroissante, alors la série $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ et l'intégrale $\int_{n_0}^{+\infty} f(t)dt$ ont même nature.

Le coeur de la démonstration repose sur l'encadrement

$$\forall k \geq n_0 + 1, \int_k^{k+1} f(t)dt \leq f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t)dt,$$

ou, de manière équivalente,

$$\forall k \geq n_0, f(k) \leq \int_k^{k+1} f(t)dt \leq f(k+1).$$

Ces deux encadrements sont très clairs graphiquement (Figure 2.2).

Il faut être capable de les *redémontrer* rapidement en utilisant la *monotonie* de la fonction f , et de les adapter au cas d'une fonction *croissante*.

C'est une technique usuelle et très efficace pour étudier les restes des séries convergentes, ou les sommes partielles des séries divergentes. De nombreux exemples seront vus en TD.




FIGURE 2.2 : Les deux versions de l'encadrement fondamental utilisé dans les comparaison séries-intégrales.

Astuce 2.3

On retiendra l'idée générale suivante : une somme partielle ou un reste s'*encadre*.

Proposition 2.6 (Séries de Riemann). *Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$.*

Exemple 2.13. La série *harmonique* $\sum \frac{1}{n}$ diverge, mais la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

Comme pour le théorème de comparaison de fonctions positives, les théorèmes de comparaison

pour les séries à termes positifs restent incapables de traiter les séries à termes complexes, ou les séries dont le terme général n'est pas de signe constant au voisinage de $+\infty$.

Le remède est le même que pour les intégrales via la notion d'*absolue convergentes*.

Définition 2.7. On dit que la série $\sum u_n$ est **absolument convergente** si la série $\sum |u_n|$ converge.

Proposition 2.7. *Si une série est absolument convergente, elle est convergente.*

Ce résultat, combiné au théorème de comparaison de séries à termes positifs, permet de résoudre la plupart des cas rencontrés en pratique.

Exemple 2.14. Nature de la série $\sum \frac{\cos n}{n^2}$.

On a

$$\forall n \geq 1, \left| \frac{\cos n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

De plus, la série $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente. Donc par comparaison de séries à termes positifs, la série $\sum \frac{\cos n}{n^2}$ converge *absolument*, donc converge.

Remarque 2.4. Contrairement au cas des fonctions, on ne dispose pas en TSI de la notion de suite *intégrable*. La situation est donc comparativement plus simple ; on se ramènera systématiquement à la notion d'absolue convergence, avec *un seul* théorème de comparaison.

2.3 Autres résultats de convergence

Les deux résultats présentés dans cette section sont propres aux séries. Le premier sera surtout utilisé dans le chapitre sur les séries entières. Le second permet d'étudier les séries dont le signe du terme général *alterne*. Il est surtout intéressant pour l'encadrement explicite qu'il fournit de la somme à l'aide de ses sommes partielles d'indices pairs et impairs.

2.3.1 Le critère de d'Alembert

Le critère de d'Alembert s'applique aux séries $\sum u_n$ à termes *strictement* positifs. Si ce n'est pas le cas, on peut toujours envisager de l'appliquer à la série $\sum |u_n|$. Il est particulièrement adapté aux séries dont le terme général s'exprime à l'aide de *quotients*, de *produits*, et de *puissances*.

Théorème 2.4 (Critère de d'Alembert). *Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs. On suppose que le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ tend vers une limite finie $\lambda \geq 0$. Alors*

1. *si $\lambda > 1$, la série $\sum u_n$ diverge grossièrement,*
2. *si $0 \leq \lambda < 1$, la série $\sum u_n$ converge,*
3. *si $\lambda = 1$, le critère de d'Alembert ne permet pas de conclure.*

Exemple 2.15. Nature de la série $\sum \frac{n^n}{n!}$.

Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{n^n}{n!}$. On a alors $u_n > 0$ et

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{1}{n+1} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \end{aligned}$$

En passant sous forme exponentielle, on a par ailleurs

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e^{n \ln(1 + \frac{1}{n})} = e^{1+o(1)} \rightarrow e > 1.$$

Donc la série $\sum \frac{n^n}{n!}$ est grossièrement divergente.

2.3.2 Critère des séries alternées

Le critère des séries alternées permet d'étudier les séries dont le signe du terme général *alterne*, d'où son nom. En plus du résultat de *convergence*, il faut retenir l'*encadrement* de la somme par ses sommes partielles en cas de convergence.

Théorème 2.5 (Critère des séries alternées). *Soit (u_n) une suite réelle monotone de limite nulle. Alors la série $\sum (-1)^n u_n$ converge et sa somme S est encadrée par les sommes partielles d'indices pairs et impairs, qui forment deux suites adjacentes. En particulier, le reste R_n de la série $\sum (-1)^n u_n$ est du signe de son premier terme, et $|R_n| \leq |u_{n+1}|$.*

Exemple 2.16. Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1}$ converge et donner une approximation à 10^{-3} près de sa somme.

Le critère des séries alternées s'applique car $\frac{1}{n+1}$ tend vers 0 en décroissant. La série $\sum \frac{(-1)^n}{n+1}$ est donc convergente. De plus R_{999} est *positif* et

$$0 \leq R_{999} \leq \frac{1}{1000}.$$

Donc S_{999} est une approximation à 10^{-3} près par *défaut* de S .




FIGURE 2.3 : S_{999} est une approximation par *défaut* de S .

On obtient numériquement

$$S_{999} = 0.6926\dots$$

Donc une approximation ² à 10^{-3} près de S est 0,693 (on a arrondi par *excès* pour se rapprocher de S).

💡 Astuce 9

On retient le critère des séries alternées en se souvenant que :

1. la somme est encadrée par les sommes partielles paires et impaires,
2. toute l'information du reste (signe et taille) est donnée par son *premier terme*.

2. On calculera la valeur exacte de cette somme en TD.

Exercices

2.3.1 Convergence d'une série numérique

Exercice 2.1. (Une série grossièrement divergente). Montrer que la série $\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ est grossièrement divergente.

Exercice 2.2. (Série harmonique).

1. Soit $k \geq 2$. Montrer que

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t}.$$

2. En déduire que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln(n)$.
3. En déduire la nature de la série $\sum \frac{1}{n}$.

Exercice 2.3. (Noyau de Poisson). Soit $r \in]0, 1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} r^n e^{in\theta}$ converge et, déterminer la valeur de sa somme.
2. En déduire que la série de terme général $r^n \cos(n\theta)$ converge et, que l'on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} r^n \cos(n\theta) = \frac{1 - r \cos(\theta)}{1 - 2r \cos(\theta) + r^2}.$$

Exercice 2.4 (★). (Noyau de Dirichlet). Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$D_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx}.$$

1. Montrer que $D_n(x) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(kx)$.
2. Montrer que

$$D_n(x) = \begin{cases} \frac{\sin\left((n + \frac{1}{2})x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} & \text{si } x \notin 2\pi\mathbb{Z}, \\ 2n + 1 & \text{si } x \in 2\pi\mathbb{Z}. \end{cases}$$

3. Montrer que D_n est 2π -périodique et de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

2.3.2 Séries à termes positifs

Exercice 2.5. (Comparaison). Déterminer la nature des séries de terme général

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n+3}{2(n+1)(n^2-3)}, & b_n &= \sin\left(\frac{1}{n}\right) - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right), \\ c_n &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}, & d_n &= ne^{-n}, \\ e_n &= \frac{\ln(n)}{n^2}, & f_n &= \frac{(-1)^n}{2n^2+1}. \end{aligned}$$

Exercice 2.6. (Une comparaison série-intégrale). En utilisant le théorème de comparaison série/intégrale, déterminer la nature de la série $\sum_{n>1} \frac{1}{n \ln(n)^2}$.

Exercice 2.7. (Equivalent d'une somme partielle). Déterminer un équivalent de $\sum_{k=1}^n \sqrt{k}$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 2.8 (★). (Divergence de l'intégrale de Dirichlet).

1. Montrer que

$$\forall n \geq 2, \quad \int_{\pi}^{n\pi} \frac{|\sin(t)|}{t} dt \geq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k\pi} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin(t)| dt.$$

2. Montrer que

$$\forall k \geq 2, \quad \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin(t)| dt = 2.$$

3. En déduire que $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin(t)|}{t} dt$ diverge.

Exercice 2.9 (★). (Reste des séries de Riemann). Soit $\alpha > 1$.

1. Pour tout $k \geq 2$, montrer que

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^\alpha}.$$

2. En déduire un équivalent du reste $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ de la série $\sum \frac{1}{n^\alpha}$.

3. La série de terme général R_n est-elle convergente ? (On distinguera suivant les valeurs de α).

Exercice 2.10. (Développement asymptotique de la série harmonique). Pour $n \geq 1$, on pose

$$\Delta_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n).$$

1. Déterminer un équivalent de $\Delta_{n+1} - \Delta_n$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.
2. En déduire que la suite (Δ_n) converge vers une constante γ que l'on ne cherchera pas à déterminer³.
3. Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$.

2.3.3 Autres résultats de convergence

Exercice 2.11. (Critère de d'Alembert). Etudier la nature de la série $\sum = \frac{(1+i)^n}{n!}$.

Exercice 2.12. (Critère de d'Alembert). Discuter, selon la nature de a , de la nature de la série de terme général $u_n = \frac{n!}{n^{an}}$, $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 2.13. (Série harmonique alternée).

1. Justifier que la série $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ converge.
2. Montrer que pour tout $x \neq -1$ et $n \geq 1$ on a

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k x^k = \frac{1 - (-1)^n x^n}{1 + x}.$$

3. En déduire que $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \int_0^1 \frac{1 - (-1)^n x^n}{1 + x} dx$.
4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1 + x} dx \leq \frac{1}{n + 1}.$$

5. En déduire que $\int_0^1 \frac{x^n}{1 + x} dx$ tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$.
6. En déduire $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

Exercice 2.14 (★). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2 2^{2n}}.$$

1. Le critère de d'Alembert permet-il ici de conclure ?
2. Montrer que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

3. Il s'agit de la constante gamma d'Euler, qui vaut 0,5772...

3. Déterminer $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{(n+1)^\lambda u_{n+1}}{n^\lambda u_n} = 1 + \frac{1}{8n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
4. Montrer que la série $\sum \ln\left(\frac{(n+1)^\lambda u_{n+1}}{n^\lambda u_n}\right)$ converge.
5. En déduire que la suite $n^\lambda u_n$ converge vers une constante $C > 0$ et conclure quand à la nature de la série $\sum u_n$.

Exercice 2.15. (Une série alternée). Pour tout $n \geq 1$, on pose

$$u_n = \frac{(-1)^n}{(n!)^{1/n}} \quad \text{et} \quad a_n = \ln((n!)^{1/n}).$$

1. Montrer que $a_n \geq \frac{1}{n} \int_1^n \ln(x) dx$ et en déduire la limite de la suite (u_n) .
2. a. Soit $(x_n)_{n \geq 1}$ une suite croissante. Montrer que

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \leq \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} x_k$$

On pourra poser $m_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$.

- b. En déduire que la suite $(a_n)_{n \geq 1}$ est croissante.
3. En déduire la nature de la série $\sum u_n$.

Exercice 2.16. (Fonction *eta* de Dirichlet). Pour $x > 0$ on pose

$$\eta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}.$$

1. Montrer que la fonction η est bien définie.
2. Montrer que

$$\forall x > 0, \quad 1 - \frac{1}{2^x} \leq \eta(x) \leq 1$$

3. En déduire la limite de η en $+\infty$.

Exercice 2.17. (Un contre exemple).

1. Montrer que la série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge.
2. Montrer que $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.
3. Quelle est la nature de la série $\sum \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right)$?

2.3.4 Divers

Exercice 2.18 (★). (Cas d'ambiguïté dans le critère de d'Alembert). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2 2^{2n}}.$$

1. Le critère de d'Alembert permet-il ici de conclure ?
2. Montrer que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

3. Déterminer $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{(n+1)^\lambda u_{n+1}}{n^\lambda u_n} = 1 + \frac{1}{8n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.
4. Montrer que la série $\sum \ln\left(\frac{(n+1)^\lambda u_{n+1}}{n^\lambda u_n}\right)$ converge.
5. En déduire que la suite $n^\lambda u_n$ converge vers une constante $C > 0$ et conclure quant à la nature de la série $\sum u_n$.

Exercice 2.19 (★). (Un critère de convergence). Soient $0 < a < b$ deux réels. On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels strictement positifs tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+a}{n+b}.$$

1. a. Montrer que la série de terme général $\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ diverge.
b. En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.
2. On suppose que $b \leq a + 1$.
a. Montrer que $u_n \geq \frac{au_0}{n+a}$.
b. En déduire la nature de la série $\sum u_n$.
3. On suppose que $b > a + 1$.
a. Montrer que $(b-a-1) \sum_{k=0}^n u_k = (b-1)u_0 - (n+a)u_n$.
b. Montrer que la suite $((n+a)u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
c. En déduire la nature de la série $\sum u_n$ et calculer sa somme.
4. Étudier le cas $u_n = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n}(t) dt$.

Exercice 2.20 (★). (Transformation d'Abel). Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de $\mathbb{K}$. On pose

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = \sum_{k=0}^n a_k b_k, \quad B_n = \sum_{k=0}^n b_k.$$

1. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad S_n = a_n B_n - \sum_{k=0}^{n-1} B_k (a_{k+1} - a_k).$$

2. On suppose que $a_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, que (B_n) est bornée et que la série $\sum (a_{k+1} - a_k)$ est absolument convergente. Montrer alors que la série $\sum a_n b_n$ converge.

3. *Application* : montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin n}{n}$ converge.

3 Compléments d'algèbre linéaire

Dans tout ce chapitre, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et I désigne un ensemble quelconque d'*indices*.

Introduction

Un espace vectoriel est essentiellement un ensemble dans lequel on est capable d'additionner les éléments et de les multiplier par un scalaire, avec les mêmes règles de distributivité et de commutativité que la multiplication et l'addition usuelles.

La notion centrale de l'algèbre linéaire est donc celle de *combinaison linéaire*. C'est elle qui permet de définir les familles libres, les familles génératrices, les sous-espaces vectoriels, et les applications linéaires.

La notion de combinaison linéaire a été vue en première année dans le cas des familles *finies* de E ; on l'étend cette année au cas des familles quelconques.

3.1 Familles quelconques de vecteurs

Cette première section étend au cas des familles quelconques (finies ou infinies) les définitions vues en première année.

3.1.1 Combinaisons linéaires

Contrairement aux sommes infinies de l'analyse, les sommes rencontrées en algèbre linéaire seront *finies* (on ne dispose pas, à priori, de notion de convergence dans un espace vectoriel).

Pour pouvoir envisager une combinaison linéaire d'un nombre infini de vecteurs, on est amené à introduire la notion de famille à support *fini*.

Définition 3.1. Le **support** d'une famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ de $\mathbb{K}$ est l'ensemble des $i \in I$ pour lesquels λ_i est non nul. On dit que la famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ est à support **fini** si son support est un sous-ensemble *fini* de I .

Définition 3.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F} = (v_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de E . Une **combinaison linéaire** de $\mathcal{F}$ est une somme de la forme $\sum_{i \in I} \lambda_i v_i$ où $(\lambda_i)_{i \in I}$ est une famille à support *fini* d'éléments de $\mathbb{K}$, appelés **coefficients** de la combinaison linéaire.

Dans cas d'un ensemble *fini* I , les familles à support fini coïncident avec les familles, et on retrouve la définition vue en première année.

Exemple 3.1. Une combinaison linéaire d'une famille $v_1, \dots, v_n$ de E est une somme de la forme $\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$.

Lorsque I est infini, par exemple si $I = \mathbb{N}$, on se limite par contre à un nombre *fini* de vecteurs :

Exemple 3.2. Dans $E = \mathbb{K}[X]$, une combinaison linéaire de $\{X^k, k \in \mathbb{N}\}$ est un *polynôme* à coefficients dans $\mathbb{K}$.

3.1.2 Familles libres, génératrices

Définition 3.3. Une famille $\mathcal{F} = (v_i)_{i \in I}$ de E est **libre** si la seule combinaison linéaire nulle de $\mathcal{F}$ est la combinaison linéaire triviale i.e. pour toute famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ de $\mathbb{K}$ à support fini,

$$\sum_{i \in I} \lambda_i v_i = 0_E \Rightarrow \forall i \in I, \lambda_i = 0.$$

Exemple 3.3. La famille $\{X^k, k \in \mathbb{N}\}$ est une famille libre de $\mathbb{K}[X]$ car elle est *échelonnée en degré* (les polynômes qui composent cette famille ont des degrés *deux à deux distincts*).

Proposition 3.1. *Toute sous-famille d'une famille libre est libre.*

Définition 3.4. On dit qu'une famille $\mathcal{G}$ de E est **génératrice** ou qu'elle **engendre** E si tout élément de E est combinaison linéaire de $\mathcal{G}$.

Exemple 3.4. La famille $\{X^k, k \in \mathbb{N}\}$ est une famille génératrice de $E = \mathbb{K}[X]$.

3.1.3 Bases

Définition 3.5. Une famille $\mathcal{B}$ de E est une **base** de E si elle est à la fois libre et génératrice.

Exemple 3.5. La famille $\{X^k, k \in \mathbb{N}\}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$.

i Note 15 : Dimension d'un espace vectoriel

On rappelle qu'un espace vectoriel E est dit de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie. Dans ce cas toutes les bases de E possèdent le même nombre d'éléments, appelé **dimension** de E , et noté $\dim E$.

Proposition 3.2 (Caractérisation des bases en dimension finie). *Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{F}$ une famille de E . Alors*

1. *toute famille libre de E a au plus $\dim E$ éléments et une famille libre à $\dim E$ éléments est automatiquement une base,*
2. *toute famille génératrice de E a au moins $\dim E$ éléments, et une famille génératrice à $\dim E$ éléments est automatiquement une base de E .*

Proposition 3.3 (Bases canoniques). *Les bases suivantes, dites canoniques, sont à connaître :*

1. *la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est $\{E_{ij}, i, j \in \{1, \dots, n\}\}$ où E_{ij} est la matrice contenant uniquement des 0, sauf un 1 en position ij ,*
2. *la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$ est $(1, X, \dots, X^n)$,*
3. *la base canonique de $\mathbb{K}[X]$ est $\{X^k, k \in \mathbb{N}\}$.*

Remarque 3.1. Le premier cas englobe les cas $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^n$ (matrices lignes) et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ (matrices colonnes), souvent identifiés à tort.

3.2 Sous-espaces vectoriels

Pour nous, les sous espaces vectoriels seront surtout un outil pour comprendre et définir des applications linéaires, via les notions de *somme directe*.

On commence par quelques rappels de première année.

3.2.1 Sous espaces vectoriels

Proposition 3.4 (Caractérisation des sous espaces vectoriels). *Un sous-ensemble F de E est un sous espace vectoriel de E si F est non vide et si F est stable par combinaisons linéaires, c-à-d*

$$\forall u, v \in F, \forall \lambda \in \mathbb{K}, u + \lambda v \in F.$$

Remarque 3.2. On montre toujours que F est non vide en montrant que $0_E \in F$.

Définition 3.6 (Sous espace engendré par une partie). Soit $\mathcal{G}$ une partie non vide de E . On note $\text{Vect}(\mathcal{G})$ l'ensemble des combinaisons linéaires de $\mathcal{G}$. Alors $\text{Vect}(\mathcal{G})$ est un sous espace vectoriel de E , dit **engendré** par $\mathcal{G}$, et $\mathcal{G}$ est une famille génératrice de $\text{Vect}(\mathcal{G})$.

 Astuce 10

En pratique, on ne prend jamais la peine de rappeler que $\mathcal{G}$ est une famille génératrice de $\text{Vect}(\mathcal{G})$; c'est implicite dans cette notation. En particulier, si la famille $\mathcal{G}$ est libre, c'est automatiquement une base de F .

Exemple 3.6. La famille $\{1, X, \dots, X^n\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exemple 3.7. On a

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect}(I_2, J),$$

avec $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

3.2.2 Somme de sous espaces vectoriels

Les sous espaces vectoriels sont stables par intersection mais pas par réunion (considérer par exemple la réunion de deux droites dans le plan, qui n'est clairement pas stable par somme). En algèbre linéaire, la réunion est remplacée par la notion de *somme*.

Définition 3.7. Soient $F_1, \dots, F_n$ des sous espaces vectoriel de E . On appelle **somme** des sous espaces $F_1, \dots, F_n$ le sous ensemble

$$F = \{v_1 + \dots + v_n, v_i \in F_i, i = 1, \dots, n\}.$$

On la note $F_1 + \dots + F_n$ ou $\sum_{i=1}^n F_i$. Les sous espaces vectoriels $F_1, \dots, F_n$ s'appellent les *facteurs* de la somme.

Proposition 3.5. La somme $F_1 + \dots + F_n$ est un sous espace vectoriel de E .

Remarque 3.3. La somme $F_1 + \dots + F_n$ est le plus petit sous espace vectoriel de E (au sens de l'inclusion) contenant $F_1, \dots, F_n$.

Par définition, tout élément de $F_1 + \dots + F_n$ s'écrit comme somme d'éléments de $F_1, \dots, F_n$. Lorsque cette écriture est unique, on dit que la somme est *directe*.

Définition 3.8. On dit que la somme $F = F_1 + \dots + F_n$ est **directe** si tout élément de F s'écrit de manière unique comme somme d'éléments de $F_1, \dots, F_n$. On note alors $F = F_1 \oplus \dots \oplus F_n$.

Les sommes directes jouent le même rôle que les familles libres. En particulier :

Proposition 3.6 (Unicité de l'écriture de zéro). *La somme $F = F_1 + \dots + F_n$ est directe ssi l'écriture de 0_E dans la somme F est unique i.e.*

$$\forall v_1 \in F_1, \dots, v_n \in F_n, v_1 + \dots + v_n = 0_E \Rightarrow v_1 = \dots = v_n = 0_E.$$

Le cas particulier de deux facteurs est très fréquent (projecteur, symétrie,...). Il est aussi plus simple à traiter.

Proposition 3.7 (Cas de deux facteurs). *Soit F et G deux sous espaces vectoriels de E . Alors la somme $F + G$ est directe ssi $F \cap G = \{0_E\}$.*



Avertissement 7

Cette caractérisation est *fausse* pour trois facteurs ou plus (penser à 3 droites coplanaires).

Définition 3.9. Deux sous espaces vectoriels F et G de E sont **supplémentaires** dans E si $E = F \oplus G$.

Proposition 3.8 (Caractérisation des supplémentaires). *Soient F et G deux sous espaces vectoriels de E . Les propositions suivantes sont équivalentes :*

1. $E = F \oplus G$,
2. $F \cap G = \{0_E\}$ et $E = F + G$,
3. si E est de dimension finie, $F \cap G = \{0_E\}$ et $\dim E = \dim F + \dim G$.

3.2.3 Définir une application linéaire à l'aide d'une somme directe

On sait qu'une application linéaire est entièrement définie par l'image d'une *base*, résumée par une *matrice* en dimension finie.

De même, nous allons voir qu'une application linéaire est entièrement déterminée par ses *restrictions* aux facteurs d'une somme directe, résumées par une matrice *par blocs*.

Définition 3.10. Soit F un sous espace vectoriel de E et f une application linéaire de E dans E' . La **restriction** de f à F est l'application linéaire $f|_F : F \rightarrow E'$ définie par

$$\forall v \in F, f|_F(v) = f(v).$$

Note 18

Autrement dit, l'*action* de $f|_F$ est la même que f , mais l'espace de *départ* change. Or, changer l'espace de départ (ou d'arrivée) d'une fonction, c'est changer la fonction. Par exemple, réduire l'espace de départ (on dit *restreindre*) peut rendre une fonction injective. De même, réduire l'espace d'arrivée (on dit *corestreindre*) peut rendre une fonction surjective. Dès lors, il est légitime de distinguer f et $f|_F$.

Proposition 3.9 (Définition d'une application linéaire sur une somme directe). Soient E et E' deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On suppose que $E = \bigoplus_{i=1}^n F_i$. On se donne, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, une application linéaire $f_i : F_i \rightarrow E'$. Alors il existe une unique application linéaire f de E dans E' tel que $f|_{F_i} = f_i$.

Note 17

Il faut comprendre cette proposition de deux manières :

1. c'est un résultat d'*unicité* ; si deux applications linéaires f et g coïncident sur chaque facteur d'une somme directe (c.-à.d si $f|_{F_i} = g|_{F_i}$ pour tout i), alors $f = g$,
2. c'est un résultat d'*existence* : pour *définir* une application linéaire de E dans E' , il suffit de la définir sur chaque facteur de la somme directe (ce qui est en général plus simple que de la définir partout).

Définition 3.11 (Base adaptée). Si $E = \bigoplus_{i=1}^n F_i$ et si $\mathcal{B}_i$ est une base de F_i pour $i = 1, \dots, n$, alors la famille $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n)$ obtenue en mettant bout à bout les bases $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n$ est une base de E , dite **adaptée** à la somme directe $E = \bigoplus_{i=1}^n F_i$.

La notion de base adaptée mène à l'écriture des matrices d'applications linéaires par *blocs*, ce que nous expliquons maintenant.

Définition 3.12 (Matrices par blocs). Une matrice est dite écrite par **blocs** si elle est divisée en sous matrices figurées à l'aide de lignes horizontales et/ou verticales :

Exemple 3.8. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 5 \\ 4 & 5 & 5 \end{pmatrix}$$

peut s'écrire par blocs

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

avec $A_{11} = (1)$, $A_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \end{pmatrix}$, $A_{21} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $A_{22} = 5I_2$.

Proposition 3.10 (Multiplication des matrices par blocs). *Si la taille des blocs est compatible, on peut multiplier les matrices par blocs comme on multiplie les matrices scalaires.*

Exemple 3.9. Si $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$, et si la taille des blocs est compatible, alors

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}.$$

Si $E = \bigoplus_{i=1}^n F_i$ et si $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n)$ est une base adaptée à cette somme directe, la matrice d'un endomorphisme f de E s'écrit naturellement par blocs :

Proposition 3.11. *Soit $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n)$ une base adaptée à la somme directe $E = \bigoplus_{i=1}^n F_i$, alors la matrice de $f \in \mathcal{L}(E)$ dans la base $\mathcal{B}$ s'écrit par blocs*

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) =$$

3.2.4 Sous espaces stables par un endomorphisme

Définition 3.13 (Sous espace stable par un endomorphisme). Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous espace vectoriel de E . On dit que F est **stable** par f si

$$\forall v \in F, f(v) \in F.$$

Exemple 3.10. Le sous espace $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par dérivation.

Exemple 3.11. L'axe d'une rotation r de $\mathbb{R}^3$ est stable par r .

Exemple 3.12. Le plan d'une réflexion s de $\mathbb{R}^3$ est stable par s .

Définition 3.14 (Endomorphisme induit par restriction). Si F est un sous espace vectoriel de E stable par un endomorphisme f de E , alors la restriction de f à F définit un endomorphisme de F . On l'appelle l'endomorphisme **induit par restriction** de f à F .

Exemple 3.13. Puisque $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par dérivation, on peut restreindre la dérivation à $\mathbb{R}_n[X]$. On obtient ainsi un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par $P \mapsto P'$.

Note 18

Restreindre un endomorphisme peut présenter plusieurs avantages, notamment :

1. l'espace F peut être de dimension *finie*,
2. l'endomorphisme $f|_F$ peut-être plus simple que l'endomorphisme f .

Lorsque l'on cherche à montrer qu'un sous espace est stable par un endomorphisme, on peut avantageusement utiliser une famille *génératrice* (notamment, une *base*) de F :

Proposition 3.12 (Caractérisation de la stabilité à l'aide d'une famille génératrice). *Soit F un sous espace vectoriel de E et $f \in \mathcal{L}(E)$. Soit $\mathcal{G}$ une famille génératrice de F . Alors F est stable par f si*

$$\forall v \in \mathcal{G}, f(v) \in F.$$

Visuellement, la stabilité d'un sous espace par un endomorphisme se traduit sur sa matrice dans une base adaptée par des blocs de 0. On l'illustre dans le cas d'une somme directe à *deux* facteurs.

Proposition 3.13. *On suppose que $E = F \oplus G$. Soit $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G)$ une base adaptée à cette somme directe et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors F est stable par f ssi la matrice par blocs de f dans la base $\mathcal{B}$ est de la forme*

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix},$$

et dans ce cas, $A_{11} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_F}(f|_F)$.

Remarque 3.4. On a un résultat analogue pour la stabilité de G par f .

3.3 Projecteurs et symétries

On applique les résultats de la section précédente à la définition des projecteurs et des symétries. Ce sont des endomorphismes de référence qui interviennent dans de nombreux domaines.

3.3.1 Projecteurs

Définition 3.15. On suppose que $E = F \oplus G$. On appelle projecteur sur F parallèlement à G l'endomorphisme p de E défini par $p|_F = \text{Id}$ et $p|_G = 0$.

i Note 19

Concrètement, si $v = v_F + v_G$ est la décomposition de v dans la somme directe $E = F \oplus G$, alors

$$p(v) = p(v_F) + p(v_G) = v_F$$

On dit que v_F est la *composante suivant F* de v .




FIGURE 3.1

 Astuce 11

Si $E = F \oplus G$ et si on note p et q les projecteurs sur F parallèlement à G et inversement, alors $p + q = \text{Id}$; connaître un des deux projecteurs, c'est donc connaître les deux.

Concrètement, pour calculer la projection d'un vecteur v sur F parallèlement à G , on détermine la composante v_F de v dans la somme directe $E = F \oplus G$. On utilise pour cela la caractérisation suivante :

Proposition 3.14. *On suppose que $E = F \oplus G$ et on note p le projecteur sur F parallèlement à G . Alors pour tout $v \in E$, le projeté $p(v) = u$ de v sur F parallèlement à G est caractérisé par*

$$\begin{cases} u \in F, \\ v - u \in G. \end{cases}$$

Exemple 3.14. Dans $\mathbb{R}^3$, déterminer la projection du vecteur $v = (1, 1, 1)$ sur le plan P d'équation $x + 2y + z = 0$, parallèlement à la droite engendrée par le vecteur $u = (1, 1, -1)$.

 Astuce 12

Suivant les cas (notamment si la dimension de G est inférieure à celle de F), il peut être plus simple de calculer v_G et d'utiliser la relation $v_F = v - v_G$.

Exemple 3.15. Dans l'exemple précédent, on a été amené à résoudre un système 2×2 car on a projeté sur un plan. Il est plus simple de projeter sur la droite D et d'utiliser la relation rappelée dans le Tip 12 :

3.4 Matrices

Exercices

3.4.1 Familles quelconques de vecteurs

Exercice 3.1. (Famille échelonnée en degré). Montrer que la famille $H_k(X)$, $k \in \{0, \dots, n\}$, définie par $H_0(X) = 1$ et

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, H_k(X) = X(X-1) \cdots (X-k)$$

est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 3.2. (Liberté d'une famille de polynômes). Montrer que les polynômes $P = X(X-2)$, $Q = X(X-1)$ et $R = (X-1)(X-2)$ forment une famille libre de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 3.3 (*). (Un exemple de famille libre infinie). Montrer que la famille $\{f_\alpha : x \mapsto e^{kx}, k \in \mathbb{N}\}$ est une famille libre de l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On pourra remarquer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{kx} = (e^x)^k$.

3.4.2 Sous espaces vectoriels

Exercice 3.4. (Espace de matrices à paramètres). Montrer que l'ensemble $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & c & b \\ c & a+b & c \\ b & c & a \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et en donner une base.

Exercice 3.5. (Caractérisation des sous espaces vectoriels). Montrer que l'ensemble des fonctions continues $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s'annulant en 0 forment un sous-espace vectoriel de $C^0(\mathbb{R})$.

Exercice 3.6 (*). (Fonctions à croissance sous linéaire).

Soit $E = C^0(\mathbb{R})$ et

$$F = \{f \in E, \exists M \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq M(1 + |x|)\}.$$

Montrer que F est un sous espace vectoriel de E .

Exercice 3.7. (Deux sous espaces supplémentaires de $\mathbb{R}^3$). On pose $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + 2y - z = 0\}$ et $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = y = 2z\}$.

1. Montrer que P et D sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$ et déterminer une base $\mathcal{B}$ adaptée à cette décomposition.

2. Montrer que l'endomorphisme f dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

laisse stable P et D , puis déterminer $f|_P$ et $f|_D$.

3. Donner la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$. On écrira cette matrice par blocs.

Exercice 3.8 (★). (Une somme directe en dimension infinie).

- Montrer que l'ensemble $H = \{P \in \mathbb{R}[X], \int_0^1 P(x)dx = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ et que $\mathbb{R}[X] = H \oplus \mathbb{R}$.
- On note D l'endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$ défini par

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], D(P) = P'.$$

- L'endomorphisme D est-il injectif?
- Montrer que $D|_H$ est injectif.

Exercice 3.9 (★). (Somme directe des fonctions paires et impaires). On note $\mathcal{P}$ (resp. $\mathcal{I}$) l'ensemble des fonctions continues paires (resp. impaires) de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{I}$ sont deux sous espaces vectoriels supplémentaires dans $C^0(\mathbb{R})$.

Exercice 3.10. (Sous espaces stables).

- Montrer que l'application $\varphi : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$ définie par

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \varphi(P) = (X^2 - 1)P'' + 2XP'$$

est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, le sous-espace vectoriel $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par φ .

On note φ_n l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ induit par restriction de φ .

- Donner la matrice de φ_2 dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

Exercice 3.11. (Matrice par blocs). On pose $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $T = D + N$.

1. En utilisant des produits par blocs, montrer que N et D commutent et calculer D^n pour tout $n \geq 1$.
2. Calculer N^2 et en déduire T^n pour tout $n \geq 1$.

Exercice 3.12 (★). (Un résultat général de stabilité). Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $\text{Im}(f)$ et $\ker(f)$ sont stables par f .

3.4.3 Projecteurs et symétries

Exercice 3.13. (Matrices d'un projecteur et d'une symétrie de $\mathbb{R}^3$).

1. Déterminer la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ du projecteur p sur P parallèlement à D , où P et D sont les des espaces définis dans l'Exercice 3.7.
2. Même question avec la symétrie s par rapport à P parallèlement à D .

Exercice 3.14. (Un projecteur de $\mathbb{R}^2$).

1. Montrer que l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice $A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ est un projecteur.
2. Déterminer son image et son noyau.

Exercice 3.15. (Inversibilité des projecteurs et des symétries). Un projecteur est-il inversible ? Même question pour une symétrie.

Exercice 3.16 (★). Soit p un projecteur de E et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que p et u commutent ssi $\text{Im}(p)$ et $\ker(p)$ sont stables par u .

Exercice 3.17 (★). (Une symétrie de $\mathbb{R}_2[X]$). Montrer que

$$\mathbb{R}_2[X] = \mathbb{R} \oplus \text{Vect}((X-1)^2, X-1)$$

et déterminer le symétrique du polynôme $P = X^2 + 3X + 1$ par rapport à $\text{Vect}((X-1)^2, X-1)$ parallèlement à $\mathbb{R}$.

3.4.4 Matrices

Exercice 3.18. (Invariant de similitude). Les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ et

$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ sont-elles semblables ?

Exercice 3.19. (Trace et transposée). Montrer que, pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $\text{Tr}(A^T B) = \text{Tr}(AB^T)$.

Exercice 3.20. (Un exemple de matrices symétriques). Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Montrer que $AA^T \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 3.21. (Composantes symétrique et anti-symétrique). Donner la décomposition de $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Exercice 3.22. (Produit de matrices lignes et colonnes). Calculer les produits

$$(1 \quad -1 \quad 2) \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} (1 \quad -1 \quad 2).$$

Exercice 3.23 (★). (Matrices de rang 1). Soit $U, V \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ deux matrices colonnes non nulles. Montrer que la matrice UV^T est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1. Réciproquement, montrer que toute matrice carrée de taille n de rang 1 est de cette forme.

Exercice 3.24 (★). (Rang d'un projecteur). Soit p un projecteur d'un espace vectoriel E de dimension finie. Montrer que $\text{rg}(p) = \text{Tr}(p)$.

Exercice 3.25 (★). (Dual de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$). Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit l'application $\varphi_A : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ par

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \varphi_A(M) = \text{Tr}(AM).$$

On note E_{ij} , $i, j = 1, \dots, n$, la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Pour $i, j \in \{1, \dots, n\}$, calculer AE_{ij} .
2. En déduire que si

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \operatorname{Tr}(AM) = 0,$$

alors $A = 0$.

3. En déduire que l'application $A \mapsto \varphi_A$ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$.

3.4.5 Divers

Exercice 3.26 (★). (Une symétrie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$). On considère l'application $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \varphi(M) = M - \frac{2}{n} \operatorname{Tr}(M) I_n.$$

1. Montrer que φ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On note $H = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \operatorname{Tr}(M) = 0\}$.

1. Montrer que H est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et préciser sa dimension.
2. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = H \oplus \operatorname{Vect}(I_n)$.
3. Montrer que H est stable par φ et préciser $\varphi|_H$.
4. Préciser la matrice de φ dans une base adaptée à la décomposition en somme directe $H \oplus \operatorname{Vect}(I_n)$.
5. Reconnaître l'application φ .

Exercice 3.27 (★). (Polynômes d'interpolation de Lagrange). Soit $x_1, \dots, x_n$, $n \geq 1$, des réels deux à deux distincts et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que l'application $\varphi : \mathbb{R}_{n-1}[X] \rightarrow \mathbb{R}^n$ définie par

$$\forall P \in \mathbb{R}_{n-1}[X], \quad \varphi(P) = (P(x_1), \dots, P(x_n)).$$

est un isomorphisme.

2. En déduire qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad P(x_i) = \lambda_i.$$

Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on pose

$$L_{x_i}(X) = \frac{(X - x_1) \dots (\widehat{X - x_i}) \dots (X - x_n)}{(x_i - x_1) \dots (\widehat{x_i - x_i}) \dots (x_i - x_n)}$$

où le symbole $\widehat{}$ signifie que le terme correspondant est omis. Les polynômes $(L_{x_i})_{1 \leq i \leq n}$ sont appelés *polynômes d'interpolation de Lagrange aux points $x_1, \dots, x_n$* .

1. Vérifier que :

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, L_{x_i}(x_j) = \delta_{ij}$$

où δ_{ij} désigne le symbole de Kronecker, défini par $\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

2. Montrer que la famille $(L_{x_1}, \dots, L_{x_n})$ est une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
3. Montrer que $P = \sum_{i=1}^n \lambda_i L_{x_i}$
4. *Application* : Déterminer l'unique polynôme P de $\mathbb{R}_2[X]$ tel que $P(0) = -1$, $P(1) = \frac{1}{3}$ et $P(2) = 4$.

Programmes de colle

Les liens font référence aux sections des différents chapitres.

Programme 01 - du 14/09 au 18/09

Section [1.1](#)

Section [1.2](#)

Les étudiants devront connaître les développements limités des fonctions usuelles à l'ordre 2.

Les exercices impliquant des intégrations par parties et des changements de variable sont à réserver à la semaine prochaine.

Programme 02 - du 21/09 au 26/09

Section [1.3](#)

Le programme est centré sur l'intégration par parties et le théorème de changement de variable.

Programme 03 - du 28/09 au 02/10

Section [2.1](#)

Section [2.2](#)

Le critère de d'Alembert et le critère des séries alternées ne sont pas au programme cette semaine.

DM

DM 01 - Intégrales généralisées

DM 02 - Séries numériques