CABO; N = 10

pd = 95.9%; % rope = 0.4
pd = 53.9%; % rope = 1.1

CARDC; N = 22

pd = 99%; % rope = 0
pd = 100%; % rope = 0

CARDO; N = 33

pd = 90%; % rope = 1.9
pd = 77.5%; % rope = 1.8

DOM; N = 29

pd = 59.9%; % rope = 3.5
pd = 93.4%; % rope = 0.9

EVDW; N = 53

pd = 93.1%; % rope = 3.1
pd = 88.5%; % rope = 3.2

EVPC; N = 63

pd = 77.4%; % rope = 2.2
pd = 92.7%; % rope = 0.7

EVTA; N = 71

pd = 85.4%; % rope = 2.2
pd = 63.5%; % rope = 2.5

GAMAS; N = 36

pd = 70.9%; % rope = 2.5
pd = 74.3%; % rope = 1.3

GUASCA; N = 6

pd = 92.2%; % rope = 0.2
pd = 97.8%; % rope = 0

IBEL; N = 9

pd = 69.5%; % rope = 1.6
pd = 90.1%; % rope = 0.5

JAPI; N = 17

pd = 84.8%; % rope = 1.5
pd = 76.6%; % rope = 1.1

JUR; N = 20

pd = 95.2%; % rope = 0.3
pd = 99.8%; % rope = 0

KAW; N = 25

pd = 98.7%; % rope = 0
pd = 98.7%; % rope = 0

KOH; N = 35

pd = 54.1%; % rope = 6
pd = 96.9%; % rope = 0.5

MAC; N = 109

pd = 54.5%; % rope = 6.1
pd = 74.8%; % rope = 2.1

MRC; N = 10

pd = 55.2%; % rope = 0.8
pd = 86.5%; % rope = 0.2

NOUR; N = 31

pd = 57.3%; % rope = 1
pd = 93.3%; % rope = 0.4

PICIN; N = 11

pd = 56.3%; % rope = 0.6
pd = 79.3%; % rope = 0.3

PTL; N = 105

pd = 89.7%; % rope = 0.8
pd = 100%; % rope = 0

RRB; N = 21

pd = 55.4%; % rope = 6.2
pd = 73.6%; % rope = 1.9

SADR; N = 8

pd = 51.6%; % rope = 0.6
pd = 89.4%; % rope = 0.2

SALM; N = 9

pd = 92.1%; % rope = 0.9
pd = 99.2%; % rope = 0

SAMC; N = 10

pd = 69.9%; % rope = 0.8
pd = 61.1%; % rope = 1.2

SASC; N = 9

pd = 74%; % rope = 1.4
pd = 87.5%; % rope = 0.6

SAUT; N = 107

pd = 73.2%; % rope = 17.5
pd = 92.5%; % rope = 2.7

SINN; N = 38

pd = 93.5%; % rope = 1.6
pd = 99.8%; % rope = 0

SISGA; N = 37

pd = 55.7%; % rope = 1.3
pd = 74.6%; % rope = 0.8

SONHI; N = 55

pd = 81.6%; % rope = 3.8
pd = 60.9%; % rope = 2.8

SONLOW; N = 43

pd = 90.5%; % rope = 1.8
pd = 92.8%; % rope = 0.5

Energy flow to predators (log J.y^{-1})

Proportion of overall functional hull covered by food web