

NOM - Prénom - Classe :

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS TSTMG sur les variables aléatoires discrètes

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On considère le jeu suivant :


- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

--




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

[illegible]




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$


On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.


Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed by a thin black border. There are no markings, text, or illustrations present.




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS TSTMG sur les variables aléatoires discrètes

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$


On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



DS TSTMG sur les variables aléatoires discrètes

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Question 1

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On considère le jeu suivant :


- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

--




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.


Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB






Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :


Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

On considère le jeu suivant :

- On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.


Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB






Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :


Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.


Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

[illegible]




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :


Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

On considère le jeu suivant :

- On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :


Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

On considère le jeu suivant :

- On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB




Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



NOM - Prénom - Classe :


Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1 , on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5 , on perd 6 €.

1. Quelle sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 2 On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB