

DONNA IN GRAVIDANZA

Posticipare tutte le procedure elettive successivamente al parto
(Se dovesse essere necessario, il 2° trimestre è il periodo con meno rischi)

Le rx endorali devono essere evitate in particolare nel primo trimestre

L'utilizzo dei farmaci deve essere limitato allo stretto necessario, ma se necessaria la somministrazione, è importante prestare attenzione al rischio:

ANTIBIOTICI

Amoxicillina
Azitromicina
Clindamicina
Cefalexina
Claritromicina
Tetraciclina

ANALGESICI




Paracetamolo
Ibuprofene
Derivati della codeina
FANS
Aspirina

SEDATIVI

Protossido di azoto
Benzodiazepine

ANESTETICI

Lidocaina con o senza adrenalina 1:100.000
Prilocaina con o senza adrenalina 1:100.000
Mepivacaina 2% con adrenalina
Articaina

-  Sicuro negli animali, nessun dato nell'uomo / rischioso negli animali, sicuro nell'uomo
-  Rischioso negli animali, nessun dato per l'uomo / nessun dato per gli animali e l'uomo
-  Rischioso nell'uomo / teratogeno

DONNA IN ALLATTAMENTO

Il problema in queste pazienti è legato al passaggio dei farmaci dalla madre al bambino attraverso il latte materno

- Evitare la terapia farmacologica se possibile
- I farmaci considerati sicuri per il neonato sono generalmente sicuri per la madre che allatta
- Scegliere farmaci con emivita breve
- Scegliere farmaci ampiamente studiati nei neonati
- Scegliere farmaci con il più basso livello di assorbimento orale
- Scegliere farmaci con la più bassa solubilità lipidica
- Somministrare i farmaci monodose, subito prima del periodo più lungo di sonno del neonato, di solito dopo la poppata della sera prima di dormire**
- Se necessario somministrare più dosi quotidiane, allattare il bambino subito prima della somministrazione del farmaco**

ANTIBIOTICI

Amoxicillina
Azitromicina
Claritromicina
Cefalexina
Clindamicina
Tetracicline

ANALGESICI




Paracetamolo
Celecoxib
Codeina
Ossicodone
FANS
Tramadolo
Aspirina

SEDATIVI

Protossido di azoto
Benzodiazepine

ANESTETICI

Lidocaina con o senza adrenalina 1:100.000
Prilocaina con o senza adrenalina 1:100.000
Mepivacaina 2% con adrenalina
Articaina

-  Approvato dall' American Academy of Pediatrics per le donne in allattamento
-  Da usare con cautela su indicazione dell'American Academy of Pediatrics
-  Non approvato dall'American Academy of Pediatrics per le donne in allattamento