

论文本身的内容

基本信息

- 英文标题: Learned helplessness and learned controllability: from neurobiology to cognitive, emotional and behavioral neurosciences
- 中文标题: 《习得性无助与习得性可控: 从神经生物学到认知、情绪与行为神经科学》
- 作者: Gustavo E. Tafet, Tomas Ortiz Alonso
- 期刊: Frontiers in Psychiatry
- 类型: Review
- 年份: 2025
- 本地 PDF: [learned_helplessness_and_learned_controllability_review_2025.pdf](#)

研究背景

这篇综述的背景是压力、抑郁、创伤和恢复力研究。

作者一开始指出:

- stress 是生活中的常态
- 长期、持续的环境压力会引发不同的心理和生理反应
- 压力与 depression、anxiety 等精神障碍关系密切

但在所有压力研究里, 一个真正关键的问题是:

为什么同样是压力, 有的人会越来越被动、越来越无助, 而有的人却能够维持应对能力, 甚至形成恢复力?

这就把问题引到了 **control** 上。

作者认为, 压力本身不是唯一关键, 真正重要的是:

- 个体是否觉得自己对结果有控制
- 个体是否能从经验里学到“我的行动有效”

这也是为什么论文把 “learned helplessness” 和 “learned controllability” 放在一起讨论。

问题 (Challenge)

这篇综述试图回答的核心 challenge 是:

不可控失败为什么会让个体逐渐形成一种稳定的、持续的被动状态?

这个问题之所以难, 是因为:

1. 外部压力本身不足以解释后果

同样一个负面事件, 对不同个体可能产生不同后果。

有人会觉得:

- 这次只是运气不好
- 换种办法可能就行

也有人会觉得：

- 我不行
- 我努力也没用
- 结果和我无关

所以 challenge 的关键不在于“事件发生了什么”，而在于“事件被怎么解释”。

2. 人类的 helplessness 不能完全按动物模型理解

早期 learned helplessness 主要来自动物实验。

最经典的实验是：动物反复接受无法逃避的刺激，比如 unavoidable shocks，后来即使已经有机会逃脱，也不再尝试。

但把这个模型直接搬到人类身上并不够，因为人类有：

- attribution (归因)
- cognition (认知加工)
- self-related belief (关于自己的信念)
- context sensitivity (情境敏感性)

也就是说，人类不仅“经历压力”，还会解释压力。

3. 如果 helplessness 是可以学习出来的，那么 controllability 是否也能学习出来？

这是这篇综述一个很重要的推进。

它不只问“为什么会无助”，还问：

既然 helplessness 是 learned 的，controllability 能不能也是 learned 的？

如果答案是可以，那么恢复力就不只是性格问题，而可能是一种可以训练的能力。

finding

这篇综述最核心的 finding 是：

learned helplessness 和 learned controllability 是两种相反但都可以通过学习形成的过程。

更具体地说，可以拆成四个 finding。

finding 1: helplessness 的关键不是压力，而是不可控

论文明确指出：

- prolonged exposure to uncontrollable stressors may lead to learned helplessness
- critical factor is lack of control
- in learned helplessness an organism learns that outcomes are independent of their actions

也就是说，决定 helplessness 的，不是压力有没有发生，而是个体是否从经历中学到了：

- 我的行动不会改变结果

这就是这篇最根本的 insight。

finding 2: 在人类中, helplessness 是“主观不可控 + 动机下降”的学习结果

作者强调, 在 humans 中, learned helplessness 不只是一个“行为上不动了”的状态, 还包括:

- 主观感到缺乏控制
- 逐渐减少 exert effort 的意愿
- coping motivation 下降

也就是说, 人的 helplessness 是一种:

- 认知性的无效感
- 情绪性的被动化
- 行为上的回避和不再尝试

finding 3: controllability 同样可以通过学习形成

这篇特别重要的贡献就是提出:

- just as helplessness may result from a learning process
- controllability may also be trained and learned

这意味着, 个体如果反复体验到:

- 我做出的行动能带来结果
- 我可以通过 goal-directed behavior 改变局面

那么就会逐渐形成 learned controllability。

finding 4: 过去的 controllable experience 可以形成 immunization

作者总结了一个很重要的现象:

- 过去的 controllable experience
- 可以降低后来进入 helplessness 的风险

论文把这个称为:

- immunization

也就是说, 早期的可控经验不是“当时舒服一点”而已, 而是会为未来的压力建立保护。

方法

这篇论文不是新实验, 而是一篇叙述性综述。

作者说明自己采用的是:

- targeted narrative approach

也就是说, 它不是严格系统综述 protocol, 而是围绕中心问题去整合不同文献。

作者检索了:

- PubMed

- Scopus
- Web of Science

整合的证据主要包括：

1. 动物实验文献

解释 learned helplessness 最经典的起源：

- 不可逃避刺激
- 后续被动与不再尝试

2. 人类认知与归因文献

解释：

- 为什么人类的 helplessness 还涉及 attribution
- 为什么不同人对同样失败的解释不同

3. 神经生物学文献

解释 learned helplessness 和 learned controllability 相关的脑区与通路：

- DRN
- MRN
- amygdala
- VM-PFC
- DL-PFC
- ventral hippocampus
- nucleus accumbens

4. 治疗与干预文献

讨论：

- SSRIs
- cognitive therapy
- TMS
- VR

如何帮助恢复 perceived control。

结论

1. learned helplessness 是什么

作者在结论里明确说：

- prolonged and sustained exposure to uncontrollable stressors may lead to learned helplessness
- an organism learns that outcomes are independent of their actions
- in humans this includes a learned decrease in motivation to exert effort

所以 learned helplessness 的核心不是“我很难受”，而是：

- 我学到了努力无效
- 所以后来不想再努力

2. learned controllability 是什么

作者认为，control 不只是一个外部条件，而是一种可以通过学习形成的内部状态。

当个体反复体验到：

- 我的行动能改变结果
- goal-directed action 是有效的

就会形成 learned controllability。

它会带来：

- 更好的 coping
- 更高 resilience
- 更低 anxiety
- 更好的 decision-making

3. helplessness 和 controllability 背后是两种不同的神经调节模式

作者总结：

learned helplessness 更相关：

- increased DRN activity
- hyperactive amygdala
- reduced VMPFC activation
- HPA axis alterations

learned controllability 更相关：

- increased DL-PFC / VM-PFC activation
- decreased amygdala / DRN activation
- increased MRN and reward-related circuitry activation

用更通俗的话说：

- helplessness 更像“威胁系统占上风、控制系统失灵”
- controllability 更像“前额叶能压住威胁反应，目标导向系统重新接管”

4. controllability experience 具有长期保护作用

作者强调：

- previous experiences of control can reduce susceptibility to helplessness

这说明：

- 可控成功不是一时效果
- 它会改变未来面对压力时的基础状态

5. 干预重点不是只减少压力，而是恢复 agency

作者最后给出的干预方向非常清楚：

- restore perceived control
- reinforce action-outcome contingencies
- promote skill acquisition
- improve problem-solving
- strengthen goal-directed behavior

也就是说，真正重要的不是简单减少负面事件，而是让个体重新体验到：

- 我做的是有用的
- 我并不是完全无能为力

必要的关键术语和概念

learned helplessness (习得性无助)：个体在反复不可控失败后，学到“我的行动和结果没有关系”，从而动机下降、回避增加。

例子：老人多次线上办事失败后，即使后来有机会成功，也不愿再试。

learned controllability (习得性可控)：个体通过反复经验学到“我的行动可以改变结果”，从而更愿意主动应对。

例子：老人多次在数字任务中体验到“我点这个、结果就推进”，以后更愿意继续尝试。

perceived control (感知控制)：个体主观上觉得自己对局面的控制程度。

例子：两个老人都遇到系统报错，一个觉得“还能换办法”，一个觉得“完全没办法”，后者更接近 helplessness。

contingency (行动-结果关联)：行动和结果之间是否存在真正的因果关联。

例子：如果按按钮后系统真的进入下一步，contingency 高；如果无论怎么做都报错，contingency 低。

instrumental learning (工具性学习)：通过行动和反馈学习什么行为有效。

例子：老人学到“按照提示一步步做，真的能完成缴费”。

goal-directed behavior (目标导向行为)：基于对结果的预期而采取的、有目的的行动。

例子：为了成功预约，老人主动寻找下一步按钮并修正策略。

immunization (免疫化)：过去的可控经验降低未来陷入 helplessness 的风险。

例子：如果老人之前在类似系统里有成功控制经验，未来再遇到复杂页面时不那么容易立即放弃。

我的阅读判断

这篇综述最重要的价值，不是提供某个具体参数，而是把 helplessness 的“理论对象”定义清楚了：

你们要研究的不是“困难本身”，而是“个体是否学到了努力无效”。

同时，这篇也给了你们另一个非常重要的方向：

不要只研究无助怎么累积，也要研究 controllability 怎么恢复。

这使它非常适合成为你们 **helplessness update** 和未来 **recovery / support** 机制设计的总理论框架。