Título do artigo

Letícia Zimback, Adriana Martini, Paulo I Prado

November 13, 2021

Table 1: Mixed-effect models for the spatial seed limation. For each model is shown standarzide coefficients and standard error (brackets).

	8	16	7	24	32	6	Average
Adult Frequency	−0.410	−0.303		−0.445	−0.334	−0.618	−0.407
	(0.226)	(0.231)		(0.224)	(0.227)	(0.218)	(0.249)
Adult height	−0.478	−0.542	−0.659	−0.467	−0.536		−0.531
	(0.231)	(0.227)	(0.217)	(0.226)	(0.221)		(0.238)
Log seed mass	1.018	1.024	0.975	1.003	1.009	1.029	1.010
	(0.205)	(0.197)	(0.214)	(0.201)	(0.192)	(0.220)	(0.208)
Frequency:Height		−0.320			−0.335		−0.326
		(0.234)			(0.228)		(0.235)
Frequency:Mass				0.257	0.268		0.262
				(0.224)	(0.214)		(0.223)
SD (Intercept)	1.022	0.979	1.085	1.002	0.952	1.113	
SD (Observations)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
AIC	489.1	489.3	490.2	489.8	489.8	491.0	