

中华人民共和国农业农村部公报

ZHONGHUARENMINHONGHEGUONONGYENONGCUNBUGONGBAO

2025年第6期(总第261期)

目录

意见通知		中华人民共和国 农业农村部 办公厅主办
农业农村部 公安部 中国海警局关于开展2025年海洋伏季休渔 专项执法行动的通知	6	主 编 刘明国 副 主 编 王一民 徐 刚
农业农村部 科技部 教育部 工业和信息化部 财政部 水利部 中国科学院印发《关于加快提升农业科技创新体系 整体效能的实施意见》的通知	8	公 报 室 主 任 易 勇 副 主 任 吴 欣
农业农村部 最高人民法院 最高人民检察院 工业和信息化部 公安部 市场监管总局 供销合作总社关于印发《2025年全国 农资打假和监管工作要点》的通知	13	责 任 编 辑 周圆圆
农业农村部关于印发“中国渔政亮剑2024”执法典型案例 的通知	16	
农业农村部办公厅关于印发《养殖业节粮行动实施方案》 的通知	20	



本刊微信公众号

农业农村部办公厅关于公布2025年渔业绿色循环发展项目		
立项名单的通知		25
农业农村部办公厅关于公布2025年国家级沿海渔港经济区		
项目名单的通知		27
农业农村部办公厅关于做好2025年高素质农民培育工作		
的通知		28
农业农村部办公厅关于征集2025年全国新型农业经营主体		
率先提单产及完善农业经营体系典型案例的通知		31
 公告通报		
中华人民共和国农业农村部公告	第885号	33
中华人民共和国农业农村部公告	第886号	35
中华人民共和国农业农村部公告	第887号	49
中华人民共和国农业农村部公告	第889号	50
中华人民共和国农业农村部公告	第890号	51
中华人民共和国农业农村部公告	第891号	57
中华人民共和国农业农村部公告	第892号	59

中华人民共和国农业农村部公告	第893号	91	
中华人民共和国农业农村部公告	第894号	92	
中华人民共和国农业农村部公告	第895号	92	
中华人民共和国农业农村部公告	第896号	93	
			编辑 农业农村部公报室
			出版 北京市朝阳区
			地址 农展馆南里11号
			邮编 100125
			电话 010-59192335
			010-68259537
			传真 010-65001869
			电邮 nybgb@sina.com
			刊号 <u>ISSN2096—7969</u>
			CN10—1641/D
			印刷 鸿博昊天科技有限公司
			出版日期 2025年6月20日

GAZETTE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS OF THE PEOPLE’ S REPUBLIC OF CHINA

NO.06,2025 (VOL.261) CONTENTS

Guidelines and Circulars

Joint circular of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, the Ministry of Public Security and the China Coast Guard on launching law enforcement campaign of summer marine moratorium for 2025	/6
Joint circular of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Education, the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Finance, the Ministry of Water Resources and the Chinese Academy of Sciences on printing and distributing guidelines on improving overall performance of agricultural S&T innovation system	/8
Joint circular of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, the Supreme People’ s Court, the Supreme People’ s Procuratorate, the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Public Security, the State Administration of Market Regulation and the All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives on printing and distributing key tasks of cracking down on counterfeit agricultural inputs and enhancing regulation for 2025	/13
Circular of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on printing and distributing representative cases of law enforcement campaign of “China Fisheries Administration Liangjian 2024”	/16
Circular of the General Office of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on printing and distributing arrangements of implementing grain-saving campaign in livestock sectors	/20
Circular of the General Office of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on releasing list of approved green circular development programs of fisheries for 2025	/25
Circular of the General Office of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on releasing list of national-level coastal fishing port economic zones for 2025	/27
Circular of the General Office of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on making greater efforts in developing well-qualified farmers for 2025	/28

Circular of the General Office of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on calling for nation-wide representative cases of new types of agricultural business entities with outstanding unit yield and improved agricultural operation system /31

Announcements and Notifications

Announcement No. 885 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /33

Announcement No. 886 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /35

Announcement No. 887 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /49

Announcement No. 889 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /50

Announcement No. 890 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /51

Announcement No. 891 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /57

Announcement No. 892 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /59

Announcement No. 893 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /91

Announcement No. 894 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /92

Announcement No. 895 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /92

Announcement No. 896 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China /93

农业农村部 公安部 中国海警局关于开展 2025年海洋伏季休渔专项执法行动的通知

农渔发〔2025〕9号

沿海各省、自治区、直辖市农业农村、渔业厅（局、委）、公安厅（局），中国海警局各海区分局、直属局，沿海省、自治区、直辖市海警局，农业农村部渔政保障中心：

为保护海洋渔业资源和生态环境，维护海洋伏季休渔秩序，农业农村部、公安部、中国海警局决定自2025年5月1日至9月16日开展海洋伏季休渔专项执法行动（以下简称“专项行动”）。有关事项通知如下。

一、重点任务

（一）严查渔港码头。全面掌握渔港码头情况，实施依港管船管人，以县（市、区）为单位建立应休渔船名册，做到底数清、情况明、动态准。严格执行渔船船籍港休渔、定人联船、定期点验、进出港报告等制度，切实做到“船回港、人上岸、网入库”。确需异地休渔的渔船，由船籍港所在地渔业渔政主管部门主动对接靠泊港，建立完善船籍港和靠泊港共管机制，做到异地停靠渔船监管责任清晰、措施到位，不留“法外之地”。

（二）严抓海上执法。合理部署执法力量，把日常巡查、交叉检查、突击抽查、区域联查有机融合，构建全时段、全海域、全链条渔业执法体系，切实做到管控无漏洞，打击无盲区。利用中国渔政管理指挥系统，及时发现跟踪违规作业渔船动态。加大海上登临检查力度，对巡航发现的涉渔船舶，第一时间核实渔船信息；对海上查获的涉渔违法违规船舶，一律扣押回港处理；面对恶劣海况等不具备海上执法条件的情况，要注重采集涉渔船舶特征、AIS（自动识别系统）等信息，及时将线索移交有关部门核处。

（三）严管专项捕捞。按照农业农村部关于2025年伏季休渔期间专项捕捞许可和捕捞辅助船配套服务安排的通告要求，加强专项捕捞监管。加强专项捕捞渔船船位动态监控、渔获物定点上岸、捕捞限额、渔政船伴航执法等制度落实，强化全时管控、全域覆盖、全环节监管。加强对桁杆拖虾、笼壶类、刺网和灯光围（敷）网等4种作业类型（方式）渔船专项捕捞监管，严厉打击无证作业、违反捕捞许可证核定的时限、区域作业等违法违规行为。加强对海洋渔业资源调查等科研活动的海上检查，监督其执行进出港报告等相关管理制度，确保渔获物妥善处置，防止流入市场，一旦发现违法违规行为应依法依规处罚，并及时通报有关单位。

（四）严控重点海域。加强对长江口禁捕水域和机动渔船底拖网禁渔区线附近海域等违法行为高发、举报线索集中海域管控，利用渔船船位动态监控系统、小目标雷达等设备，精准布控、高效打击。根据开渔时间先后，加强对北纬26度30分线和北纬35度线等重点区域的执法监管，严查越线作业以及规模性、群体性非法捕捞活动。加强对涉韩朝、涉日等涉外敏感海域巡逻管控，严防我渔船非法越界（线）捕捞。加强北部湾我方一侧、海南岛周边等外籍渔船侵渔高发海域巡航执法，综合运用行政和司法等手段，依法严厉打击外籍渔船侵渔活动，坚定维护国家海洋权益。

（五）严防重点对象。聚焦异地休渔渔船、捕捞辅助船、生态环境（渔业资源）监测调查船等重点涉

渔船舶,加强对违法违规行为易发多发对象的监管。加强对养殖渔船、钓具渔船、休闲渔船等不休渔渔船的监管,防范其改变用途从事非法捕捞活动。利用休渔期适时组织封港清船行动,持续推进清理取缔涉渔“三无”船舶,依法依规对其没收拆解。加大涉渔大马力快艇打击力度,坚决遏制快艇非法捕捞、盗采养殖水产品、靠泊卸载非法渔获物等行为。持续打击整治违规渔具渔法捕捞,严查使用禁用渔具以及多层囊网、加装衬网等网目尺寸严重不合格渔具作业行为。联合相关部门严查市场、网络销售禁用渔具、电鱼工具等行为。

(六)严惩涉渔犯罪。加强基础信息摸排和情报搜集,定期组织会商,研判伏季休渔形势,及时发现涉渔犯罪线索,集中力量查办非法捕捞大案要案。落实《中华人民共和国反有组织犯罪法》,按照扫黑除恶常态化部署安排,深挖渔业领域特别是组织使用涉渔“三无”船舶和禁用渔具渔法非法捕捞、非法越境(界)、海洋捕捞划界圈海、“强买强卖”等涉黑涉恶线索。对涉嫌组织化、团伙化的案件,按照“破现案、挖源头、断链条、打外围”相结合原则,实现全链条打击整治;对发现的“海霸”“渔霸”及非法捕捞的幕后组织者、黑中介等从严惩处;对渔民个人情节轻微的非非法捕捞行为,以教育引导为主、打击整治为辅,实行宽严相济的刑事司法政策。

二、工作要点

(一)5月1日至5月10日,全面部署执法船艇开展海上巡查,全面清查管辖海域渔船情况。

(二)8月5日至9月16日,开展对北纬35度至北纬26度30分之间海域桁杆拖虾、笼壶类、刺网和灯光围(敷)网等四种作业类型渔船专项监管。

(三)8月16日至9月16日,开展北纬26度30分附近海域集中管控行动。

(四)9月1日至9月16日,开展北纬35度附近海域集中管控行动。

(五)其余时间段,落实常态化管控要求,做好港内巡查和渔船船位动态监测。根据海上态势适时组织开展集中管控行动,严打大规模偷捕、涉外敏感海域非法捕捞和外籍渔船侵渔活动。

三、有关要求

(一)提高政治站位。各级渔业渔政、公安、海警部门要提高政治站位,深化思想认识,根据本通知要求,结合职责任务和辖区工作实际,按时有序推进各项工作,确保海洋伏季休渔制度执行到位。农业农村部、公安部、中国海警局将以适当方式对专项行动中工作突出的单位和工作人员给予表扬;对工作落实不到位、案件查办不力、发生涉外事件或安全事故的,将予以通报批评;对造成严重后果的,将严肃追责问责。

(二)深化执法协作。各级渔业渔政、公安、海警部门要深化海上综合治理,建立健全执法协作配合机制,发挥伏季休渔执法监管整体合力。按照依法严厉打击海洋渔业违法犯罪有关文件要求,用好渔政海警执法协作、省际渔政执法共管协作等机制,共同打击伏季休渔期间各类涉渔违法犯罪行为。农业农村部渔政保障中心和中国海警局各分局要协调指导海区渔政、海警机构开展专项行动,在重点时段、重要区域组织开展跨省、跨海区、跨部门联合管控,推动构建信息联通、执法联动、问题联处的良好工作格局。

(三)强化社会监督。发挥渔政执法举报受理平台(010—59191110)、110报警平台和95110海上报警平台以及各类情报员、信息员作用,充分调动社会力量监督,及时受理群众举报和报警。发挥科研院所、高等院校等第三方机构作用,收集伏休政策落实、海上执法监管、渔业资源监测等方面的社情民意。通过中央和地方主流媒体网站、官方公众号、短视频等方式开展执法宣传,发布典型案例和指导案例,强化警示教育。视情况邀请媒体记者参加相关执法行动,加强对执法全过程的监督和宣传。

农业农村部、公安部和中国海警局将根据需要组成联合工作组赴重点地区开展集中调研,对重大疑难案件加大指导力度。各地要在海洋伏季休渔专项执法行动结束一周内,及时总结梳理经验和做法,分析问题和不足,提出对策和建议,并逐级归口上报。

联系人及联系方式:

农业农村部渔业渔政管理局 张宇 010-59192927

公安部治安管理局 祁聪 010-66269372

中国海警局执法部 张吉喆 010-67418180

农业农村部 公安部 中国海警局

2025年4月28日

**农业农村部 科技部 教育部 工业和信息化部
财政部 水利部 中国科学院印发
《关于加快提升农业科技创新体系
整体效能的实施意见》的通知**

农科技发〔2025〕3号

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村(农牧)、畜牧兽医、渔业厅(局、委)、科技厅(委、局)、教育厅(教委)、工业和信息化主管部门、财政厅(局)、水利(水务)厅(局),新疆生产建设兵团农业农村局、科技局、教育局、工业和信息化局、财政局、水利局,中国科学院有关单位:

为深入贯彻落实党中央、国务院关于科技创新的重大决策部署,进一步全面深化农业科技体制改革,发挥新型举国体制优势,加快实现高水平农业科技自立自强,为农业强国建设提供强有力的支撑,现将《关于加快提升农业科技创新体系整体效能的实施意见》印发给你们,请结合实际认真落实。

农业农村部 科技部 教育部 工业和信息化部

财政部 水利部 中国科学院

2025年4月17日

关于加快提升农业科技创新体系整体效能的实施意见

农业现代化，关键是农业科技现代化。为加快提升农业科技创新体系整体效能，切实以高水平农业科技自立自强支撑农业强国建设，制定如下意见。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及全国科技大会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持“四个面向”，切实把科技创新摆在农业现代化建设突出重要位置，进一步全面深化农业科技体制改革，发挥新型举国体制优势，强化企业科技创新主体地位，培育壮大农业科技领军企业，加强创新资源统筹和力量组织，优化科技组织模式和创新范式，改善创新生态和科研环境，提升农业科技系统化组织水平和体系化攻关能力，构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系，加快实现高水平农业科技自立自强。

加快提升农业科技创新体系整体效能，必须坚持进一步全面深化改革，切实解决好各自为战、低水平重复、转化率不高等突出问题，激发创新活力。坚持农业科技公共性基础性社会性定位，推动有为政府和有效市场更好结合。坚持产业需求导向，推动农业科技创新与产业创新融合发展。坚持守正创新，尊重农业科技创新特点和规律创造性统筹谋划推进。坚持人才引领发展，充分发挥农业科技人员积极性。

到2035年，建成运转高效的农业科技创新体系，农业科技创新和产业创新深度融合，涌现一批创新能力和综合实力全球领先的农业科技领军企业，形成一批有国际影响力的国家农业战略科

技力量和战略人才力量，农业基础研究和原始创新能力显著增强，重点领域关键核心技术自主可控，农业科技创新整体水平居于世界前列，实现高水平农业科技自立自强，为农业强国建设提供强有力的支撑。

二、强化相关科研院所、高校科技创新核心使命

（一）中央级科研院所要聚焦服务国家重大需求。主攻全局性、战略性、前瞻性农业重大科技问题。发挥表率作用，强优势、补短板、填空白，切实完善机构、人才和学科专业布局，加快建设世界一流学科和一流科研院所。试点探索企业化管理等更灵活的制度。聚焦重大战略急需，发挥好崖州湾实验室的作用。

（二）地方科研院所要着力支撑区域发展。主攻区域性、特色性产业科技问题。注重统筹推进，优化调整省域科研院所创新力量。加强省级农科院优势特色学科建设，支持有能力的地方科研院所参与国家重大科技任务。加强省级农科院对地市级农科院所的统筹指导，推进紧密协作、一体发展。强化地市级农科院所集成创新、试验示范等核心职责，支持其与同级农技推广机构融合发展。

（三）高校要强化为农服务使命。以立德树人为根本，以强农兴农为己任，大力培养知农爱农新型人才，加快提升农业科技创新能力。加强新农科建设，夯实农业院校涉农专业主体地位，强化涉农专业内涵建设，加强生物育种、耕地保护、设施装备、乡村规划建设等急需学科专业布局，围绕大农业观、大食物观布局新兴涉农学科专业。支持高校与院所、企业共建专业学位研究

生培养基地或授权点。支持高校有组织开展基础前沿研究和关键核心技术创新,提高成果转化水平。

三、加快培育壮大农业科技领军企业

(四)提升企业自主创新能力。落实研发费用加计扣除等优惠政策,推行后补助、政府采购合作创新等支持机制,推进企业设立研发准备金。鼓励金融机构加大对科技创新相关领域的信贷等支持力度。指导金融机构完善支持企业科技创新的融资服务模式。支持企业建设国家级、省部级等创新平台。增设企业博士后工作站。

(五)加强企业主导的产学研深度融合。鼓励企业出资、联合科研院校共同开展产业技术研发。支持企业牵头或科研院校会同企业建立新型研发机构、创新联盟、创新联合体。引导科研院校的科研人员依规到企业担任“科技副总”。促进企业、科研院校的技术研发、中试验证等平台双向开放。鼓励企业与科研院校合作在海内外共建研发中心。

(六)保障企业科技创新主体地位。建立农业企业创新能力动态监测机制,加强对接服务,着力培育一批龙头型和高速成长型农业科技领军企业。提高企业在科技规划制定、科技政策决策和科技计划实施等方面的参与度。市场化程度高的技术研发类科技计划项目原则上由企业牵头承担。

四、优化农业科技创新组织机制

(七)完善农业科技创新布局。着力保障粮食和重要农产品稳定安全供给,系统部署品种培育、耕地质量、农机装备、病虫害防控、种植养殖、绿色低碳、农产品加工、农产品质量安全、乡村发展等科技任务。加强农业基础前沿研究,推

进新一代生物技术、信息技术等在农业领域融合创新,开辟新领域新赛道。

(八)健全科技任务来源机制。完善面向产业征集科技需求的选题方式,注重行业、企业、地方等联合“出题”,科学凝练命题。加强战略研究与技术预测,注重前瞻性引领性布局。实施一批部省联动项目。支持非共识项目研究。

(九)优化科技任务组织实施。组织好科研院所、高校、企业等优势力量,提升协同创新水平。加快农业关键核心技术攻关,集中力量攻克瓶颈制约。组织实施好农业生物育种国家科技重大专项,培育重大突破性品种。系统推进国家重点研发计划重点专项,着力解决农业重大科技问题。建强现代农业产业技术体系,强化国家级与省级体系衔接互动。加强场景驱动的系统集成、中试验证和迭代升级。试点推行长周期科技项目。

(十)面向用户和市场开展评价反馈。完善适合农业特点的科技项目分类评价机制,实施“答题”闭环管理。针对技术研发类项目,突出推广应用实效、市场占有率等产业评价标准,引入品种审定、农机鉴定等第三方机构全程参与项目实施,及时纠正偏差。

五、建强农业科技人才队伍

(十一)造就高水平农业科技创新人才。创设更加积极开放有效的人才政策,加大农业战略科学家、科技领军人才和青年科技人才等梯次培养力度。注重在农业科技创新一线发现用好战略科学家和后备人选。每年支持一批神农领军人才和神农青年英才。明确比例要求,支持青年人才担纲重大科技项目、创新平台等负责人。

(十二)培育农业专业技术技能人才。加强科研院校负责同志、科技管理人员能力素质培训。鼓励更多地方实施“定向招生、定向培养、定向就业”的农科大学生教育政策。扩大农业职业教育规模,支持开展本科层次职业教育。强化新型农

业经营主体带头人教育培训。

(十三) 创新农业科技人才评价激励机制。坚持产业导向, 结合岗位职责, 科学设定农业科技人才考核周期。鼓励科研院校在职称评审、晋职晋级等方面, 对从事科技创新、成果转化、科技管理、科研辅助的人员进行分类评价。落实科研人员离岗创办企业、兼职创新等政策, 推动打通高校、科研院所和企业人才交流通道。强化以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系, 把绩效考核与薪酬分配更好结合起来。

六、提升农业科技条件支撑能力

(十四) 加强重点实验室建设。聚焦农业领域科技创新重点方向, 建设完善全国重点实验室, 发挥其农业科技创新骨干作用。优化省部级农业重点实验室布局。新建若干农业领域国家技术创新中心。

(十五) 提升农业科研设施水平。建设高水平育种生境模拟装备等一批农业重大科研设施。加强农业科研机构试验基地建设, 加密布局育种测试网络。推进建设高通量种质资源表型鉴定装备。结合生态区划和产业需求, 建设现代农业科技试验示范基地, 推进现有生产技术的集成创新和熟化验证。推进大型仪器设备共享。

(十六) 筑实基础性支撑性科技平台。加强国家级和部级野外科学观测研究站能力建设, 深入挖掘利用科学数据资源。加强农业科学数据中心和种质资源库(圃、场)建设, 新建国家淡水渔业生物种质资源库, 完善农业微生物种质资源库。统筹推进高等级生物安全实验室建设。

七、加快农业科技成果转化

(十七) 创新科技成果集成转移转化机制。推进职务科技成果资产单列, 深化职务科技成果赋

权改革, 鼓励运用股权激励、赋权入股等多种方式实施收益分享。将技术推广、高质量专利、成果转化等业绩成果作为职称评审的重要依据。加快实施财政资助科研项目形成专利的声明制度。探索科研院所、高校共建农业科技现代化先行县。集聚科技人才、科技成果、科技企业等, 建好国家农业科技园区。推动科研成果在现代农业产业园落地。培育农业技术经理人队伍, 支持建设农业科技孵化器和技術市场。

(十八) 推进科技产业金融良性循环。鼓励社会资本按照市场化原则设立农业科技领域的创投基金。推广创新积分制, 强化农业科技领域贷款、知识产权质押融资等政策力度, 进一步完善融资、保险等农业科技专属金融产品及担保机制。支持符合条件、承担国家重大科技项目的农业科技企業上市融资。

(十九) 提升农技推广服务能力。稳定基层农技推广队伍, 提升素质、回归主业, 强化公益性服务功能。提升县乡农技推广机构条件能力。鼓励发展各类农业科技社会化服务组织, 完善科技小院等推广模式。充分发挥科研院校、农村专业技术协会、新型农业经营主体等农技推广服务作用。持续抓好科技特派员(团)工作, 支撑服务国家乡村振兴重点帮扶县等地区的农业产业发展, 鼓励跨区域科技帮扶。实施好农业重大技术协同推广计划。

八、推动农业科技高水平开放合作

(二十) 加强双多边合作机制建设。健全双边农业科技对话机制, 协商推进政府间重点领域合作。加强与联合国粮农组织、国际农业研究磋商组织等国际组织的协作。加强与东盟、上合组织等区域性合作机制下的农业科技交流, 推动沿边省份更好发挥作用。

(二十一) 完善合作平台布局。建设高水平

国际联合实验室，鼓励建设海外实验室。加强与“一带一路”国家农业科技合作。办好杨凌农业高新科技成果博览会、世界农业科技创新大会、国际农科院院长高层研讨会等国际性会议。推动在华设立农业科技国际组织。

(二十二) 深化国际联合创新。积极探索农作物基因资源阐释国际大科学计划。围绕农业应对气候变化、生物安全等共性挑战，加强国际科技合作。鼓励企业以参股、并购等模式与国际科技企业开展合作。

(二十三) 强化国际人才和先进技术引进交流。加强国际先进农业技术引进及产业孵化。着力引进国际一流科学家和青年科学家。加大支持力度，选派更多农业青年人才到国外深造。

九、改善农业科技创新生态

(二十四) 高水平建设农业高新区。在国家农业高新技术产业集聚地，先行先试农业科技创新、成果转化、企业培育等新机制，加快发展农业高新技术产业集群。严格准入、动态管理，提高国家农业高新技术产业集聚地和现代农业产业科技创新中心建设水平。

(二十五) 完善农业科技投入机制。各级财政加强农业科技保障，鼓励各地探索完善稳定支持和竞争性支持相结合的投入机制。鼓励社会资本参与，引导农业企业加大科技投入，进一步拓宽资金来源渠道。

(二十六) 提升科技创新投入效能。完善科研项目绩效管理制度，加强对项目和经费管理使用规范性、有效性的监督。压实项目承担单位法人责任和项目负责人直接责任，严格执

行财政资金管理规定。探索实行中长期绩效评价，强化结果运用。

(二十七) 强化农业知识产权保护。加强植物新品种保护等制度建设，加快新品种权授权。探索农业知识产权分级分类评价、市场化定价交易和质押机制。按照重点农业创新单位实际需求派驻知识产权专员。加大侵权打击力度，强化农业科技成果保护。

(二十八) 加强农业科研学风作风建设。弘扬科学家精神，大力宣传农业科学家先进典型。建立农业科研诚信负面清单，规范各类评审评估活动。加强对兼任行政职务人员从事科研活动的管理。坚决整治“圈子”“围会”现象，严厉查处打招呼、请托、抄袭、造假、挂名等学术不端行为。加强农业科技安全风险防控和科技伦理审查监管。

(二十九) 加大农业科普宣传力度。打造更多农业科普基地，鼓励农业科技人员投身农业科普工作。围绕全民科学素质提升，广泛开展农业科普宣教活动。

十、加强组织保障

在中央科技委领导下，加强农业科技工作央地联动和部际协调。各省（自治区、直辖市）结合实际建立农业科技管理协调机制。围绕国家区域重大战略、区域协调发展战略，健全区域农业科技协作机制。建立农业科研机构创新能力和省域农业科技创新效能监测机制。建立农业科技创新体系整体效能提升推进落实机制，细化任务分工，强化工作调度，推动各项工作落实落地。

农业农村部 最高人民法院 最高人民检察院
工业和信息化部 公安部 市场监管总局
供销合作总社关于印发《2025年全国
农资打假和监管工作要点》的通知

农质发〔2025〕1号

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村（农牧）厅（局、委）、法院、检察院、工业和信息化主管部门、公安厅（局）、市场监管部门、供销合作社，新疆生产建设兵团农业农村局、法院、检察院、工业和信息化局、公安局、市场监管局、供销合作社：

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实加强农资生产、流通环节监管，严格整治不合格产品，严厉打击假冒伪劣行为，净化农资市场，维护农民权益，保障国家粮食安全，农业农村部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局和供销合作总社联合制定《2025年全国农资打假和监管工作要点》。现印发你们，请认真贯彻执行。

在工作中如有任何问题和建议，请及时与全国农资打假部际协调小组办公室（农业农村部农产品质量安全监管司）联系。电话：010-59193235，传真：010-59191891。

农业农村部 最高人民法院 最高人民检察院

工业和信息化部 公安部

市场监管总局 供销合作总社

2025年4月25日

2025年全国农资打假和监管工作要点

农资质量事关农业增效、农民增收和农村稳定。做好2025年全国农资打假和监管工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议部署要求，坚持问题导向，持续改革创新，加强农资全链条监管和线上线下一体化监管，加大违法行为打击惩处力度，净化农资市场，维护农民权益，为保障国家粮

食安全和农产品质量安全提供有力支撑。

一、加强农资审批认证管理， 把好质量源头关

加强种子生产经营许可备案和质量监管，针对无证生产、备案不及时、先销售后备案等问题开展整治，严格品种管理。落实农药登记、生产许

可、登记试验制度,加强农药监管。强化农机产品认证管理,加强农机产品认证机构监管和农机鉴定工作信息公开。严格肥料质量监督管理,压实肥料生产者责任义务。(农业农村部、市场监管总局按职责分工负责)

二、开展农资质量排查抽查,严控不合格产品上市

在春耕备耕、三夏、秋冬种等重要农时,组织各地开展排查,督促农资生产企业和经营单位落实进货查验、购销台账、产品标签标识等规定,及时查处无资质企业,对不合格产品立即下架。用好飞行检查、群众走访等方式,提高问题发现率(农业农村部、市场监管总局按职责分工负责)。组织实施种子、肥料、农药、兽药、饲料等产品质量监督抽查,加大往年问题企业和产品的抽检力度,加强部省抽查工作协同联动,结果及时共享(农业农村部负责)。以磷肥、钾肥、地膜、农用水泵等为重点,组织开展监督抽查和质量调查,对不合格产品取消资质或撤销证书(市场监管总局、农业农村部按职责分工负责)。

三、加强线上监管,规范网络销售农资行为

压实电商平台责任,督促落实《中华人民共和国电子商务法》及相关法律法规规定,依法履行对平台内农资经营者的资质核验、信息公示等义务。要求电商平台定期开展自查清理,对资质条件、备案信息等不符合规定的农资经营者立即责令整改,对违法产品及时下架,拒不改正的采取警示、暂停或者终止服务等措施。依法查处平台内经营者虚假宣传、违法广告等行为。对网络销售种子、农药、地膜、兽药开展监督抽检,严防不法经营者通过改变商品名等方式销售假劣农资和禁限用农兽药。加强农资舆情监测处置,从网络舆情倒查发现假劣农资违法线索,及时核实、依法查处。(农

业农业农村部、市场监管总局按职责分工负责)

四、深化专项整治行动,提升突出问题治理成效

持续开展“忽悠团”、网络违规售种等专项整治,紧盯走村窜户、流窜推销假劣化肥、种子、农药、地膜等行为,加强跟踪检查,一旦发现严查到底(农业农村部、市场监管总局按职责分工负责)。开展违法销售禁限用农兽药治理,强化对各类农资批发市场、乡镇经销点、流动商贩的全面排查,加强宣传培训,编印禁限用农兽药名录,讲清楚经营假劣农兽药的法律后果(农业农村部负责)。加大非标地膜监管整治力度,紧盯生产企业、销售网点、网络渠道等,加强地膜产品质量检查和市场抽查,严禁非标产品入市下田,依法查处一批制售非标地膜案件,推进科学使用回收(市场监管总局、农业农村部按职责分工负责)。

五、严打假劣农资违法犯罪,形成有力震慑

实施“绿剑护粮安”、种业监管执法年、“守护消费”铁拳行动,聚焦重点区域、问题产品、关键群体,加强农资质量监管执法(农业农村部、市场监管总局按职责分工负责)。部署开展“昆仑·2025”专项工作,聚焦种子、农药、化肥、兽药、饲料、地膜、农机等重点农资,紧盯存储、流通、交易环节和部位,推进做实公安机关农资打假区域协同机制,依法严厉打击制售假劣农资犯罪行为,切实形成有力震慑(公安部负责)。推动日常监管与执法办案有效衔接,对监督抽查、巡查检查、媒体曝光、群众投诉等发现的问题产品和违法行为,追根溯源、从严处罚,涉嫌构成犯罪的移送司法机关。对农资“忽悠团”和以“订单农业”为名制售假劣农资等重大农资案件组织开展专案集群打击,实现“办理一案、震慑一片、净化一域”。及时公布全国农业行政执法、市场监管执

法、公检法打击假劣农资违法犯罪等典型案例，组织地方曝光违法行为典型、社会影响恶劣的农资违法犯罪案件，发挥警示震慑作用（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、农业农村部、市场监督管理总局按职责分工负责）。

六、畅通供应主渠道，加强优质农资生产供应

强化农资价格形势监测，协调有关部门解决好农资运输、储备、销售等各环节问题（农业农村部、供销合作总社按职责分工负责）。压实重点化肥生产企业保供任务，加强生产要素保障，稳定化肥产品供给（工业和信息化部负责）。发挥供销合作社农资流通主渠道作用，指导系统企业做好货源采购、储备、下摆，确保农资供应量足、质优、服务到位。深入实施“绿色农资”升级行动，推进农资销售与技术服务有机结合，扩大绿色产品供应（供销合作总社负责）。

七、加强法规标准制定，健全农资打假制度

开展种子领域部门规章修订，实施新修订的玉米、水稻、小麦、油菜等主要粮油作物种子质量标准，推进修订大豆种子质量标准（农业农村部负责）。研究推动肥料立法，持续完善肥料标准体系，推进肥料行业标准制修订工作，加快肥料中文名称通用要求相关强制性国家标准研制（农业农村部、市场监管总局、工业和信息化部按职责分工负责）。

八、创新农资监管方式，提升工作效能

深入实施兽药二维码追溯管理，对兽药企业继续保持生产企业入网、产品出入库以及经营企业入网追溯覆盖率“3个100%”（农业农村部负责）。加快农资物联网应用推广，扩大中国农资质量安全追

溯平台在供销系统使用范围和数量，对纳入平台管理企业生产的产品发放追溯码，实现“来源可查、去向可追”（供销合作总社负责）。发挥农资行业协会作用，鼓励协会对成员企业开展信用评级评价，督促企业诚信自律经营（工业和信息化部、农业农村部、供销合作总社按职责分工负责）。

九、加强指导培训，营造农资打假良好氛围

广泛开展农资打假下乡进村、农业普法、科学选种购种宣传指导、安全用药培训、“3·15”农机维权等活动，面向生产一线和农民群众普及农资法律法规，结合农技培训、集市活动等场景，用农民群众喜闻乐见的生动形式讲解假劣农资危害，引导提升识假辨假水平。加强农资打假工作社会监督，发挥“12345”政务热线、地方投诉举报电话、网络举报信箱等渠道作用，鼓励各界积极反映假劣农资问题线索。组织行业协会、公益组织、新闻媒体等力量，积极发布农资打假进展成效，及时反映行业发展情况问题，鼓励面向农民合法开展维权服务。（全国农资打假部际协调小组各成员单位按职责分工负责）

十、逐级压紧压实责任，形成工作合力

各地有关部门要坚决扛起农资打假责任，层层传导压力，狠抓工作落实，确保农资打假工作部署要求和重点任务落实落地。发挥好农资打假部门协调机制作用，加强信息交流、情况通报、协同联动，切实形成打假工作合力。对发现跨区域的假劣农资问题线索，强化协同办案、区域联查、跨区协查。综合运用激励手段和督促机制，推动各地区各部门担当作为，进一步提升农资打假工作效能。农资打假工作要注重实效，坚决防止形式主义问题，切实减轻基层负担。（全国农资打假部际协调小组各成员单位按职责分工负责）

农业农村部关于印发“中国渔政亮剑2024” 执法典型案例的通知

农渔发〔2025〕12号

各省、自治区、直辖市农业农村（农牧）、渔业厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局：

2024年，全国各级渔业渔政主管部门和渔政执法机构（以下统称“渔政执法机构”）深入贯彻党中央、国务院决策部署，锚定建设农业强国目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，以破解危害渔业发展的顽瘴痼疾为导向，聚焦重点领域、重要时段、关键环节，扎实开展执法监管，严厉打击各类涉渔违法违规行，取得积极成效。据不完全统计，全年累计出动执法人员348.6万人次，清理取缔涉渔“三无”船舶2.3万艘，查办违法违规案件6.4万起，移交司法机关案件2580起，有力维护了渔业生产秩序和渔民群众合法权益。为全面提升渔业行政执法质量和效能，充分发挥典型案例和先进经验的示范引领作用，现从2024年查处或办结的案件中，选取9起典型案例通报如下。

一、河北省秦皇岛市海洋和渔业局查处张某良等3人未正常使用安全通信导航和船位监测终端设备、不服从渔政渔港监督管理机构对渔业生产秩序的管理案——省际联动加强异地休渔渔船监管

（一）基本案情

2024年7月25日，河北省秦皇岛市海洋和渔业综合行政执法支队根据农业农村部渔业渔政管理局和浙江省台州市海洋与渔业执法队通报的线索，对“冀某渔06857”船和“冀某渔06858”船开展执法检查。经调查，当事船舶经营人张某良伙同船长张某华、安某华，通过拆卸、屏蔽北斗和AIS（船舶自动识别系统）等方式逃避监管，擅自将当事船舶从浙江省台州市三门县健跳港转移至江苏省盐城市响水县灌河港。

（二）处理结果

渔政执法机构依照《中华人民共和国渔业船员管理办法》《河北省渔业船舶管理条例》有关规定，对船舶经营人张某良作出每艘渔船罚款17万元，合计罚款34万元的行政处罚决定，对船长张某华、安某华分别作出罚款2万元并暂扣职务船员证书9个月的行政处罚决定。

（三）典型意义

海洋伏季休渔期间，休渔渔船原则上应当回所属船籍港休渔，因特殊原因确实无法返回的，由船籍港所在地渔业渔政主管部门与靠泊港所在地渔业渔政主管部门开展协作监管，压紧压实属地责任、监管责任和主体责任。2024年，在农业农村部渔业渔政管理局、渔政保障中心的大力推动下，沿海11个省级渔政执法机构签订渔政执法共管协作机制，进一步推动异地休渔等跨省渔船协同监管。本案中，浙江、河北两地渔政执法机构充分运用工作机制，强化信息共享，及时查处违法行为，为加强省际执法协作和异地休渔渔船监管提供了典型范例。

二、上海市浦东新区农业农村委员会查处卫某未按规定保证渔业船舶符合最低配员标准案——加强渔业科研监测船的配员监管

（一）基本案情

2024年5月25日，上海市浦东新区城市管理综合行政执法局接报，“沪某渔测45678”船所附属的工作

艇在长江口九段沙附近开展渔业监测工作时发生安全事故。经调查，当事船舶仅有船长和船副2人，未按规定配备三级轮机长。

(二) 处理结果

渔政执法机构依照《中华人民共和国渔业船员管理办法》有关规定，对船长卫某作出罚款0.3万元的行政处罚决定。海事管理机构也依照《中华人民共和国海上交通安全法》有关规定，对船舶所有人上海浦某测绘有限公司予以行政处罚。

(三) 典型意义

渔业船舶配员不足导致重要岗位无人履职，影响船舶安全。《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，渔业船舶的船长应保证渔业船舶符合最低配员标准，这里的渔业船舶不仅包括捕捞渔船等生产类船舶，也包括科研监测船等非生产类船舶。本案中，渔政执法机构在事故调查过程中发现，该科研监测船配员不足，存在安全隐患，依法作出行政处罚决定，对强化非生产类渔业船舶的安全监管具有重要意义。

三、江苏省太湖渔政监督支队查处梁某等10人使用电鱼的方法进行捕捞案——渔政执法机关与公安机关省际协作的新探索

(一) 基本案情

2024年11月15日，江苏省太湖渔政监督支队三大队与浙江省湖州市公安机关联合执法，依托视频监控平台及无人机等先进技术手段，在两市交界的南太湖罗溇水域查获以梁某为首的非法捕捞团伙。执法人员现场查获涉渔快艇3艘、大型电拖网工具2套，渔获物19.1千克，涉案人员10人。

(二) 处理结果

渔政执法机构依照《中华人民共和国渔业法》有关规定，对当事人梁某等10人合计作出罚款3万元并没收渔获物、电鱼工具及涉渔快艇的行政处罚决定，并依法追究当事人水生生物资源损害赔偿赔偿责任。

(三) 典型意义

传统的省际交界水域协作执法一般限于渔政执法机关之间，既跨省又跨部门的渔政执法合作实践尚不多见。本案中，江苏省太湖渔政监督支队三大队依托与浙江省湖州市公安机关构建的联防联控体系，对省际交界水域内的非法捕捞活动进行共同研判、分工协作，充分发挥各自优势，准确掌握不法分子动向，将快艇、渔获物、电鱼工具、非法捕捞团伙等均置于严密监控之下，精准发现和有效固定非法捕捞线索，对查处类似水域内的非法捕捞活动具有示范意义。

四、浙江省宁波市农业农村局查处陈某东违反捕捞许可证关于作业场所的规定进行捕捞案——探索渔获物高效处置方式

(一) 基本案情

2024年3月14日，浙江省宁波市农业农村局执法人员在巡航时，发现陈某东驾驶“浙某渔82150”船正在从事捕捞作业，现场查获鮰鱼、小黄鱼、黄鲫等渔获物115千克。经调查，当事人违反了捕捞许可证关于作业场所的规定。

(二) 处理结果

渔政执法机构依照《中华人民共和国渔业法》有关规定，对当事人作出罚款2.2万元并没收渔获物的行政处罚决定。执法人员根据宁波市涉案渔获物处置规程，通过海上视频连线，经第三方公司评估渔获

物价值后进行现场变卖,在60分钟内完成了渔获物处置。

(三)典型意义

渔获物极易腐烂变质,长期保管不仅操作困难,也会使价值受到严重影响。本案中,渔政执法人员利用“宽带入海”便利条件,在海上对渔获物快速变卖,实现了处置价值最大化,既符合国家罚没财物管理有关规定,也为探索渔获物高效处置提供了实践经验。

五、福建省漳州市海洋与渔业执法支队查处陈某雄违反禁渔期规定利用“三无”船舶进行捕捞案——非法捕捞渔获物数量和价值可有条件累计计算

(一)基本案情

2024年6月23日,福建省漳州市海洋与渔业执法支队执法人员在相关海域巡查时,查获陈某雄利用“三无”船舶从事非法捕捞活动。经调查,当事人于2023年和2024年海洋伏季休渔期间,利用“三无”船舶从事非法捕捞作业10余次,非法获利累计超过10万元。

(二)处理结果

当事人连续2年实施非法捕捞行为未经处理,渔获物价值数额累计达到《最高人民法院关于审理发生在我国管辖海域相关案件若干问题的规定(二)》规定的入刑标准,渔政执法机构已将案件移送海警机构追究刑事责任。

(三)典型意义

海洋伏季休渔和打击涉渔“三无”船舶一直是“中国渔政亮剑”系列专项执法行动的重点任务。本案中,渔政执法机构依法查明当事人连续2年违反禁渔期规定实施非法捕捞行为,根据最高人民法院有关司法解释,按累计数额认定非法渔获物价值,依法将案件移送司法机关,对强化非法捕捞活动惩治力度,铁腕维护伏季休渔秩序,具有示范意义。

六、江西省鹰潭市农业综合行政执法支队查处罗某红等11人使用毒鱼的方法进行捕捞案——探索多元化生态环境损害赔偿承担方式

(一)基本案情

2023年12月24日,江西省鹰潭市农业综合行政执法支队余江大队执法人员在信江干流河段巡查时,发现罗某红等11人从事捕捞作业。经调查,当事人使用毒鱼方法,非法捕捞鲤、鳊、鳊等渔获物800余千克,价值1万余元。经鉴定,当事人非法捕捞行为造成水生生物资源损害64.9万元(该案件2024年结案)。

(二)处理结果

罗某红等11人的行为涉嫌构成非法捕捞水产品罪,渔政执法机构将案件移送司法机关。法院依照《中华人民共和国刑法》有关规定,分别判处罗某红等11人有期徒刑6至10个月不等,没收全部违法所得和作案工具,并判令其共同承担生态损害赔偿赔偿责任。当事人向余江区农业农村粮食局缴纳64.9万元用于购买鱼苗进行增殖放流,以赔偿水生生物资源损害,并与该局签订劳务代偿协议,通过卫生清洁、渔业巡护、普法宣传等公益劳动,以劳务代偿方式折抵生态环境修复费用。

(三)典型意义

电毒炸捕捞既损害水生生物资源,也对生态系统造成长期危害。根据农业农村部办公厅2020年印发的《非法捕捞案件涉案物品认定(鉴)定和水生生物资源损害评估及修复办法(试行)》有关要求,对于电毒炸捕捞,当事人除了对水生生物直接损害承担赔偿责任以外,还应按不低于直接损害十倍承担间接损害

赔偿责任,并按不低于水生生物资源损害总量的数额承担生态修复责任。按上述规定,本案涉及的生态环境损害赔偿责任金额总计近130万元。当事人缴纳水生生物资源损害赔偿金后,通过与渔业渔政主管部门订立劳务代偿协议的方式,以环境公益劳动折抵生态修复费用。这一做法既严格落实生态文明建设要求,符合损害者担责、谁损害谁修复的法律要求,也充分考虑了当事人经济承受能力,增强了法律的操作性,兼顾了法律效果和社会效果,探索了涉渔案件中生态环境损害赔偿责任的多元化实现路径。

七、广东省佛山市农业农村局查处某旅游文化发展有限公司未经批准、未依法取得专用标识利用国家重点保护水生野生动物案——规范水生野生动物经营利用和展演活动

(一)基本案情

2024年6月8日,根据群众举报,广东省佛山市农业农村局执法人员在执法检查中发现,某旅游文化发展有限公司利用《濒危野生动植物种国际贸易公约》(简称CITES)附录所列南美毛皮海狮、巨巴西骨舌鱼、暹罗鳄等经农业农村部核准按国家重点保护野生动物管理的水生野生动物开展公众展示展演。经调查,当事公司未依法取得水生野生动物经营利用许可证或专用标识。

(二)处理结果

渔政执法机构依照《中华人民共和国野生动物保护法》有关规定,对当事企业作出罚没款合计6.3万元的行政处罚决定。

(三)典型意义

对列入《国家重点保护野生动物名录》以及经核准按国家重点保护动物进行国内管理的CITES附录水生动物,依法取得水生野生动物经营利用许可证或专用标识方可进行交易和利用。本案中,渔政执法机构对擅自利用国家重点保护水生野生动物从事公众展示展演的行为予以处罚,对严格规范水生野生动物经营利用活动、提高依法保护水生野生动物意识,具有示范意义。

八、四川省乐山市市中区农业农村局查处谢某明等9人非法捕捞水产品案——严打内陆水域非法捕捞团伙

(一)基本案情

2024年3月21日,四川省乐山市市中区农业农村局联合公安机关开展联合执法,在岷江水域老江坝段抓获谢某明等非法捕捞人员4人,现场查扣运输车辆、船只、电鱼设备等作案工具,查获渔获物561千克;后又将其余5名团伙成员抓获归案。经调查,谢某明等9人团伙自2022年以来在长江流域禁捕水域使用电鱼方法捕捞各类渔获物1万余千克,并分销至水产市场和餐馆。经鉴定,当事人的电鱼行为造成水生生物资源损害价值605万元。

(二)处理结果

谢某明等9人的行为涉嫌构成非法捕捞水产品罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,渔政执法机构依据《依法惩治长江流域非法捕捞等违法犯罪的意见》等规定,将案件移送司法机关追究刑事责任。经法院审理,对其中的谢某明等6人分别判处有期徒刑7个月至2年3个月不等有期徒刑、部分并处罚金,没收作案工具和违法所得。此外,四川省乐山市农业农村局对谢某明等9人追究水生生物资源损害赔偿责任。

(三)典型意义

长江禁捕以来,长江流域生态环境恢复势头持续向好,部分水域渔业资源量显著增加。一些犯罪分子发现非法捕捞“效益显著”,为谋求不法利益并逃避和对抗监管,常结成捕运销网络,以团伙方式

作案。本案中，渔政执法机构与公安机关密切配合，通过“人防+技防”方式，运用卫星定位、视频监控等高科技手段取得关键证据，全面查清违法事实，涉案人员悉数归案，成功查处四川省自长江禁捕以来涉案渔获物数量最大的电鱼案件，对持之以恒做好长江禁渔监管工作起到了重要示范作用。

九、陕西省韩城市农业农村局查处李某学未经批准在水产种质资源保护区内进行捕捞案——严查水产种质资源保护区内的非法捕捞活动

（一）基本案情

2023年11月29日，陕西省韩城市农业农村局农业综合执法大队根据群众举报，在芝川高速大桥东少梁段桥下漳水河黄河鲤、兰州鲇国家级水产种质资源保护区内发现李某学从事捕捞活动，现场查获白鲢、黄河鲤等渔获物40余千克（该案件2024年结案）。

（二）处理结果

渔政执法机构依照《中华人民共和国渔业法》有关规定，对李某学作出罚款0.2万元并没收渔获物和渔具的行政处罚决定。

（三）典型意义

水产种质资源保护区是水生生物产卵和繁殖的重要栖息地，是重要渔业水域的核心部分。未经国务院渔业行政主管部门批准，任何单位和个人不得在水产种质资源保护区内从事捕捞活动。本案中，渔政执法机构依法查处违反水产种质资源保护区规定从事非法捕捞作业的行为，对加强渔业资源保护、丰富水生生物多样性具有重要意义。

农业农村部

2025年4月27日

农业农村部办公厅关于印发 《养殖业节粮行动实施方案》的通知

农办牧〔2025〕15号

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村（农牧）、畜牧兽医、渔业厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局，北大荒农垦集团有限公司，部机关有关司局、直属有关单位：

为贯彻落实党中央、国务院关于践行大食物观、构建多元化食物供给体系和粮食节约行动的部署安排，按照《农业农村部关于实施养殖业节粮行动的意见》要求，在保障粮食和重要农产品稳定安全供给前提下，持续推进饲料粮减量替代，推动养殖业节粮降耗、降本增效，我部制定了《养殖业节粮行动实施方案》。现印发给你们，请结合本地实际，细化目标任务，采取务实举措，认真抓好贯彻落实。

农业农村部办公厅

2025年4月25日

养殖业节粮行动实施方案

一、行动目标

统筹推进提效节粮、开源节粮、优化结构节粮三方面措施,力争到2030年,标准化规模养殖方式的每公斤动物产品平均饲料消耗量比2023年减少0.2公斤以上(降幅达7%以上);微生物蛋白饲料、餐桌剩余食物饲料化产品、农副资源饲料化产品、昆虫蛋白饲料、动物源蛋白饲料等非粮饲料资源开发利用产能达1000万吨以上,优质饲草产量比2023年新增4000万吨以上;建成一批适度规模、种养结合、生态循环、智慧管理的家庭农场或标准化养殖场;全国养殖业消耗的饲料中粮食用量占比降至60%左右,其中,豆粕用量占比降至10%左右。

二、重点任务

(一)大力推广养殖提效节粮技术

1.加快推广精准饲料配方技术体系。重点围绕肉鸡、蛋鸡、肉牛、肉羊、鱼、虾等养殖动物品种,构建基于净能体系和氨基酸平衡模式的动态营养需要模型。组织制修订主要养殖动物品种的低蛋白饲料标准、饲养标准和低蛋白多元化饲料生产技术规范,编制发布应用技术要点。(农业农村部畜牧兽医局负责,渔业渔政管理局、农产品质量安全监管司参与,全国畜牧总站、全国水产技术推广总站、中国农业科学院、中国水产科学研究院参加)

2.开展动物精准饲养管理技术产品集成应用。研发基于多元化饲料配方结构的绿色高效饲料添加剂应用技术,针对不同养殖条件开展饲料供给与营养需求精准适配的调控技术集成与推广。支持低蛋白饲料配方必需的小品种氨基酸和酶制剂等产品研发创制。(农业农村部畜牧兽医

局负责,渔业渔政管理局、科学技术司参与,全国畜牧总站、全国水产技术推广总站、中国农业科学院、中国水产科学研究院参加)

3.研发推广数智化饲喂决策和饲料配方软件系统。支持饲料原料营养价值参数、加工特性参数、动物营养需要量、养殖生产等数据信息共享,集成应用智能决策模型等信息技术手段,引导饲料加工设备核心部件自主创制,研创推广数智化饲喂决策和饲料配方软件系统。(农业农村部畜牧兽医局负责,全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

4.推进智能化标准化养殖设施装备集成配套。大力推广精细化阶段饲养管理工艺,鼓励养殖场配备智能化精准饲喂成套设施设备,推动精准饲养工艺、技术、设施三配套的一体化发展。因地制宜发展畜禽立体养殖和水产工厂化循环水养殖等模式。(农业农村部畜牧兽医局、渔业渔政管理局负责,农业机械化推广司、科学技术司参与,全国畜牧总站、全国水产技术推广总站、农业农村部农业机械化总站、中国农业科学院、中国水产科学研究院参加)

(二)充分挖掘利用非粮饲料资源

1.开展地源性特色饲料资源调查评估。组织开展全国性饲料资源种类、分布及开发利用情况调查摸底。评价建立重点品种营养成分及其饲用价值参数和抗营养因子、有毒有害物质等基础参数数据库。支持开展肉鸡、肉牛、肉羊、奶牛等主要饲料原料营养价值参数试验评价,完善饲料原料营养价值数据库。(农业农村部畜牧兽医局负责,全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

2.积极发展非粮饲料资源提效加工利用。支持发酵饲料推广应用,有序开展发酵饲料产品生产许可。加快推动农作物秸秆、糟渣类产品等地源性低值原料的发酵、酶解提效加工利用。加快

生物发酵工业副产品安全性评估与饲料化利用。

(农业农村部畜牧兽医局负责,科学技术司参与,全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

3.加快推广新型高效资源转化型饲料原料。

支持乙醇梭菌蛋白等以一碳气体为原料合成的微生物菌体蛋白扩大产能。有序扩大餐桌剩余食物、毛皮动物屠体、动物源蛋白水解物等新蛋白资源饲料化利用试点范围和规模。加快推广尿素等非蛋白氮饲料化利用,积极探索昆虫蛋白、藻类蛋白等资源饲料化利用途径。(农业农村部畜牧兽医局负责,全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

4.增补开发潜力较大的新饲料原料。修订发布《饲料原料目录》,明确发酵饲料分类管理要求,增补微生物、微藻、昆虫等蛋白资源产品和食品、粮油、农产品加工副产品等地源性饲料原料品种。适时根据市场需求及时增补纳入《饲料原料目录》。(农业农村部畜牧兽医局负责,全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

(三)加快发展优质饲草生产

1.提升饲草良种供给能力。围绕苜蓿、羊草、饲用燕麦、杂交狼尾草等,加快培育优质高产、饲用性能优良、抗寒耐旱耐盐碱的饲草新品种。进一步完善草品种区域试验评价工作机制,支持国家草品种区域试验点基础条件建设。支持建设高标准优良饲草种子田。(农业农村部畜牧兽医局、科学技术司负责,计划财务司、种业管理司参与,全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

2.加快发展饲草种植。支持各地特别是牧区、农牧交错带,合理利用耕地发展饲草种植,积极支持粮饲轮作,稳步扩大苜蓿、饲用燕麦、青贮玉米等饲草种植面积。继续实施草原畜牧业转型升级项目。支持在土壤、水热等条件适宜的天然草原科学有序开展多年生人工草地建植。(农业农村部畜牧兽医局负责,计划财务司、种植业管理司参与,全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

3.积极拓展饲草发展空间。坚持“以种适地”

同“以地适种”相结合,分类推进盐碱地综合利用,支持利用中重度盐碱地发展饲草种植。强化种地适配,在适宜地区推广种草改盐为主的盐碱地治理和利用模式,因地制宜推进羊草、冰草、披碱草、鸭茅、狼尾草、田菁等品种种植。(农业农村部畜牧兽医局负责,计划财务司、农田建设管理司参与,全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

4.推动饲草全产业链发展。分区域集成推广饲草高效生产技术体系,积极发展高密度草捆、草颗粒和裹包青贮等便于商品化流通的饲草产品,推行规模化种植、标准化生产、产业化经营的发展模式。(农业农村部畜牧兽医局负责,农业机械化管理司参与,全国畜牧总站、农业农村部农业机械化总站、中国农业科学院参加)

(四)引导优化养殖品种结构

1.持续调整优化生猪产能。实施生猪产能调控实施方案,把住能繁母猪存栏量“总开关”,引导养殖场户优化母猪存栏结构、合理控制产能。持续完善生猪产能监测和预警体系,及时发布市场信息,指导养殖场户适时出栏和优化养殖规模,促进供需适配。(农业农村部畜牧兽医局负责,全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

2.大力发展节粮型高效肉禽生产。积极推广家禽适度营养水平、最优转化效率的精准饲料配方技术,调优饲料蛋白含量、豆粕占比。积极引导禽肉消费,进一步提高禽肉消费比重和产量占比。(农业农村部畜牧兽医局负责,科学技术司参与,全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

3.促进牛羊产业稳定发展。开展肉牛肉羊增量提质行动,支持优质基础母牛扩群提质和种草养畜。实施牧区畜牧良种补贴、草原畜牧业转型升级等项目,推进牛羊养殖节本增效。推广“牧繁农育”“暖季适度放牧、冷季舍饲半舍饲”等生产模式,促进以草代料。有序开展以家庭农场和农民合作社为主体的奶业养殖加工一体化发展试点。(农业农村部畜牧兽医局负责,全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

4.加快发展设施渔业。推进传统养殖池塘标准化改造,集成应用池塘养殖多功能智能化设备、生态养殖管理系统及装备技术。推广池塘工程化循环水、工厂化循环水、室内鱼菜共生等设施养殖模式,稳步提升养殖水产品供应能力。

(农业农村部渔业渔政管理局负责,农业机械化管理司参与,全国水产技术推广总站、农业农村部农业机械化总站、中国水产科学研究院参加)

(五)持续开展技术集成创新与推广

1.加快饲料饲草领域创新平台建设。支持养殖业节粮减排科技创新联盟等协作平台建设,推动建设饲料饲草领域国家技术创新中心,引导技术创新型企业与科研机构创建新型研发机构,推动构建产学研用协同创新机制。(农业农村部科学技术司负责,农业农村部科技发展中心、中国农业科学院参加)

2.强化节粮养殖关键核心技术装备研发。支持动物精准营养、饲料精准配方、良种繁育、智慧养殖、动物流行病净化、优质饲草种植加工等核心技术和设施装备研发。加快智能生产性能测定、全基因组选择、分子设计育种等新技术研发应用,建立饲料转化率测定评价体系和高饲料转化率基因组遗传评估参考群体。(农业农村部畜牧兽医局负责,科学技术司、农业机械化管理司参与,农业农村部科技发展中心、中国农村技术开发中心、全国畜牧总站、农业农村部农业机械化总站、中国农业科学院参加)

3.大力培育推广节粮型优良新品种。支持培育饲料转化率高、节粮性能突出、综合性状优良的畜禽水产新品种(配套系)。加快培育推广高蛋白玉米等饲用作物品种。支持国家畜禽核心育种场、良种扩繁场和核心种公畜站,强化水产原良种场建设。加快推广优良种畜禽及优质精液和胚胎、水产新品种。(农业农村部科学技术司、种业管理司、畜牧兽医局、渔业渔政管理局负责,计划财务司参与,全国畜牧总站、全国水产技术推广总站、中国农业科学院、中国水产科学研究院参加)

4.加强动物疾病防治技术集成推广。聚焦重大动物疫病、垂直传播病和季节性常见病,集成推广一批适宜有效的流行病净化无疫模式,扩大疫病净化场和无疫小区范围。集成推广牧区、半牧区、农区牛羊传染病、寄生虫病防控技术。加快多联多价疫苗研发应用。组织实施规范兽药使用专项整治巩固提升行动。(农业农村部畜牧兽医局、渔业渔政管理局负责,中国动物疫病预防控制中心、中国兽医药品监察所、中国动物卫生与流行病学中心、全国水产技术推广总站、中国农业科学院、中国水产科学研究院参加)

5.深入开展先进适用技术培训指导。组织开展养殖业节粮新技术、新产品、新装备遴选,加强应用示范。组织成立养殖业提质节本增效技术服务团,深入生产一线开展技术指导。鼓励龙头企业和社会化服务组织面向中小养殖场户开展技术服务。(农业农村部畜牧兽医局、渔业渔政管理局负责,全国畜牧总站、全国水产技术推广总站、农业农村部农业机械化总站、中国农业科学院参加)

6.总结推介养殖业节粮典型案例。面向社会征集资源与规模适配的高效智慧养殖、现代饲草产业高效发展、优质高效非粮饲料资源发掘利用等典型案例,总结模式要点和运营经验,向全行业宣传推介,引导发展高效节粮养殖模式。(农业农村部畜牧兽医局、渔业渔政管理局负责,全国畜牧总站、全国水产技术推广总站、中国农业科学院参加)

(六)加快完善制度性保障措施

1.持续优化饲料兽药审批制度。完善新饲料和新饲料添加剂靶动物有效性、耐受性、毒理学和代谢残留评价指南。优化生物技术创新产品的安全性评价程序,加快饲用微生物菌株生物安全性评审进度。优化动物疫苗用菌(毒)种变更备案审查程序,简化兽用中药注册资料要求,对水产养殖用兽药、多联多价疫苗新产品实行优先评审。(农业农村部畜牧兽医局负责,科学技术司参

与，农业农村部科技发展中心、中国兽医药品监察所、全国畜牧总站参加)

2.建立重点新产品审批绿色通道。落实好饲料和饲料添加剂新产品咨询服务机制，抓好靠前指导服务。对低蛋白饲料配方必需的小品种氨基酸和酶制剂等重点产品，主动跟进审批服务。建立重点产品生产许可审批快速通道。(农业农村部畜牧兽医局负责，全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

3.完善饲料领域新产品评价监测制度。制定饲料和饲料添加剂试验评价机构管理规定，加强机构监督管理和业务培训。建立饲料和饲料添加剂新产品跟踪监测制度，明确监测期满后新产品的管理要求和质量标准规定。(农业农村部畜牧兽医局负责，全国畜牧总站、中国农业科学院参加)

三、阶段性进度安排

(一) 2025年进度安排。制定完善精准配方低蛋白日粮应用技术要点。推广养殖数智化饲喂决策和饲料配方软件系统。启动全国地源性特色饲料资源调查评估工作。修订发布《饲料原料目录》。餐桌剩余食物饲料化定向使用试点城市扩大至20个以上，在河北、辽宁、山东开展毛皮动物屠体饲料化利用试点。审定通过饲草新品种20个以上。成立养殖业节粮减排科技创新联盟。组织成立养殖业提质节本增效技术服务团。总结推介节粮养殖典型案例。出台应用生物技术创新饲用产品的安全性评价简化程序，优化动物疫苗用菌(毒)种变更备案审查程序和简化后的兽用中药注册资料要求。

(二) 2026—2027年进度安排。集成推广不同养殖条件下饲料供给与营养需求精准适配的调控技术体系。完成全国地源性特色饲料资源

基本情况调查摸底。完成肉鸡、肉牛、肉羊、奶牛等主要饲料原料营养价值数据库构建。推广昆虫蛋白、藻类蛋白饲料化。建设一批国家草品种区域试验点、高标准优良饲草种子田和优质饲草产区。审定推广一批饲料转化率高、节粮性能突出、综合性状优良的畜禽水产新品种(配套系)。集成推广牧区、半牧区、农区牛羊传染病、寄生虫病防控技术。

(三) 2028—2030年进度安排。全面推广应用基于全产业链效益最大化的国产数智化饲喂决策和饲料配方软件系统。建设一批适度规模、种养结合、生态循环、智慧管理的家庭农场或标准化养殖场。编制全国地源性饲料资源存量“一张底图”。建设一批稳产高产节水饲草地。持续提高节粮型畜禽水产新品种(配套系)占有率，提升动物疫病净化和科学防病治病水平。

四、组织保障

(一) 加强组织实施保障。农业农村部成立养殖业节粮行动领导小组，下设专家指导组、政策协调组、推广培训组、新产品评价组等4个工作组。各省份根据实际情况建立落实工作机制，确保上下贯通、协调联动。

(二) 细化管理服务措施。各省级农业农村部门因地制宜细化实化落实举措，有序推进各项工作。各地要建立低蛋白饲料配方必需的小品种氨基酸、酶制剂等产品生产许可审批快速通道，认真做好新资源饲料化利用试点跟踪监管。研究出台人工种草支持政策的落实举措。

(三) 推动形成良好氛围。充分发挥畜牧兽医领域智库、产业技术体系、科研教学机构、行业协会学会的作用，举办多种形式的培训、交流等活动，有序开展新产品、新技术、好案例等评选推介，引导各类生产经营主体积极主动参与。

农业农村部办公厅关于公布2025年渔业绿色循环发展项目立项名单的通知

农办渔〔2025〕17号

各省、自治区、直辖市农业农村(农牧)、渔业厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局:

为贯彻落实党中央、国务院关于渔业绿色循环发展的决策部署,根据《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于开展2025年渔业绿色循环发展项目申报的通知》(农办渔〔2025〕11号,以下简称《通知》)要求,经农业农村部会同财政部评审并公示,现对2025年渔业绿色循环发展项目立项名单予以公布,具体名单见附件。现就有关事项通知如下。

一、加强组织领导,扎实推进项目实施

省级农业农村(渔业)部门要密切与财政部门沟通配合,建立健全政府领导下分工协作的工作机制,切实加强组织协调,压实工作责任,强化业务指导,上下衔接联动,完善扶持政策,加强用地保障,优化发展环境。项目县要高度重视,加强组织领导和部门协作,确保各项任务落实,按照项目评审意见,抓紧修改完善项目实施方案,明确建设目标、重点任务、建设内容和政策措施。项目应聚焦水产养殖业高质量发展,坚持统筹谋划、因地制宜,注重建设内容的关联性和完整性,做到各功能区合理布局、有效衔接,效能充分发挥。修改完善后的项目实施方案由省级农业农村(渔业)部门会同财政部门进行批复。

二、严格资金使用,切实提高资金使用效益

省级农业农村(渔业)部门要会同财政部门督促项目县按照《通知》要求修改完善中央财政补奖资金使用一览表,明确资金具体支持内容、对象和方式,细化年度使用计划和总体资金筹措方案。中央财政补奖资金不得“撒胡椒面”,不得搞平均分配;不得用于建设楼堂馆所、市政道路、农村公路,不得用于一般性支出、列支管理费、列支项目咨询费和项目论证评审费,不得用于“三保”和政府债务还本付息,三年内中央财政资金已支持的建设内容不予重复支持。要加快项目执行,年底资金执行情况将作为下年度项目安排的重要参考。要严格落实公开公示制度,补奖对象确定后,应在项目所在地的地方政府官方网站公示中央财政补奖资金支持的建设主体、建设内容、资金额度等事项。

三、严格项目全过程监管,确保项目取得实效

省级农业农村(渔业)部门要会同财政部门严格按照农业产业发展资金管理办法,及时拨付中央财政补奖资金,量化考核指标,加强资金使用全过程监督管理。对挤占、挪用、截留中央财政补奖资金的,一经发现,以后年度不再安排资金支持。省级农业农村(渔业)部门要利用农业农村部转移支付管理平

台加强项目管理,定期调度资金使用、建设进展等情况,及时发现并协调解决项目建设过程中的问题,加强建设成效总结和宣传。农业农村部按照中央财政资金管理的有关要求,适时组织开展绩效评估,强化正向激励,并将评估结果作为后续资金安排的重要依据。对建设任务完成进度慢、中央财政补奖资金违规使用或执行进度慢、实施效果差的项目,将进行通报、限期整改、扣减资金。请有关省份将项目批复文件和实施方案,于2025年5月20日前一并报送农业农村部和财政部备案。

附件: 2025年渔业绿色循环发展项目立项名单

农业农村部办公厅
2025年4月25日

附件

2025年渔业绿色循环发展项目立项名单

- 1.天津市滨海新区渔业绿色循环发展项目

2.山西省永济市渔业绿色循环发展项目

3.吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县
渔业绿色循环发展项目

4.江苏省高邮市渔业绿色循环发展项目

5.浙江省德清县渔业绿色循环发展项目

6.浙江省长兴县渔业绿色循环发展项目

7.安徽省当涂县渔业绿色循环发展项目

8.安徽省怀远县渔业绿色循环发展项目

9.安徽省贵池区渔业绿色循环发展项目

10.福建省新罗区渔业绿色循环发展项目

11.江西省永修县渔业绿色循环发展项目

12.山东省博兴县渔业绿色循环发展项目
- 13.山东省河口区渔业绿色循环发展项目

14.河南省潢川县渔业绿色循环发展项目

15.湖北省监利市渔业绿色循环发展项目

16.湖南省湘阴县渔业绿色循环发展项目

17.湖南省澧县渔业绿色循环发展项目

18.广东省中山市渔业绿色循环发展项目

19.重庆市长寿区渔业绿色循环发展项目

20.四川省中江县渔业绿色循环发展项目

21.四川省射洪市渔业绿色循环发展项目

22.云南省景洪市渔业绿色循环发展项目

23.陕西省汉阴县渔业绿色循环发展项目

24.宁夏回族自治区平罗县渔业绿色循环发展项目

25.新疆维吾尔自治区温宿县渔业绿色循环发展项目

农业农村部办公厅关于公布2025年国家级沿海渔港经济区项目名单的通知

农办渔〔2025〕16号

沿海各省、自治区、直辖市农业农村、渔业厅（局、委），计划单列市渔业主管局：

按照《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于开展2025年国家级沿海渔港经济区建设试点申报的通知》（农办渔〔2025〕10号，以下简称《通知》）要求，经农业农村部和财政部评审并公示，对2025年国家级沿海渔港经济区项目名单予以公布（名单见附件）。现就有关事项通知如下。

一、加强组织领导，扎实推进项目建设

各项目所在省（自治区、计划单列市）农业农村（渔业）部门要密切与财政部门的沟通配合，切实履行管理责任，加强对项目建设工作的指导，完善扶持政策。项目所在地要高度重视，建立健全统筹推进项目实施的工作机制，加强部门协作，及时发现并解决项目建设过程中的问题，确保按时高质高效完成建设任务。

二、明确建设要求，统筹优化功能布局

项目所在地要按照《通知》要求和答辩评审意见，抓紧修改完善项目建设规划和实施方案。统筹规划渔港经济区建设，与国土空间规划及其他相关规划相互衔接。科学规划区域内渔港及相关产业等子项目，优化空间布局，做到“点多、面广、链长”。在着眼渔业安全管理等功能的同时，创新渔港建设模式，依港兴产、以产带城、以城促港，促进渔港综合开发，推动港、产、城一体化，提升渔港多元化功能和现代化水平。

三、规范使用资金，充分发挥资金效益

各项目所在省（自治区、计划单列市）农业农村（渔业）部门要督促项目实施主体单位抓紧修改完善中央财政补奖资金使用方案，明确具体支持内容、支持对象、支持方式，细化年度使用计划和总体资金筹措方案。中央财政补奖资金重点用于对渔港相关公益性基础设施进行更新改造和整治维护，不得“撒胡椒面”、搞平均分配，不得用于建设楼堂馆所、一般性支出和列支管理费。通过引入金融专业力量，进一步细化完善投融资模式，充分发挥中央财政补奖资金撬动作用，引导金融和社会资本加大投入。

四、严格评估验收，确保项目取得实效

各项目所在省（自治区、计划单列市）农业农村（渔业）部门要会同财政部门按照《通知》要求开展项

目绩效评估和验收,农业农村部将会同财政部适时对评估结果和验收情况进行复核,并结合项目建设进展和复核情况,对通过绩效评估的安排后续奖励资金,强化补奖资金与建设成效挂钩机制。要及时拨付中央财政补奖资金,加强资金使用全过程监督管理,不得挤占、挪用、截留,不得纳入整合资金范围。

请相关省(自治区、计划单列市)农业农村(渔业)部门将修改完善的建设规划、实施方案和中央财政补奖资金使用方案(PDF版)于2025年5月20日前报送农业农村部备案。

联系方式:

农业农村部渔业渔政管理局行业发展处, 010-59192989, 010-59192961(传真), bofplan@agri.gov.cn

农业农村部计划财务司农业补贴处, 010-59191313, 010-59193264(传真), nongyebutie@agri.gov.cn

附件: 2025年国家级沿海渔港经济区项目名单

农业农村部办公厅

2025年4月27日

附件

2025年国家级沿海渔港经济区项目名单

- 1.江苏省连云港市连云区渔港经济区
- 2.浙江省舟山市嵊泗县渔港经济区
- 3.广西壮族自治区钦州市渔港经济区
- 4.海南省琼海市渔港经济区
- 5.大连市长海县渔港经济区
- 6.宁波市奉化区渔港经济区

农业农村部办公厅关于做好2025年 高素质农民培育工作的通知

农办社〔2025〕3号

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村(农牧)、畜牧兽医、渔业厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局,北大荒农垦集团有限公司、广东省农垦总局:

为贯彻落实2025年中央一号文件和2024年中央农村工作会议精神,加强乡村人才队伍建设,现就做好2025年高素质农民培育工作通知如下。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议、中央农村工作会议部署要求，深入学习运用“千万工程”经验，紧紧围绕粮食和重要农产品稳产保供、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村特色产业发展壮大和文明乡风建设等人才需求，坚持需求导向、质量优先、突出实效，坚持分层实施、分级管理、育用结合，按照工程化、项目化方式组织实施高素质农民培育项目，提升农民技术技能水平、产业发展能力和综合素质素养，大力培育粮食安全守护者、产业发展带头人和乡村振兴主力军，为推进乡村全面振兴、建设农业强国提供坚实人才保障。

二、专项工程

2025年高素质农民培育计划重点支持实施粮油和重要农产品生产经营主体提升工程、新产业新业态带头人培育工程、文明乡风建设素质素养提升工程。其中，针对行业急需、人才培养短板弱项、产业发展痛点难点等举办一批专题培训班。

（一）粮油和重要农产品生产经营主体提升工程

一是围绕保障国家粮食安全，以粮油领域新品种、新技术、新装备应用等为主要内容，组织开展粮油产能提升主体培育。重点开展粮油等主要作物大面积单产提升主体培育，聚焦大豆、玉米、小麦、油菜以及棉花、糖料等作物单产提升，开展全产业链技术或单项关键技术培训，在适宜地区普及水肥一体化技术，推进良田、良种、良法、良机融合，提升新型农业经营主体和服务主体的技术技能水平。

二是围绕践行大食物观，构建多元化食物供给体系，以畜牧、水产、蔬菜、水果、茶叶、食用菌、热作等种养殖理论、生产技术、质量安全和绿色发展等知识技能为主要内容，结合地方农业特色，开展重要农产品生产经营主体能力提升培育。重点面向肉牛奶牛养殖大省、大市、大县（农场）开展肉牛奶牛养殖培训，面向内陆养殖渔民和退捕转产渔民开展淡水池塘养殖培训。其中，在沿海10省（自治区、直辖市），聚焦渔业安全生产全链条，突出安全意识和应急处置能力提升，组织举办一批渔船船东船长安全生产专题培训班。

三是围绕支撑农业机械化全程全面高质量发展和提升农机作业服务质量，聚焦主要粮油作物耕种管收机械化作业环节，着力培养一批高素质农机手、农业生产无人机飞手。重点围绕机械化措施促进粮油作物大面积单产提升重点环节以及机收减损等，因地制宜开展农机手技能提升培训。其中，面向专业农机手、农机大户和农机作业服务组织带头人，突出粮油作物高质量机播（含水稻机械化移栽）、高效飞防植保、机收减损、农机抗灾救灾、低空经济场景应用和农机安全生产等技术技能，注重实操实训和作业演练，组织举办一批农机手技能提升专题培训班。

（二）新产业新业态带头人培育工程

围绕农村一二三产业融合发展和乡村新产业、新业态的人才需求，突出农业与科技、文化、教育、旅游、康养、新能源等融合的“农业+”新产业，培养素质能力与乡村新产业新业态高度契合的带头人。重点关注返乡大学生、农民工、退役军人等青年群体，鼓励各地举办专门面向青年群体的培训班，培养一批具有长期发展带动能力的青年带头人。其中，面向粮油等重要农产品和乡村特色农产品生产经营及社会化服务主体，突出智慧农业技术装备应用、农业生产经营数字化管理及服务、农产品品牌打造等内容，组织

举办一批新型农业经营主体数字化技能应用能力提升专题培训班。

（三）文明乡风建设素质素养提升工程

一是围绕贯彻落实文明乡风建设工程有关要求，广泛普及农耕文化蕴含的思想观念、人文精神和道德规范，提升农民保护传承农耕文化、践行移风易俗的自觉意识和能力，培养一批乡村文艺创作者、乡村文化传播者和农文旅融合型产业带头人。重点开展乡村礼俗传承人、农耕技艺传承人、村艺工坊传习人和乡村工匠等乡村文化人才培育。其中，遴选具有文化艺术特长、长期扎根乡村的农民文化骨干和具备农文旅融合发展基础的相关主体从业者，依托重要农业文化遗产地、村艺工坊和各地认定的精品民宿等场所，组织举办一批乡土文化能人专题培训班。

二是围绕乡村建设、治理、发展对各类人才的需求，开展乡村建设治理人才培育，提升农民积极参与乡村建设、乡村治理的积极性和能力水平。重点对农村改厕、农村集体资产管理、乡镇和边境村乡村治理从业人员开展培育。

三、有关要求

各级农业农村部门要高度重视、精心组织、抓好落实，扎实做好本地区高素质农民培育计划组织实施工作，切实保障培育质量效果。

（一）加强组织管理

要按照《高素质农民培育项目管理工作规程（试行）》，做好本地区高素质农民培育计划组织实施，健全逐级负责的管理机制。加强高素质农民培育管理体系建设，开展管理人员培训，持续提升省、市、县各级培育工作的组织管理水平。省级农业农村部门按照本文件要求做好2025年省、市、县三级培育任务分解，以竞争性立项的方式组织省、市、县三级实施专题班任务。继续做好高素质农民培育“学用贯通”综合试点。

（二）强化质量建设

要建立健全质量监管机制，强化高素质农民培育计划质量建设。要指导承担培育任务的机构严格落实《高素质农民培育规范》具体要求，不断提升培育针对性、规范性、有效性，切实保障培育质量。鼓励各级农业广播电视学校积极承担项目日常管理相关工作，做好技术支撑。可充分依托全国新型农业经营主体服务监测系统等平台加强培训对象遴选。

（三）优化培育资源

严格把关综合素养课教材和师资，将习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观教育，以及党的“三农”路线、方针、政策等作为综合素养课的首要内容。广泛吸纳农业企业、家庭农场、农民合作社等参与实践教学，并从中选用实践教学师资。强化对培育机构、实践教学场所、师资、课程、教材等培育资源规范管理，鼓励各地因地制宜建立相关遴选标准。支持用好农科院所、农技推广机构、科技小院等科技资源，开展农业实用技术培训。

（四）落实监管责任

各级农业农村部门要严格按照相关规定，切实担负起项目实施和资金使用管理的主体责任和监督责任，做好项目实施监管，全面提升项目资金使用效能，坚决防止在项目执行过程中出现违规违纪违法行，防范廉政风险。依托全国农民教育培训信息管理系统做好培育全过程跟踪管理，依托农业农村部转

移支付管理平台做好资金支出监管。

(五) 鼓励机制创新

注重培育机制和培育路径创新,持续探索并完善学用贯通、育用结合的人才培养模式,及时总结经验,挖掘培育典型,交流宣传好经验、好做法,推动高素质农民培育提质量、见实效。

农业农村部办公厅

2025年5月21日

农业农村部办公厅关于征集 2025年全国新型农业经营主体率先提单产 及完善农业经营体系典型案例的通知

农办经〔2025〕2号

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村(农牧)厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局:

贯彻落实党中央、国务院关于完善农业经营体系、促进农民合作经营的要求,动员广大新型农业经营主体率先提单产服务带农户,引导各地构建支撑主导产业发展的现代农业经营体系,农业农村部决定开展全国新型农业经营主体率先提单产及完善农业经营体系典型案例征集活动。现将有关要求通知如下。

一、新型农业经营主体率先提单产典型案例

重点征集各地充分发挥新型农业经营主体带动作用,引领和服务小农户提高粮食单产水平的典型案例。案例材料应聚焦主体率先提单产和服务带农户两个方面阐明具体做法和成效,可以是家庭农场、农民专业合作社等主体的实践经验,也可以是地方推动工作开展的具体举措。案例内容包括但不限于以下主题:

一是家庭农场、农民专业合作社率先推广应用良田、良种、良机、良法深度融合的综合性解决方案,推动关键技术和增产模式先试先用,通过开展现场观摩、经验交流、技术培训等活动,向小农户展示技术集成和模式应用成效,提供农业社会化服务,促进粮油作物大面积均衡增产。

二是地方政府广泛引导发动新型农业经营主体积极参与粮油作物单产提升,强化统筹协调,综合采取政策引导、技术培训、项目支持、跟踪辅导、信息服务等方式,为家庭农场、农民专业合作社提供全方位指导服务,推动各项政策举措落到实处、产生实效。

二、完善农业经营体系典型案例

重点征集各地支撑当地主导产业发展的农业经营体系典型案例。案例材料要阐明涉及主体数量、主体间的合作关系与利益联结机制、带动农户增收和产业发展情况,并将各类主体间的联结关系和运行机制以经营体系图的形式展示。案例内容包括但不限于以下主题:

一是加强联合合作。以家庭农场为成员组建农民合作社,单体农民合作社依法自愿组建联合社,带动小农户发展合作经营、共同增收。

二是健全联结机制。各地立足资源禀赋和产业基础,健全新型农业经营主体扶持政策同带动农户增收挂钩机制,引导构建支撑当地主导产业发展、联结带动小农户就业致富的现代农业经营体系。

三是提高经营管理水平。新型农业经营主体开展规模化、绿色化、标准化、集约化生产,实现农业生产效率提升、要素资源优化配置、市场竞争力提升;发展农业新质生产力、加快应用关键核心技术,引领示范智慧农业发展,推进一二三产业融合。

三、报送要求

各省级农业农村部门要高度重视本次案例征集活动,做好推荐案例的筛选和审核把关,确保案例文稿质量,并对所报送案例内容的真实性负责。案例涉及的新型农业经营主体要规模适度,具有良好社会声誉,遵纪守法,诚实守信,引领带动作用强,未被列入经营异常名录、失信被执行人名单等,未涉及非法金融活动;所涉及的农民合作社严格执行《农民专业合作社财务制度》《农民专业合作社会计制度》。每个案例材料字数不超过3000字,需提供150字以内的摘要。可选送与案例主题密切相关的电子照片3~4张,并附简要说明,照片格式为JPG,单张照片不小于3M。

每个省份报送推荐的案例总数不超过4个,于2025年10月31日前以厅(局、委)文件形式将案例材料和推荐表报送至农业农村部农村合作经济指导司。

农业农村部办公厅

2025年5月17日

中华人民共和国农业农村部公告

第 885 号

根据《农产品质量安全检测机构考核办法》规定,经考核评审等相关程序,现对20家部级质检中心有关情况公告如下。

一、河南省农业科学院[农业农村部农产品质量检验检测中心(郑州)]等15家机构通过了国家级农产品质量安全检测机构考核复查评审(见附件1)。

二、河南省种业发展中心[农业农村部小麦玉米种子质量检验检测中心]等5家机构发生信息变更(见附件2)。

特此公告。

附件: 1. 2025年国家级农产品质量安全检测机构考核名单(第二批)

2. 2025年国家级农产品质量安全检测机构考核信息变更情况(第二批)

农业农村部

2025年2月19日

附件1

2025年国家级农产品质量安全检测机构考核名单
(第二批)

序号	机构名称	检测范围	机构法定代表人	通讯地址	邮编	联系电话	考核合格证书编号
1	河南省农业科学院[农业农村部农产品质量检验检测中心(郑州)]	农产品及转基因产品成分	张新友	河南省郑州市金水区花园路116号	450002	0371—65738394	[2025]农质检核(国)字第0009号
2	辽宁省农业科学院[农业农村部农产品质量检验检测中心(沈阳)]	农产品	隋国民	辽宁省沈阳市沈河区东陵路84号	110161	024—31023348	[2025]农质检核(国)字第0004号
3	中国农业科学院茶叶研究所[农业农村部茶叶质量检验检测中心]	农产品	姜仁华	浙江省杭州市西湖区梅灵南路9号	310008	0571—86650124	[2025]农质检核(国)字第0042号
4	上海市农业技术推广服务中心[农业农村部农药质量检验检测中心(上海)]	农药残留	朱建华	上海市闵行区吴中路628号	201103	021—64053928	[2025]农质检核(国)字第0161号

序号	机构名称	检测范围	机构法定 代表人	通讯地址	邮编	联系电话	考核合格证书 编号
5	中国水产科学研究院黄海水产研究所[农业农村部水产种质与渔业环境质量检验检测中心(青岛)]	水产种质、渔业环境	金显仕	山东省青岛市市南区 南京路106号	266071	0532—85836341	[2025]农质检核(国)字第0216号
6	中国水产科学研究院黄海水产研究所[国家水产品质量检验检测中心]	水产品	金显仕	山东省青岛市市南区 南京路106号	266071	0532—85825917	[2025]农质检核(国)字第0218号
7	广西壮族自治区兽药监察所(广西壮族自治区饲料监测所、广西壮族自治区畜牧产品质量检测中心)[农业农村部饲料质量检验检测中心(南宁)]	饲料及饲料添加剂	许力干	广西壮族自治区南宁市 西乡塘区友爱北路51号	530001	0771—3130234	[2025]农质检核(国)字第0080号
8	山东省烟台市农业科学研究院[农业农村部果品及苗木质量检验检测中心(烟台)]	果品及苗木	刘民晓	山东省烟台市福山区 港城西大街26号	265500	0535—5528872	[2025]农质检核(国)字第0170号
9	湖北省兽药监察所(湖北省畜禽产品质量监督检验检测中心)[农业农村部畜禽产品质量安全检验检测中心(武汉)]	畜禽产品	王峻	湖北省武汉市洪山区 狮子山街王家湾	430070	027—87286385	[2025]农质检核(国)字第0046号
10	中国热带农业科学院分析测试中心[农业农村部热带农产品质量检验检测测试中心]	农产品	徐志	海南省海口市龙华区 学院路4号	571101	0898—66895009	[2025]农质检核(国)字第0175号
11	兰州大学[农业农村部牧草与草坪草种子质量检验检测中心(兰州)]	牧草与草坪草种子	杨勇平	甘肃省兰州市城关区 嘉峪关西路768号	730020	0931—8914051	[2025]农质检核(国)字第0181号
12	华中农业大学[农业农村部微生物产品质量检验检测中心(武汉)]	微生物产品	严建兵	湖北省武汉市洪山区 狮子山街1号	430070	027—87287442	[2025]农质检核(国)字第0174号
13	中国农业科学院麻类研究所[农业农村部麻类产品质量检验检测中心]	麻类产品	杨永坤	湖南省长沙市岳麓区 咸嘉湖西路348号	410205	0731—88998525	[2025]农质检核(国)字第0067号
14	山东省农业生态与资源保护总站(山东省绿色食品发展中心)[农业农村部农业环境质量检验检测中心(济南)]	农产品	曲召令	山东省济南市历城区 工业北路200号	250100	0531—81608088	[2025]农质检核(国)字第0185号
15	中国农业科学院农业资源与农业区划研究所[农业农村部微生物肥料和食用菌菌种质量检验检测中心]	微生物肥料及食用菌菌种	吴文斌	北京市海淀区中关村 南大街12号土肥楼4层	100081	010—82108702	[2025]农质检核(国)字第0116号

附件2

2025年国家级农产品质量安全检测机构考核信息变更情况
(第二批)

序号	机构名称	变更内容	变更前	变更后
1	河南省种业发展中心[农业农村部小麦玉米种子质量检验检测中心]	法定代表人	马运粮	张道明
2	吉林农业大学[农业农村部参茸产品质量检验检测中心]	法定代表人	杜锐	李启云
3	中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所[农业农村部热带作物种子种苗质量检验检测中心]	法定代表人	王家保	徐立
4	青岛市农产品质量安全中心(青岛市农业投入品鉴定中心)[农业农村部农产品质量安全检验检测测试中心(青岛)]	法定代表人	董国强	万思敬
5	新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所[农业农村部畜禽产品质量安全检验检测测试中心(乌鲁木齐)]	法定代表人	杨建中	哈力再提·海力力

中华人民共和国农业农村部公告

第 886 号

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定,经审查,批准华中农业大学等22家单位申报的牛支原体活疫苗(HB150株)等6种兽药产品为新兽药,核发《新兽药注册证书》,发布产品质量标准、工艺规程、说明书和标签,自发布之日起执行。

批准瑞普(天津)生物药业有限公司申报的复方阿莫西林粉变更注册,发布修订后的说明书和标签,自发布之日起执行;批准山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司等6家单位申报的注射用青霉素钠等3种兽药产品变更注册,申请人按照农业农村部批准的变更事项,自行修改原批准的说明书和标签对应内容,并印制、使用。

特此公告。

- 附件: 1.新兽药注册目录
2.兽药变更注册目录
3.质量标准
4.工艺规程
5.说明书和标签

农业农村部
2025年2月25日

附件1

新兽药注册目录

新兽药名称	研制单位	类别	新兽药注册证书号	监测期
牛支原体活疫苗（HB150株）	华中农业大学、金宇保灵生物制品有限公司、武汉科前生物股份有限公司、吉林正业生物制品股份有限公司	一类	（2025）新兽药证字11号	5年
禽白血病病毒J亚群ELISA抗体检测试剂盒	中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、哈尔滨国生生物科技股份有限公司、哈尔滨维科生物技术有限公司、浙江东方基因生物制品股份有限公司	二类	（2025）新兽药证字12号	4年
猪伪狂犬病灭活疫苗（gE/TK基因缺失HD/c株）	浙江大学、杭州佑本动物疫苗有限公司、成都史纪生物制药有限公司	三类	（2025）新兽药证字13号	3年
鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗（A型SD株+B型BJ05株+C型LN株）	北京生泰尔科技股份有限公司、北京市农林科学院、北京华夏兴洋生物科技有限公司	三类	（2025）新兽药证字14号	3年
水貂犬瘟热活疫苗（CDV01/23株）	吉林和元生物工程股份有限公司、吉林省牧艾生物科技有限公司、吉林嘉汇生物技术有限公司、昌黎县动物疾病预防控制中心	三类	（2025）新兽药证字15号	3年
鞣酸蛋白可溶性粉	山东福美乐动物药业有限公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司、广东温氏大华农生物科技有限公司动物保健品厂、山东德信生物科技有限公司	四类	（2025）新兽药证字16号	3年

附件2

兽药变更注册目录

兽药名称	申请单位	兽药标准来源	变更事项	监测期 （针对变更事项）
复方阿莫西林粉	瑞普（天津）生物药业有限公司	《兽药质量标准》同品种内容	增加靶动物猪和新适应证	/
注射用青霉素钠	山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司	《中国兽药典》同品种内容	增加19.2g（3200万单位）含量规格	/
注射用头孢噻呋钠	哈尔滨龙江动保生物科技有限公司	《中国兽药典》同品种内容	增加12.0g规格	/
鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、禽流感（H9亚型）四联灭活疫苗（La Sota株+M41株+HS25株+HZ株）	哈药集团生物疫苗有限公司、东北农业大学、哈尔滨佰利通生物科技有限公司、扬州优邦生物制品有限公司	（2014）新兽药证字21号	将贮藏与有效期由“2~8℃保存，有效期为12个月”变更为“2~8℃保存，有效期为18个月”	/

附件3(略)

附件4(略)

附件5

说明书和标签

一、牛支原体活疫苗(HB150株)说明书和标签

(一)牛支原体活疫苗(HB150株)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 牛支原体活疫苗(HB150株)
商品名称 无
英文名称 Mycoplasma bovis Vaccine, Live (Strain HB150)
汉语拼音 Niu Zhiyuanti Huoyimiao (HB150 Zhu)

【主要成分与含量】 本品含牛支原体HB150株,每头份疫苗含活菌数≥1.0×10⁸CFU。

【性状】 乳白色或微黄色海绵状疏松团块,易与瓶壁脱离,加灭菌生理盐水后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防牛支原体感染引起的呼吸道疾病。免疫后28日产生免疫力,免疫持续期为8个月。

【用法与用量】 滴鼻接种。按瓶签注明头份,用灭菌生理盐水进行稀释。1月龄以上健康牛,每头接种2.0ml(含1头份)。

【不良反应】 一般无可见不良反应,有时由于疫苗接种引起的体温一过性升高,属于正常的应激反应。

【注意事项】 (1)疫苗在储藏和运输的过程中防止高温、消毒剂和阳光直射。

(2)使用疫苗前应预先放入室温,加灭菌生理盐水充分混匀。疫苗稀释后应放置于冷暗处,限2小时内用完。

(3)接种疫苗时,应将疫苗缓慢滴入鼻腔深部,避免因液滴太大或滴得太快刺激牛体喷嚏。

(4)使用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行集中消毒后再按规定废弃。

【规格】 (1)1头份/瓶 (2)2头份/瓶 (3)5头份/瓶 (4)10头份/瓶

【包装】

【贮藏与有效期】 -20℃以下保存,有效期为18个月。

【生产企业】

【批准文号】

仅在兽医指导下使用

(二) 牛支原体活疫苗 (HB150株) 内包装标签

兽用

牛支原体活疫苗 (HB150株)

1 (2、5、10) 头份/瓶

批准文号:
批 号:
有效期至:

【作用与用途】 用于预防牛支原体感染引起的呼吸道疾病。免疫后28日产生免疫力, 免疫持续期为8个月。

【用法与用量】 滴鼻接种。按瓶签注明头份, 用灭菌生理盐水进行稀释。1月龄以上健康牛, 每头接种2.0ml (含1头份)。

【贮藏与有效期】 -20℃以下保存, 有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

二、禽白血病病毒J亚群ELISA抗体检测试剂盒说明书和标签

(一) 禽白血病病毒J亚群ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 禽白血病病毒J亚群ELISA抗体检测试剂盒

商品名称 无

英文名称 Avian Leukosis Virus Subgroup J ELISA Antibody Test Kit

汉语拼音 Qinbaixuebing Bingdu J Yaqun ELISA Kangtijiance Shijihe

【主要成分与含量】 试剂盒中含有如下成分:

试剂盒组成	规格	数量
抗原包被板	96孔/块	1块/盒或5块/盒
阴性对照血清	1ml/管或3ml/管	1管/盒
阳性对照血清	1ml/管或3ml/管	1管/盒
样品稀释液	50ml/瓶或250ml/瓶	1瓶/盒
10倍浓缩洗涤液	15ml/瓶或75ml/瓶	1瓶/盒
兔抗鸡IgG酶标抗体	10ml/瓶或50ml/瓶	1瓶/盒
底物溶液	10ml/瓶或50ml/瓶	1瓶/盒
终止液	10ml/瓶或50ml/瓶	1瓶/盒
说明书		1份/盒

【性状】 试剂盒应无破损、无裂痕、无渗漏。其中:

抗原包被板 包装袋封闭良好, 表面光洁、无裂纹, 抗原包被板孔底清洁、透明、无异物。

阴性对照血清 无色或淡黄色澄清液体。

阳性对照血清 无色或淡黄色澄清液体。

样品稀释液 无色澄清液体。

10倍浓缩洗涤液 无色澄清液体。

兔抗鸡IgG酶标抗体 无色或淡黄色澄清液体。

底物溶液 无色或淡蓝色澄清液体。

终止液 无色澄清液体。

【作用与用途】 用于检测鸡血清中禽白血病病毒J亚群抗体。

【用法与判定】

1 用法

1.1 试剂的准备 用前将所有的试剂和样品恢复至15~30℃, 试剂应轻轻地旋转或振荡予以混合。

1.2 洗涤液的配制 取1份10倍浓缩洗涤液加入到9份双蒸水中, 混匀。配制好的洗涤液应在3日内用完。

1.3 待检血清的稀释 用样品稀释液将待检血清样品按1:500 (v/v) 进行稀释。

1.4 操作步骤

1.4.1 加样 根据样品数量, 取可拆卸包被板, 加入稀释好的待检血清样品, 100μl/孔, 同时设阳性对照血清和阴性对照血清各2孔。

1.4.2 孵育 置37℃孵育30分钟。

1.4.3 洗涤 甩去孔内液体, 加入洗涤液, 250μl/孔, 洗涤3次, 每次静置2分钟, 甩去孔内液体, 拍干。

1.4.4 加入酶标抗体 加入兔抗鸡IgG酶标抗体, 100μl/孔。

1.4.5 孵育 置37℃孵育30分钟。

1.4.6 洗涤 方法同1.4.3项。

1.4.7 显色 加入底物溶液, 100μl/孔, 置15~25℃避光孵育15分钟。

1.4.8 终止 加入终止液, 100μl/孔, 轻微振荡混匀, 在波长为450nm下读取OD_{450nm}值(应在加入终止液后15分钟内完成读数)。

1.4.9 计算 按下式计算S/P值。

$$S/P值 = \frac{\text{待检血清样品OD}_{450nm} \text{值} - \text{阴性对照血清平均OD}_{450nm} \text{值}}{\text{阳性对照血清平均OD}_{450nm} \text{值} - \text{阴性对照血清平均OD}_{450nm} \text{值}}$$

2 试验成立的条件 0.60≤阳性对照血清OD_{450nm}值均≤1.20, 阴性对照血清OD_{450nm}值均<0.10, 则判为试验成立。

3 判定 待检血清样品S/P值≥0.30, 判为阳性; 待检血清样品S/P值<0.30, 判为阴性。

【注意事项】 (1) 试剂盒应在2~8℃运输及保存。

(2) 贮藏时, 所有的板条一定要用封口膜密封, 防止潮气对包被板的损伤。否则, 不得使用。

(3) 不要使底物溶液接触强光和氧化物。所有试剂取出后, 均不得再加回瓶中。

(4) 仔细阅读说明书。

(5) 不要使用过期的组分或者不同批次试剂混合使用。

- (6) 10倍浓缩洗涤液如发现结晶, 稀释前置37℃使其溶解后再使用。
- (7) 注意加样和洗涤过程, 应确保试验的准确度, 严禁用嘴吸液。
- (8) 待检血清发生腐败时勿用于检测。
- (9) 检验用器皿必须清洁, 操作过程避免与金属类器物接触。
- (10) 应严格按照试剂盒说明书进行操作, 严格遵守各操作步骤规定的时间和温度。
- (11) 操作过程中使用手套, 终止液是硫酸, 具有腐蚀性, 使用时要小心。所有的废液要经过无害化处理和净化。

【规格】 (1) 1个96孔板/盒 (2) 5个96孔板/盒
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。
【批准文号】
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

(二) 禽白血病病毒J亚群ELISA抗体检测试剂盒内包装标签

兽用

禽白血病病毒J亚群ELISA抗体检测试剂盒

1(5) 个96孔板/盒

批准文号:
批 号:
有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

抗原包被板

96孔/块

批 号:
有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照血清

1(3) ml/管

批 号:
有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照血清

1 (3) ml/管

批 号:
有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品稀释液

50 (250) ml/瓶

批 号:
有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

10倍浓缩洗涤液

15 (75) ml/瓶

批 号:
有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

兔抗鸡IgG酶标抗体

10 (50) ml/瓶

批 号:
有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

底物溶液

10 (50) ml/瓶

批 号:
有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

终止液

10 (50) ml/瓶

批 号:
有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为9个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

三、猪伪狂犬病灭活疫苗 (gE/TK基因缺失HD/c株) 说明书和标签

(一) 猪伪狂犬病灭活疫苗 (gE/TK基因缺失HD/c株) 说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 猪伪狂犬病灭活疫苗 (gE/TK基因缺失HD/c株)

商品名称 无

英文名称 Pseudorabies Virus Vaccine, Inactivated (gE/TK Genes-deleted Strain HD/c)

汉语拼音 Zhu weikuangquanbing Miehuoyimiao (gE/TK Jiyinqueshi HD/c Zhu)

【主要成分与含量】 疫苗灭活前猪伪狂犬病毒gE/TK基因缺失HD/c株的含量不低于 $10^{8.3}$ TCID₅₀/ml。

【性状】 淡粉红色至乳白色均匀乳剂。

【作用与用途】 用于预防猪伪狂犬病毒感染引起的疾病, 免疫产生期为免疫后21日, 免疫持续期为4个月。

【用法与用量】 颈部肌肉注射。14 日龄以上猪, 每头2ml; 怀孕母猪产前4~7周接种4ml, 间隔3周二

免4ml。

【不良反应】 猪只接种过程中出现过敏反应,可用肾上腺素救治。

【注意事项】 (1)本品仅适用于健康猪群预防接种,接种疫苗时注意消毒。

(2)用前应使疫苗温度升至室温,应充分摇匀。

(3)疫苗瓶开启后限当日用完。

(4)本品严禁冻结,破乳后切勿使用。

(5)疫苗在运输、保存、使用过程中应防止高温、消毒剂和阳光照射。

(6)用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二)猪伪狂犬病灭活疫苗(gE/TK基因缺失HD/c株)内包装标签

兽用

猪伪狂犬病灭活疫苗(gE/TK基因缺失HD/c株)

批准文号:

批 号:

有效期至:

【用法与用量】 颈部肌肉注射。14日龄以上猪,每头2ml;怀孕母猪产前4~7周接种4ml,间隔3周二免4ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

四、鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗(A型SD株+B型BJ05株+C型LN株)说明书和标签

(一)鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗(A型SD株+B型BJ05株+C型LN株)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗(A型SD株+B型BJ05株+C型LN株)

商品名称 无

英文名称 Infectious Coryza Vaccine, Inactivated

(type A, Strain SD + type B, Strain BJ05 + type C, Strain LN)

汉语拼音 Ji Chuanranxing BiyanSanjia Miehuoyimiao

(A xing SDzhu + B xing BJ05zhu + C xing LNzhu)

【主要成分与含量】 每毫升疫苗含灭活的副鸡禽杆菌A型SD株 1.2×10^9 CFU、B型BJ05株 2.0×10^9 CFU和C型LN株 1.6×10^9 CFU。

【性状】 蓝色液体，久置有菌体沉淀。

【作用与用途】 用于预防A型、B型、C型副鸡禽杆菌引起的鸡传染性鼻炎。免疫后28日产生保护，免疫期为4个月；蛋种鸡110日龄左右按照相同剂量二免，免疫期为9个月。

【用法与用量】 颈部皮下或胸部肌肉注射。21~28日龄免疫，0.5ml/只。建议蛋种鸡110日龄左右加强免疫一次。

【不良反应】 一般无明显的不良反应。

【注意事项】 (1) 本品仅用于健康鸡群免疫接种。

(2) 疫苗使用前应充分摇匀，使疫苗升到室温。

(3) 疫苗开启后应限当日用完。

(4) 接种器具应无菌，注射部位应消毒。

(5) 剩余疫苗、疫苗瓶应做无害化处理。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为15个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗(A型SD株+B型BJ05株+C型LN株)内包装标签

兽用

鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗(A型SD株+B型BJ05株+C型LN株)

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防A型、B型、C型副鸡禽杆菌引起的鸡传染性鼻炎。免疫后28日产生保护，免疫期为4个月；蛋种鸡110日龄左右按照相同剂量二免，免疫期为9个月。

【用法与用量】 颈部皮下或胸部肌肉注射。21~28日龄免疫，0.5ml/只。建议蛋种鸡110日龄左右加强免疫一次。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为15个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

五、水貂犬瘟热活疫苗(CDV01/23株)说明书和标签

(一) 水貂犬瘟热活疫苗(CDV01/23株)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 水貂犬瘟热活疫苗 (CDV01/23株)
商品名称 无
英文名称 Mink Canine Distemper Vaccine, Live (Strain CDV01/23)
汉语拼音 Shuidiao Quanwenre Huoyimiao (CDV01/23 Zhu)

【主要成分与含量】 疫苗中含犬瘟热病毒CDV01/23株, 每头份病毒含量应 $\geq 10^{5.0}$ TCID₅₀。

【性状】 淡黄色或微红色海绵状疏松团块, 易与瓶壁脱离, 加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防水貂犬瘟热。免疫产生期为免疫后21日, 免疫期为6个月。

【用法与用量】 肌肉注射。按瓶签注明头份, 用灭菌生理盐水或适宜稀释液稀释为每头份1.0ml, 水貂在断乳14~21日或种水貂配种前30~60日接种疫苗, 每只1.0ml。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】 (1) 本品仅用于接种健康水貂。注射疫苗前后10日内禁用影响免疫的药物如抗血清等。

(2) 疫苗应在冷链条件下运输, 在运输、保存和使用中应防止高温、消毒剂和阳光照射。

(3) 疫苗稀释后应及时注射, 避免高温。

(4) 疫苗瓶破裂、失空、变色或装量明显不足时不得使用。

(5) 接种用具应无菌, 注射部位应严格消毒。

(6) 疫苗接种后偶尔可能引起过敏反应, 可立即肌肉注射盐酸肾上腺素0.5~1.0ml治疗。

(7) 用过的疫苗瓶、用具、稀释后剩余的疫苗等, 必须消毒处理。

(8) 注苗期间应避免水貂调动、运输和饲养管理骤变等应激刺激。

【规格】 (1) 10头份/瓶 (2) 20头份/瓶 (3) 50头份/瓶 (4) 100头份/瓶

【包装】

【贮藏与有效期】 -15℃以下保存, 有效期18个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 水貂犬瘟热活疫苗 (CDV01/23株) 内包装标签

兽用

水貂犬瘟热活疫苗 (CDV01/23株)

10 (20、50、100) 头份/瓶

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防水貂犬瘟热。免疫产生期为免疫后21日, 免疫期为6个月。

【用法与用量】 肌肉注射。按瓶签注明头份, 用灭菌生理盐水或适宜稀释液稀释为每头份1.0ml, 水貂在断乳14~21日或种水貂配种前30~60日接种疫苗, 每只1.0ml。

【贮藏与有效期】 -15℃以下保存, 有效期18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

六、鞣酸蛋白可溶性粉说明书和标签

(一) 鞣酸蛋白可溶性粉说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 鞣酸蛋白可溶性粉
商品名称
英文名称 Albumin Tannate Soluble Powder
汉语拼音 Rousuandanbai Kerongxingfen

【主要成分】 鞣酸蛋白

【性状】 本品为淡棕色粉末。

【药理作用】 本品为收敛药。口服后在肠内经胰蛋白酶分解，缓慢释放出鞣酸，使肠黏膜表层内的蛋白质沉淀，形成一层保护膜而减轻刺激，降低炎性渗透物和减少肠蠕动，起收敛止泻作用。

【药物相互作用】 (1) 本品能影响胰酶、胃蛋白酶、乳酶生等的药效，不宜同服。

(2) 本品不应与碱性药物同服，因B族维生素可能被破坏。

(3) 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，应遵医嘱使用。

【适应证】 主要用于辅助治疗鸡由大肠埃希菌引起的腹泻。

【用法与用量】 以本品计。混饮：每1L水，鸡0.33g，一日1次，连用5日。

【不良反应】 按推荐的用法与用量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】 (1) 治疗鸡细菌性腹泻时，应先用抗菌药物控制感染后或同时应用本品。

(2) 配制后的药液应在4小时内饮用完毕。

【休药期】 无需制定。

【规格】 30%

【包装】

【贮藏】 遮光，密闭，干燥处保存。

【有效期】 24个月

【批准文号】

【生产企业】

(二) 鞣酸蛋白可溶性粉标签

兽用

【兽药名称】

通用名称 鞣酸蛋白可溶性粉
商品名称

英文名称 Albumin Tannate Soluble Powder

汉语拼音 Rousuandanbai Kerongxingfen

【主要成分】鞣酸蛋白

【性状】本品为淡棕色粉末。

【适应证】主要用于辅助治疗鸡由大肠埃希菌引起的腹泻。

【用法与用量】以本品计。混饮：每1L水，鸡0.33g，一日1次，连用5日。

【不良反应】按推荐的用法与用量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】（1）治疗鸡细菌性腹泻时，应先用抗菌药物控制感染后或同时应用本品。

（2）配制后的药液应在4小时内饮用完毕。

【规格】30%

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】无需制定。

【贮藏】遮光，密闭，干燥处保存。

【包装】

【生产企业】

七、复方阿莫西林粉说明书和标签

（一）复方阿莫西林粉说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称 复方阿莫西林粉

商品名称 莫克林

英文名称 Compound Amoxicillin Powder

汉语拼音 Fufang Amoxilin Fen

【主要成分】阿莫西林、克拉维酸钾

【性状】本品为白色或类白色粉末。

【药理作用】阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素，具有广谱抗菌作用。抗菌谱及抗菌活性与氨苄西林基本相同，对大多数革兰氏阳性菌的抗菌活性稍弱于青霉素，对青霉素酶敏感，故对耐青霉素的金黄色葡萄球菌无效。对革兰氏阴性菌如大肠埃希菌、变形杆菌、沙门氏菌、嗜血杆菌、布鲁氏菌和巴氏杆菌等有较强的作用，但这些细菌易产生耐药性。对铜绿假单胞菌不敏感。由于其在单胃动物的吸收比氨苄西林好，血药浓度较高，故对全身性感染的疗效较好。

克拉维酸仅有微弱的抗菌活性，能与革兰氏阳性和阴性细菌所产生的β-内酰胺酶不可逆结合并且对β-内酰胺酶具有抑制作用，从而保护了β-内酰胺类抗生素的活性，故称为β-内酰胺酶抑制剂。克拉

维酸内服吸收好，不单独用于抗菌治疗，通常与其他β-内酰胺抗生素合用。随着细菌产生β-内酰胺酶的变化及耐药性变化，克拉维酸与β-内酰胺酶的结合能力和抑制作用也会发生变化，实际使用中应密切观察。

阿莫西林对胃酸相当稳定，单胃动物内服后74%~92%吸收。

【药物相互作用】 (1)本品与氨基糖苷类合用，可提高后者在菌体内的浓度，呈现协同作用。

(2)大环内酯类、四环素类和酰胺醇类等速效抑菌剂对本品的杀菌作用有干扰作用，不宜合用。

【适应证】 用于治疗鸡青霉素敏感菌引起的感染；治疗猪由致病性大肠杆菌引起的肠道疾病。

【用法与用量】 以本品计。混饮：每1L水，鸡0.5g，一日2次，连用3~7日；每1kg体重，猪0.1g，一日2次，连用5日。

【不良反应】 (1)鸡按规定的用法与用量使用尚未见不良反应。

(2)猪内服本品后可能出现轻微胃肠道症状（如腹泻和呕吐）和过敏反应。

【注意事项】 (1)产蛋供人食用的鸡，在产蛋期不得使用。

(2)本品水溶液不稳定，现用现配。

(3)对青霉素类或头孢菌素类抗生素过敏者不得接触本品。

(4)本品不得用于兔子、豚鼠、仓鼠、沙鼠或小食草动物。

【休药期】 鸡7日；猪1日。

【规格】 50g：阿莫西林5g+克拉维酸1.25g

【包装】

【贮藏】 遮光，密封，在凉暗处保存。

【有效期】 18个月

【批准文号】

【生产企业】 瑞普（天津）生物药业有限公司

(二)复方阿莫西林粉标签

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称 复方阿莫西林粉

商品名称 莫克林

英文名称 Compound Amoxicillin Powder

汉语拼音 Fufang Amoxilin Fen

【主要成分】 阿莫西林、克拉维酸钾

【性状】 本品为白色或类白色粉末。

【适应证】 用于治疗鸡青霉素敏感菌引起的感染；治疗猪由致病性大肠杆菌引起的肠道疾病。

【用法与用量】 以本品计。混饮：每1L水，鸡0.5g，一日2次，连用3~7日；每1kg体重，猪0.1g，一日2次，连用5日。

【规格】 50g：阿莫西林5g+克拉维酸1.25g

【批准文号】

【生产日期】
【生产批号】
【有效期】 至
【休药期】 鸡7日; 猪1日。
【贮藏】 遮光, 密封, 在凉暗处保存。
【包装】
【生产企业】

中华人民共和国农业农村部公告

第 887 号

为进一步加强国家兽医实验室体系建设, 强化动物疫病防控技术支撑, 根据《国家兽医参考实验室管理办法》, 我部评定中国动物卫生与流行病学中心等单位的相关实验室为第五批国家兽医实验室。相关实验室要严格按照有关法律法规和农业农村部规定开展实验活动。

特此公告。

附件: 第五批国家兽医实验室名单

农业农村部
2025年3月14日

附件

第五批国家兽医实验室名单

一、国家小反刍兽疫参考实验室

所在单位: 中国动物卫生与流行病学中心
实验室负责人: 包静月
地址: 青岛市红岛经济区岈东南路21号
邮编: 266032

二、国家禽白血病参考实验室

所在单位: 中国动物疫病预防控制中心
实验室负责人: 翟新验

地址：北京市大兴区大兴生物医药产业基地天贵大街17号

邮编：102618

三、国家牛结节性皮肤病参考实验室

所在单位：中国动物卫生与流行病学中心

实验室负责人：李金明

地址：青岛市红岛经济区岈东南路21号

邮编：266032

四、国家伪狂犬病参考实验室

所在单位：华中农业大学

实验室负责人：何启盖

地址：湖北省武汉市洪山区狮子山街1号

邮编：430070

五、国家口蹄疫专业实验室（北京）

所在单位：中国动物疫病预防控制中心

实验室负责人：吴佳俊

地址：北京市大兴区大兴生物医药产业基地天贵大街17号

邮编：102618

六、国家口蹄疫专业实验室（青岛）

所在单位：中国动物卫生与流行病学中心

实验室负责人：陈义平

地址：青岛市红岛经济区岈东南路21号

邮编：266032

中华人民共和国农业农村部公告

第 889 号

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续深化行政审批制度改革，最大程度利企便民，农业农村部决定对有关行政审批服务作进一步优化。现将有关事项公告如下。

一、进口水生野生动物制品实行批量审批，准许将出口国（地区）濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）履约机构出具的出口计划书作为合法进口来源证明材料，一次性批准申请人的年度进口数量，根据实际进口情况逐笔核减。

二、购置远洋渔船申请从事远洋渔业项目的，实行快速审批机制，申请人可同时申请渔业船网工具指标和远洋渔业项目。

三、减少肥料续展登记申请材料，将原要求中的每年2个批次产品质量检验报告，调整为每年1个批次

经计量认证的具备肥料承检能力的检验机构出具的产品质量检验报告。

本公告自公布之日起施行。

农业农村部
2025年3月18日

中华人民共和国农业农村部公告

第 890 号

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经审查，批准西班牙海博莱生物大药厂生产的猪水肿病亚单位疫苗在我国注册，核发《进口兽药注册证书》，并发布上述兽药质量标准、说明书和标签，自发布之日起执行。

批准勃林格殷格翰动物保健（美国）有限公司（St.Joseph生产厂）等3家公司生产的猪回肠炎活疫苗等3种兽药产品在我国再注册，核发《进口兽药注册证书》，并发布修订后的质量标准、说明书和标签，自发布之日起执行。此前发布的上述3种兽药质量标准、说明书和标签同时废止。

批准KVP Kiel有限责任公司等2家公司生产的复方非班太尔片等2种兽药产品在我国变更注册。
特此公告。

- 附件：1.进口兽药注册目录
2.质量标准
3.说明书和标签

农业农村部
2025年3月21日

附件1

进口兽药注册目录

兽药名称	生产厂名称	国别	进口兽药注册证书号	有效期限	备注
猪水肿病亚单位疫苗 Swine Edema Disease Subunit Vaccine	西班牙海博莱生物大药厂 Laboratorios HIPRA, S.A.	西班牙	(2025) 外兽药证字 05号	2025.03.21 — 2030.03.20	注册
猪回肠炎活疫苗 Lawsonia Intracellularis Vaccine, Live	勃林格殷格翰动物保健 (美国)有限公司 (St.Joseph生产厂) Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.	美国	(2020) 外兽药证字 29号	2025.03.21 — 2030.03.20	再注册 (进口兽药注册证书号不变)

续表

兽药名称	生产厂名称	国别	进口兽药 注册证书号	有效期限	备注
猪伪狂犬病灭活疫苗 (Bartha K61株) Swine Pseudorabies Vaccine, Inactivated (Strain Bartha K61)	西班牙海博莱生物大药厂 Laboratorios HIPRA, S.A.	西班牙	(2020) 外兽药证字 16号	2025.03.21 — 2030.03.20	再注册 (进口兽药注册证书号不变)
鸡马立克氏病活疫苗 (CVI988株) Marek's Disease Vaccine, Live (Strain CVI988)	勃林格殷格翰动物 保健(美国)有限公司 (Gainesville生产厂) Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.	美国	(2020) 外兽药证字 09号	2025.03.21 — 2030.03.20	再注册 (进口兽药注册证书号不变)
复方非班太尔片 Compound Febantel Tablets	KVP Kiel有限责任公司 KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	德国	(2019) 外兽药证字 41号	2024.03.14 — 2029.03.13	变更注册: 增加原料药产地海正药 业南通有限公司
伊维菌素注射液 (50ml:0.5g) Ivermectin Injection	勃林格殷格翰动物保健 (巴西)有限公司 Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda	巴西	(2021) 外兽药证字 31号	2021.04.27 — 2026.04.26	变更注册: 生产厂地址由 “Fazenda São Francisco, s/n, Jardim Itapoan, Paulínia/SP, CEP 13.140-970, Brasil” 变更 为 “Avenida Doutor Roberto Moreira N° 5005, Recanto dos Pássaros, Paulínia-SP, CEP: 13148-914, Brasil”
伊维菌素注射液 (100ml:1.0g) Ivermectin Injection			(2021) 外兽药证字 32号		
伊维菌素注射液 (200ml:2.0g) Ivermectin Injection			(2021) 外兽药证字 33号		

附件2(略)

附件3

说明书和标签

一、猪水肿病亚单位疫苗说明书和标签

(一) 猪水肿病亚单位疫苗说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称: 猪水肿病亚单位疫苗
商品名称: 喜立康
英文名称: Swine Edema Disease Subunit Vaccine
汉语拼音: Zhu Shuizhongbing Yadanweiyimiao

【主要成分和含量】 每头份(1ml)疫苗含有: 重组verotoxin 2e 600UEMA。

【性状】 白色悬液

【作用与用途】 用于预防猪水肿病。免疫产生期为免疫后第21天; 免疫持续期为免疫后112天。

【用法与用量】 颈部肌肉注射, 2日龄以上仔猪接种1次, 剂量为1ml。

【不良反应】 无

【注意事项】 1.本疫苗仅用于接种健康猪。

2.避免冷冻和光照。

3.在冷藏状态(2~8℃)保存和运输。

4.使用前, 将疫苗恢复到室温, 并摇匀。

5.疫苗瓶启封后, 立即使用, 应在10小时内使用完。

6.接种部位会出现轻微的炎症, 不需要治疗, 3天内会自动消失。接种当天可能会出现轻微的抑郁。

7.此疫苗不推荐在怀孕和泌乳期使用。

8.用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】 (1) 10头份/瓶 (2) 50头份/瓶 (3) 100头份/瓶 (4) 250头份/瓶

【包装】 1瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为24个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 西班牙海博莱生物大药厂 Laboratorios HIPRA, S.A.

地址: Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain

仅在兽医指导下使用

(二) 猪水肿病亚单位疫苗标签

兽用

猪水肿病亚单位疫苗

10 (50、100、250) 头份/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防猪水肿病。免疫产生期为免疫后第21天; 免疫持续期为免疫后112天。

【用法与用量】 颈部肌肉注射, 2日龄以上仔猪接种1次, 剂量为1ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为24个月。

【生产企业】 西班牙海博莱生物大药厂 Laboratorios HIPRA, S.A.

仅在兽医指导下使用

二、猪回肠炎活疫苗说明书和标签

(一) 猪回肠炎活疫苗说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称: 猪回肠炎活疫苗
商品名称: 无
英文名称: Lawsonia Intracellularis Vaccine, Live
汉语拼音: Zhuhuichangyan Huoyimiao

【主要成分与含量】 用胞内劳森氏菌致弱株B3903的间接荧光抗体法检测, 疫苗滴度应不少于 $10^{4.9}$ TCID₅₀/头份。

【性状】 淡黄色至金色海绵状疏松团块, 易与瓶壁脱离, 加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防由胞内劳森氏菌引起的猪回肠炎(猪增生性肠炎)。

【用法与用量】 3周龄或3周龄以上猪, 每头猪通过口服或饮水方式服用1头份(2ml或1ml)剂量。免疫后3周产生免疫保护力, 免疫期为22周。

【不良反应】 本品接种后可能会发生过敏反应, 可使用肾上腺素进行治疗。

【注意事项】 1.不要使疫苗冻结。

2.稀释后的疫苗应立即使用。

3.屠宰前21日禁用。

4.用过的疫苗瓶、用具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

5.免疫前后3日之内禁用抗生素或消毒剂。

6.使用本品期间, 所有材料中应无抗生素或消毒剂残留, 以免灭活疫苗或降低效价。

【规格】 (1)10头份/瓶 (2)50头份/瓶 (3)100头份/瓶

【包装】 1瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 勃林格殷格翰动物保健(美国)有限公司(St.Joseph生产厂)

(Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.)

地址: 2621 North Belt Highway St.Joseph, MO 64506 USA

仅在兽医指导下使用

(二)猪回肠炎活疫苗标签

兽用

猪回肠炎活疫苗

10(50、100)头份/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防由胞内劳森氏菌引起的猪回肠炎(猪增生性肠炎)。

【用法与用量】 3周龄或3周龄以上猪, 每头猪通过口服或饮水方式服用1头份(2ml或1ml)剂量。免疫后3周产生免疫保护力, 免疫期为22周。

【注意事项】 不要使疫苗冻结; 稀释后的疫苗应立即使用; 屠宰前21日内禁用; 用过的疫苗瓶、用具

和未用完的疫苗等应进行无害化处理；免疫前后3日之内禁用抗生素或消毒剂；使用本品期间，所有材料中应无抗生素或消毒剂残留，以免灭活疫苗或降低效价。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为18个月。

【生产企业】 勃林格殷格翰动物保健（美国）有限公司（St.Joseph生产厂）
（Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.）

地址：2621 North Belt Highway St.Joseph, MO 64506 USA

仅在兽医指导下使用

三、猪伪狂犬病灭活疫苗（Bartha K61株）说明书和标签

（一）猪伪狂犬病灭活疫苗（Bartha K61株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：猪伪狂犬病灭活疫苗（Bartha K61株）

商品名称：无

英文名称：Swine Pseudorabies Vaccine, Inactivated (Strain Bartha K61)

汉语拼音：Zhu Weikuangquanbing Miehuoyimiao (Bartha K61 Zhu)

【主要成分与含量】 含猪伪狂犬病病毒gE基因缺失Bartha K61株，灭活前病毒滴度至少为 $10^{7.5}$ TCID₅₀/头份。

【性状】 略带粉红色的均匀乳剂。

【作用与用途】 用于预防猪伪狂犬病。

【用法与用量】 颈部肌肉深部注射。2月龄以上的猪，每头2ml（含1头份）。

种猪 后备种猪进入猪舍时，进行一次免疫接种，间隔4~5周，进行第二次免疫接种；对于以前没有接种的种猪，也按同样的方法接种两次。怀孕母猪在每次妊娠40~60日时进行接种。种公猪，每隔6个月接种一次。

育肥猪 在2月龄时免疫接种2ml（含1头份）的疫苗，3~4周后进行第二次免疫接种。

【不良反应】 个别猪接种后可能会出现过敏现象，对出现过敏现象的猪应立即使用抗组胺药物进行脱敏治疗。

【注意事项】 1.使用前应先将疫苗恢复至室温。

2.疫苗应避光保存，切勿冻结。

3.使用前应充分摇匀。

4.用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】 20头份（40ml）/瓶

【包装】 （1）1瓶/盒 （2）2瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为18个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 西班牙海博莱生物大药厂 Laboratorios HIPRA, S.A.

地址: Avda. la Selva, 135 – 17170 Amer (Girona), Spain

仅在兽医指导下使用

(二) 猪伪狂犬病灭活疫苗 (Bartha K61株) 标签

兽用

猪伪狂犬病灭活疫苗 (Bartha K61株)

20头份 (40ml) /瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防猪伪狂犬病。

【用法与用量】 颈部肌肉深部注射。2月龄以上的猪, 每头2ml (含1头份)。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。

【生产企业】 西班牙海博莱生物大药厂 Laboratorios HIPRA, S.A.

仅在兽医指导下使用

四、鸡马立克氏病活疫苗 (CVI988株) 说明书和标签

(一) 鸡马立克氏病活疫苗 (CVI988株) 说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称: 鸡马立克氏病活疫苗 (CVI988株)

商品名称: 无

英文名称: Marek's Disease Vaccine, Live (Strain CVI988)

汉语拼音: Ji Malikeshibing Huoyimiao (CVI988 Zhu)

【主要成分与含量】 每羽份疫苗含鸡马立克氏病病毒 (CVI988株) 至少2000PFU。

【性状】 均一淡红色细胞悬液。

【作用与用途】 用于接种1日龄雏鸡, 预防鸡马立克氏病。

【用法与用量】 雏鸡颈背部皮下注射。每次从液氮罐中取出1安瓿疫苗, 置20~30℃水中, 使疫苗快速解冻。用无菌注射器将解冻的疫苗慢慢注入适量的稀释液中 (每1000羽份疫苗用200ml无菌稀释液稀释), 通过旋转或倒转容器使疫苗液充分混匀, 切勿剧烈振荡。每只0.2ml。针头不可伤及颈部肌肉或骨头。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】 1.应将接种器械于121℃高压灭菌至少15分钟或置沸水浴中消毒至少20分钟。不要让接种器械接触化学消毒剂。

2.本品仅用于接种健康雏鸡。

3.在接种过程中或接种后, 应避免使鸡群处于应激状态。

4.疫苗开瓶后应一次用完。

5.用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

6.屠宰前21日内禁止使用。

【规格】 (1)1000羽份/瓶 (2)2000羽份/瓶

【贮藏与有效期】 在液氮中保存,有效期为18个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 勃林格殷格翰动物保健(美国)有限公司(Gainesville生产厂)

(Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.)

地址: 1168 Airport Parkway, SW, Gainesville, GA 30501, USA

仅在兽医指导下使用

(二)鸡马立克氏病活疫苗(CVI988株)标签

兽用

鸡马立克氏病活疫苗(CVI988株)

1000(2000)羽份/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

有效期至:

【生产企业】 勃林格殷格翰动物保健(美国)有限公司(Gainesville生产厂)

(Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.)

仅在兽医指导下使用

中华人民共和国农业农村部公告

第 891 号

根据《农产品质量安全检测机构考核办法》规定,经考核评审等相关程序,现对9家部级质检中心有关情况公告如下。

中国水产科学研究院东海水产研究所[农业农村部水产品质量检验检测中心(上海)]等9家机构通过了国家级农产品质量安全检测机构考核复查评审(见附件)。

特此公告。

附件: 2025年国家级农产品质量安全检测机构考核名单(第三批)

农业农村部

2025年3月20日

附件

2025年国家级农产品质量安全检测机构考核名单
(第三批)

序号	机构名称	检测范围	机构法定代表人	通讯地址	邮编	联系电话	考核合格证书编号
1	中国水产科学研究院东海水产研究所[农业农村部水产品质量检验检测测试中心(上海)]	水产品、水产种质及渔业环境	方辉	上海市杨浦区军工路300号3号楼	200090	021—65680121	[2025]农质检核(国)字第0056号
2	重庆市农业科学院[农业农村部农产品质量安全检验检测测试中心(重庆)]	农产品	苟小红	重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道	401329	023—65717011	[2025]农质检核(国)字第0013号
3	广西壮族自治区土壤肥料工作站(广西壮族自治区土壤肥料测试中心)[农业农村部肥料质量检验检测测试中心(南宁)]	土壤、肥料及农产品	黄文校	广西壮族自治区南宁市西乡塘区凤岭路6号	530007	0771—2202869	[2025]农质检核(国)字第0190号
4	广西壮族自治区农业科学院[农业农村部甘蔗品质检验检测测试中心(南宁)]	甘蔗及制品	邓国富	广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路174号	530007	0771—3899306	[2025]农质检核(国)字第0226号
5	江苏省农产品质量检验检测测试中心[农业农村部农产品质量安全检验检测测试中心(南京)]	农业环境、农产品及转基因产品成分	周国义	江苏省南京市鼓楼区草场门大街124号	210036	025—86229784	[2025]农质检核(国)字第0005号
6	北京市农产品质量安全中心[农业农村部农业环境质量检验检测测试中心(北京)]	农业环境及农产品	于寒冰	北京市西城区裕民中路6号	100029	010—62049920	[2025]农质检核(国)字第0098号
7	中国农业大学[农业农村部兽药安全检验检测测试中心(北京)]	兽药残留	孙其信	北京市海淀区圆明园西路2号	100193	010—62732802	[2025]农质检核(国)字第0088号
8	山东农业大学[农业农村部谷物品质检验检测测试中心(泰安)]	谷物品质	冷畅俭	山东省泰安市岱宗大街61号	271018	0538—8248196	[2025]农质检核(国)字第0037号
9	北京市农林科学院[农业农村部果品及苗木质量检验检测测试中心(北京)]	果品及苗木	燕继晔	北京市海淀区香山瑞王坟甲12号	100093	010—62591596	[2025]农质检核(国)字第0177号

中华人民共和国农业农村部公告

第 892 号

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定,经审查,批准中国农业科学院兰州兽医研究所等19家单位申报的牛口蹄疫病毒O型、A型二价病毒样颗粒疫苗等5种兽药产品为新兽药,核发《新兽药注册证书》,发布产品质量标准、工艺规程、说明书和标签,自发布之日起执行。

批准北京纳百生物科技有限公司等6家单位申报的猫泛白细胞减少症病毒荧光PCR检测试剂盒等4种兽药产品注册,发布产品质量标准、工艺规程、说明书和标签,自发布之日起执行。批准齐鲁制药(内蒙古)有限公司申报的亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂注册,发布产品质量标准、工艺规程、说明书和标签、残留检测方法标准(试行),自发布之日起执行。

批准北京生泰尔科技股份有限公司等10家单位申报的茵栀黄口服液等3种兽药产品变更注册,发布修订后的质量标准、工艺规程、说明书和标签,自发布之日起执行,此前发布的该产品质量标准、工艺规程、说明书和标签同时废止。

特此公告。

附件: 1.新兽药注册目录

2.兽药变更注册目录

3.质量标准

4.工艺规程

5.说明书和标签

6.残留检测方法标准(试行)

农业农村部

2025年3月21日

附件1

新兽药注册目录

新兽药名称	研制单位	类别	新兽药注册证书号	监测期
牛口蹄疫病毒O型、A型二价病毒样颗粒疫苗	中国农业科学院兰州兽医研究所、华宇生物科技(腾冲)有限公司、中农威特生物科技股份有限公司、天津威特生物医药有限责任公司、华派生物技术(集团)股份有限公司	一类	(2025)新兽药证字17号	5年
鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病、禽腺病毒病(I群, 4型)五联灭活疫苗(N7a株+M41株+HF株+rVP2蛋白+Fiber-2蛋白)	普莱柯生物工程股份有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司、吉林正业生物制品股份有限公司	一类	(2025)新兽药证字18号	5年

续表

新兽药名称	研制单位	类别	新兽药注册证书号	监测期
鸽新城疫灭活疫苗（P-VI株）	扬州大学、中崇信诺生物科技泰州有限公司、广东永顺生物制药股份有限公司、哈药集团生物疫苗有限公司、江西博美莱生物科技有限公司	二类	（2025）新兽药证字19号	4年
芭蕉补骨胶囊	北京生泰尔科技股份有限公司、爱迪森（北京）生物科技有限公司、生泰尔（内蒙古）科技有限公司、北京爱宠族科技有限公司、爱宠族（江苏）科技有限公司、五洲牧洋（黑龙江）科技有限公司	三类	（2025）新兽药证字20号	3年
鸡新城疫、禽流感（H9亚型）、传染性法氏囊病、禽腺病毒病（I群，4型）四联灭活疫苗（N7a株+HF株+rVP2蛋白+Fiber-2蛋白）	普莱柯生物工程股份有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司	三类	（2025）新兽药证字21号	3年
猫泛白细胞减少症病毒荧光PCR检测试剂盒	北京纳百生物科技有限公司	/	/	/
小反刍兽疫病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒	中国动物疫病预防控制中心、禾旭（郑州）生物技术有限公司	/	/	/
头孢噻呋晶体	湖北龙翔药业科技股份有限公司、瑞普（天津）生物药业有限公司	/	/	/
头孢噻呋晶体注射液（猪用）	瑞普（天津）生物药业有限公司、内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司	/	/	/
亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂	齐鲁制药（内蒙古）有限公司	/	/	/

附件2

兽药变更注册目录

兽药名称	申请单位	兽药标准来源	变更事项	监测期（针对变更事项）
茵栀黄口服液	北京生泰尔科技股份有限公司、爱迪森（北京）生物科技有限公司	（2016）新兽药证字4号	增加靶动物猫	3年
狂犬病灭活疫苗（SAD株）	常州同泰生物药业科技股份有限公司、武汉科前生物股份有限公司、北京安宇科贸有限责任公司、上海海利生物技术股份有限公司	（2011）新兽药证字49号	对该制品质量标准、工艺规程、说明书和内包装标签进行修改	/
猪圆环病毒2型灭活疫苗（SH株，II）	江苏南农高科技股份有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司、南京农业大学、中牧实业股份有限公司	（2016）新兽药证字59号	对该制品质量标准、工艺规程、说明书和内包装标签进行修改	/

附件3(略)

附件4(略)

附件5

说明书和标签

一、牛口蹄疫病毒O型、A型二价病毒样颗粒疫苗说明书和标签

(一)牛口蹄疫病毒O型、A型二价病毒样颗粒疫苗说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 牛口蹄疫病毒O型、A型二价病毒样颗粒疫苗

商品名称 无

英文名称 Bovine Foot-and-Mouth Disease Virus Type O and Type A Virus-like Particles Bivalent Vaccine

汉语拼音 NiuKoutiyiBingdu Oxing AXing Erjia BingduyangKeli Yimiao

【主要成分与含量】 每头份疫苗中牛口蹄疫O型病毒样颗粒抗原蛋白的含量为52.5μg,牛口蹄疫A型病毒样颗粒抗原蛋白的含量为52.5μg。

【性状】 乳白色乳剂。

【作用与用途】 用于预防牛O型和A型口蹄疫。接种后3周产生免疫力,免疫期为6个月。

【用法与用量】 肌肉注射,犊牛90日龄左右进行初免,每头2.0ml,间隔30日进行加强免疫,之后每间隔4~6月加强免疫1次。

【不良反应】 一般无不良反应。偶见注射部位肿胀,一过性体温反应,减食或停食1~2日,一般在注射疫苗后3~5日症状减轻,逐渐恢复正常。因品种、个体的差异,个别动物接种后可能出现急性过敏反应,如焦躁不安、呼吸加快、肌肉震颤、可视黏膜充血、鼻腔出血等,抢救不及时可导致死亡;少数怀孕牲畜可能出现流产。

【注意事项】 (1)本疫苗仅用于接种健康牛。对怀孕前期和后 期母畜、断奶前幼畜及长途运输后的牲畜暂不注射,待牲畜恢复正常后方可注射。

(2)疫苗应在2~8℃条件下冷藏运输。运输和使用过程中避免日光直接照射。

(3)使用前应仔细检查疫苗。疫苗中若有异物、瓶体有裂纹或封口不严、破乳、变质、已过有效期或未在规定条件下保存的,均不得使用。使用时应将疫苗恢复至室温并充分摇匀。疫苗瓶开启后限当日用完。

(4)严格遵守免疫注射操作规程。注射器具和注射部位应严格消毒,每头动物更换一次针头。曾接触过病畜的人员,在更换衣、帽、鞋和进行必要消毒之后,方可参与疫苗注射。

- (5) 应由经过培训的专业人员进行免疫注射。注射时, 入针深度要适中, 注射剂量要准确。
- (6) 疫苗对安全区、受威胁区、疫区牛均可使用。必须先注射安全区的牲畜, 然后注射受威胁区的牲畜, 最后再注射疫区内的牲畜。
- (7) 在非疫区, 注射疫苗21日后方可移动或调运牲畜。
- (8) 注射疫苗后应注意观察注苗动物的反应, 个别动物出现严重过敏反应时, 应及时使用肾上腺素等药物进行抢救, 同时采用适当的辅助治疗措施。
- (9) 对用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗应收集后进行无害化处理, 不得随意丢弃, 避免污染环境。
- (10) 接种疫苗只是预防、控制口蹄疫的重要措施之一, 同时还应采取消毒、隔离、封锁等其它综合防治措施。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 牛口蹄疫病毒O型、A型二价病毒样颗粒疫苗内包装标签

兽用

牛口蹄疫病毒O型、A型二价病毒样颗粒疫苗

批准文号:

批 号:

有效期至:

【用法与用量】 肌肉注射, 犍牛90日龄左右进行初免, 每头2.0ml, 间隔30日进行加强免疫, 之后每隔4~6月加强免疫1次。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

二、鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病、禽腺病毒病(I群, 4型)五联灭活疫苗(N7a株+M41株+HF株+rVP2蛋白+Fiber-2蛋白)说明书和标签

(一) 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病、禽腺病毒病(I群, 4型)五联灭活疫苗(N7a株+M41株+HF株+rVP2蛋白+Fiber-2蛋白)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9亚型）、传染性法氏囊病、禽腺病毒病（I群，4型）五联灭活疫苗（N7a株+M41株+HF株+rVP2蛋白+Fiber-2蛋白）

商品名称

英文名称 Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza (Subtype H9), Infectious Bursal Disease and Fowl Adenovirus Disease (Group I, Serotype 4) Vaccine, Inactivated (Strain N7a+Strain M41+Strain HF+Protein rVP2+Protein Fiber-2)

汉语拼音 Ji Xinchengyi ChuanranxingZhiqiguanyan Qinliugan (H9 Yaxing) ChuanranxingFashinangbing Qinxianbingdubing (I Qun,4 Xing) Wulian MiehuoYimiao (N7a Zhu+M41 Zhu+HF Zhu+rVP2 Danbai+Fiber-2 Danbai)

【主要成分与含量】 疫苗中含有灭活的鸡新城疫病毒N7a株、鸡传染性支气管炎病毒M41株、禽流感（H9亚型）病毒HF株，纯化过滤的鸡传染性法氏囊病病毒VP2蛋白液和I群禽腺病毒（4型）Fiber-2蛋白液。水相中混合抗原终浓度为鸡新城疫病毒N7a株灭活前病毒含量为 $10^{8.5}$ EID₅₀/0.1ml，传染性支气管炎病毒M41株灭活前病毒含量为 $10^{6.0}$ EID₅₀/0.1ml，禽流感（H9亚型）病毒HF株灭活前病毒含量为 $10^{8.0}$ EID₅₀/0.1ml。鸡传染性法氏囊病病毒VP2蛋白液琼扩效价为1:16，I群禽腺病毒（4型）Fiber-2蛋白液琼扩效价为1:4。

【性状】 乳白色均匀乳剂。

【作用与用途】 用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎、H9亚型禽流感、传染性法氏囊病和I群禽腺病毒（4型）病。7~14日龄鸡，免后21日产生免疫力，免疫期为4个月；14日龄以上鸡，免后21日产生免疫力，免疫期为6个月。

【用法与用量】 皮下或肌肉注射。7~14日龄鸡，每只0.3ml；14日龄以上鸡，每只0.5ml。

【不良反应】 一般无可见不良反应。

【注意事项】 （1）该疫苗免疫前应使用鸡传染性支气管炎活疫苗作基础免疫。

（2）仅用于接种健康鸡。

（3）使用前须检查，如出现变色、破乳、破漏、混有异物等均不得使用。

（4）使用前应使疫苗恢复至室温，并充分摇匀。

（5）疫苗开启后限24小时内用完。

（6）接种器具应无菌，注射部位应消毒。

（7）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

（8）疫苗运输及保存切勿冻结或高温，破乳后切勿使用。

（9）屠宰前28日内禁止使用。

【规格】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为18个月。

【包装】

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病、禽腺病毒病(I群, 4型)五联灭活疫苗(N7a株+M41株+HF株+rVP2蛋白+Fiber-2蛋白)内包装标签

兽用

鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病、禽腺病毒病(I群, 4型)五联灭活疫苗(N7a株+M41株+HF株+rVP2蛋白+Fiber-2蛋白)

批准文号:
批 号:
有效期至:

【用法与用量】 皮下或肌肉注射。7~14日龄鸡, 每只0.3ml; 14日龄以上鸡, 每只0.5ml。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。
【生产企业】

仅在兽医指导下使用

三、鸽新城疫灭活疫苗(P-VI株)说明书和标签

(一) 鸽新城疫灭活疫苗(P-VI株)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 鸽新城疫灭活疫苗(P-VI株)
商品名称 无
英文名称 Pigeon Newcastle Disease Vaccine, Inactivated (Strain P-VI)
汉语拼音 Ge Xinchengyi MiehuoYimiao (P-VI Zhu)

【主要成分与含量】 疫苗中含灭活的重组鸽新城疫病毒P-VI株, 病毒含量为 $10^{8.0}$ EID₅₀/0.1ml。
【性状】 乳白色均匀乳剂。

【作用与用途】 用于预防鸽(赛鸽除外)的新城疫。接种后21日产生免疫力, 30日龄以上鸽, 免疫期为3个月; 30日龄鸽首免后, 至4月龄或开产前加强免疫, 免疫期为6个月。

【用法与用量】 胸部肌肉注射。30日龄以上鸽, 每只0.5ml; 30日龄鸽免疫, 4月龄或开产前加免一次, 每只0.5ml。

【不良反应】 一般无明显的不良反应。

- 【注意事项】 (1) 仅用于健康鸽的免疫接种。
(2) 用前须仔细检查疫苗, 如出现变色、破乳、破漏、混有异物等均不得使用。
(3) 使用前, 应先使疫苗应恢复至室温, 并充分摇匀。
(4) 接种器具应无菌, 接种部位应消毒。
(5) 疫苗启封后, 限当日使用。
(6) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。
(7) 疫苗运输和使用过程中切勿冻结和高温。
(8) 屠宰前28日内禁止使用。

【规格】
【包装】
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。
【批准文号】
【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 鸽新城疫灭活疫苗(P-VI株)内包装标签

兽用

鸽新城疫灭活疫苗(P-VI株)

批准文号:
批 号:
有效期至:

【作用与用途】 详见说明书。
【用法与用量】 胸部肌肉注射。30日龄以上鸽, 每只0.5ml; 30日龄鸽免疫, 4月龄或开产前加免一次, 每只0.5ml。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。
【生产企业】

仅在兽医指导下使用

四、芭蕉补骨胶囊说明书和标签

(一) 芭蕉补骨胶囊说明书

宠物用

【兽药名称】
通用名称 芭蕉补骨胶囊
商品名称
汉语拼音 Bajiao Bugu Jiaonang

【主要成分】 芭蕉根、酢浆草、补骨脂、续断、三七。

【性状】 本品为硬胶囊, 内容物为黄棕色至棕色的粉末。

【功能与主治】 滋补肝肾, 强筋壮骨, 通络止痛。主治犬骨关节炎属肝肾不足, 经络淤阻者。

【用法与用量】 内服: 一次量, 每1kg体重, 犬0.08~0.16g, 一日2次, 连用14日。或根据体重按下表推荐用量使用。或遵医嘱。

体重(kg)	≤5	>5~10	>10~15	>15~20	>20~25
一次量(粒)	1	2	3	4	5
体重(kg)	>25~30	>30~35	>35~40	>40~45	>45~50
一次量(粒)	6	7	8	9	10

【不良反应】 暂未发现不良反应。

【注意事项】

(1) 避免与肝毒性的药物联合使用。

(2) 肝功能异常的犬应遵医嘱使用。

(3) 长期连续用药的犬应遵医嘱使用。

【规格】 每粒装0.4g (相当于原生药2.05g)。

【包装】

【贮藏】 密封

【有效期】 24个月

【批准文号】

【生产企业】

(二) 芭蕉补骨胶囊标签

宠物用

【兽药名称】

通用名称 芭蕉补骨胶囊

商品名称

汉语拼音 Bajiao Bugu Jiaonang

【主要成分】 芭蕉根、酢浆草、补骨脂、续断、三七。

【性状】 本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至棕色的粉末。

【功能与主治】 滋补肝肾，强筋壮骨，通络止痛。主治犬骨关节炎属肝肾不足，经络淤阻者。

【用法与用量】 内服：一次量，每1kg体重，犬0.08~0.16g，一日2次，连用14日。或根据体重按下表推荐用量使用。或遵医嘱。

体重(kg)	≤5	>5~10	>10~15	>15~20	>20~25
一次量(粒)	1	2	3	4	5
体重(kg)	>25~30	>30~35	>35~40	>40~45	>45~50
一次量(粒)	6	7	8	9	10

【规格】 每粒装0.4g (相当于原生药2.05g)。

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【包装】

【贮藏】 密封

【生产企业】

五、鸡新城疫、禽流感（H9亚型）、传染性法氏囊病、禽腺病毒病（I群，4型）四联灭活疫苗（N7a株+HF株+rVP2蛋白+Fiber-2蛋白）说明书和标签

（一）鸡新城疫、禽流感（H9亚型）、传染性法氏囊病、禽腺病毒病（I群，4型）四联灭活疫苗（N7a株+HF株+rVP2蛋白+Fiber-2蛋白）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 鸡新城疫、禽流感（H9亚型）、传染性法氏囊病、禽腺病毒病（I群，4型）四联灭活疫苗（N7a株+HF株+rVP2蛋白+Fiber-2蛋白）

商品名称

英文名称 Newcastle Disease, Avian Influenza (Subtype H9), Infectious Bursal Disease and Fowl Adenovirus Disease (Group I, Serotype 4) Vaccine, Inactivated (Strain N7a+Strain HF+Protein rVP2+Protein Fiber-2)

汉语拼音 Ji Xinchengyi Qinliugan (H9 Yaxing) ChuanranxingFashinangbing Qinxianbingdubing (I Qun, 4 Xing) Silian MiehuoYimiao (N7a Zhu+HF Zhu+rVP2 Danbai+Fiber-2 Danbai)

【主要成分与含量】 疫苗中含有灭活的鸡新城疫病毒N7a株、禽流感（H9亚型）病毒HF株，纯化过滤的鸡传染性法氏囊病病毒VP2蛋白液和I群禽腺病毒（4型）Fiber-2蛋白液。水相中混合抗原终浓度为鸡新城疫病毒N7a株灭活前病毒含量为 $10^{8.5}$ EID₅₀/0.1ml，禽流感（H9亚型）病毒HF株灭活前病毒含量为 $10^{8.0}$ EID₅₀/0.1ml。鸡传染性法氏囊病病毒VP2蛋白液琼扩效价为1:16，I群禽腺病毒（4型）Fiber-2蛋白液琼扩效价为1:4。

【性状】 乳白色均匀乳剂。

【作用与用途】 用于预防鸡新城疫、H9亚型禽流感、传染性法氏囊病和I群禽腺病毒（4型）病。7~14日龄鸡，免后21日产生免疫力，免疫期为4个月；14日龄以上鸡，免后14日产生免疫力，免疫期为6个月。

【用法与用量】 皮下或肌肉注射。7~14日龄鸡，每只0.3ml；14日龄以上鸡，每只0.5m。

【不良反应】 一般无可见不良反应。

【注意事项】 （1）仅用于接种健康鸡。

（2）使用前须检查，如出现变色、破乳、破漏、混有异物等均不得使用。

（3）使用前应使疫苗恢复至室温，并充分摇匀。

（4）疫苗开启后限24小时内用完。

（5）接种器具应无菌，注射部位应消毒。

（6）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

（7）疫苗运输及保存切勿冻结或高温，破乳后切勿使用。

（8）屠宰前28日内禁止使用。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为18个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病、禽腺病毒病(I群, 4型) 四联灭活疫苗(N7a株+HF株+rVP2蛋白+Fiber-2蛋白) 内包装标签

兽用

鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病、禽腺病毒病(I群, 4型)
四联灭活疫苗(N7a株+HF株+rVP2蛋白+Fiber-2蛋白)

批准文号:
批 号:
有效期至:

【用法与用量】 皮下或肌肉注射。7~14日龄鸡, 每只0.3ml; 14日龄以上鸡, 每只0.5ml。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。
【生产企业】

仅在兽医指导下使用

六、猫泛白细胞减少症病毒荧光PCR检测试剂盒说明书和标签

(一) 猫泛白细胞减少症病毒荧光PCR检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 猫泛白细胞减少症病毒荧光PCR检测试剂盒
商品名称 无
英文名称 Real-time PCR Kit for Detection of Feline Panleukopenia Virus
汉语拼音 MaoFanbaixibaojianshaozhengBingdu Yingguang PCR Jiance Shijihe

【主要成分与含量】

成分	含量
PCR反应液	1管(60μl/管或90μl/管或375μl/管)
内标	1管(100μl/管)
阳性对照	1管(100μl/管)
阴性对照	1管(100μl/管)
说明书	1份

【作用与用途】 用于检测猫粪便、肛拭子中猫泛白细胞减少症病毒核酸。
【用法与判定】

1 用法

1.1 试剂准备 实验前, 从试剂盒中取出PCR反应液、内标、阳性对照、阴性对照, 室温放置待试剂完

全融化，严禁加热。

1.2 样品采集处理

1.2.1 肛拭子：使用一次性采样拭子插入猫肛门内1~2厘米处，旋转2圈，采样后放入含1ml生理盐水的采样试管内，手持采样拭子使拭子头部来回挤压管壁5次，除去多余拭子杆；盖紧管盖，做样品标记，涡旋震荡10秒，用离心机7000r/min离心10秒，取样本上清液200μl，加入内标2μl，然后用商品化核酸提取试剂盒进行DNA的提取和纯化。

1.2.2 粪便：采集猫粪便约0.02g或粪便悬液20μl装入1ml的生理盐水中，盖紧管盖，做样品标记，涡旋震荡10秒，用离心机7000r/min离心10秒，取样本上清液200μl，加入内标2μl，然后用商品化核酸提取试剂盒进行DNA的提取和纯化。

1.3 荧光PCR检测

1.3.1 配制PCR反应体系

根据待检样品数(N)，准备N+2个PCR反应管，按照下表在PCR反应管中配制PCR反应体系，配制后盖紧管盖并做样品标记，瞬时离心10秒，转移至扩增区。

成分	体积
PCR反应液	15μl
样品核酸/阳性对照/阴性对照	5μl
总体积	20μl

1.3.2 PCR扩增

仪器开机预热，将配好PCR反应体系的反应管放入扩增槽内，盖紧仪器盖，设置仪器，选择检测项目，运行仪器。扩增参数和检测通道见下表。

PCR扩增参数

阶段	温度	时间	循环数
1	95℃	3min	1
2	95℃	5s	40
	60℃	15s（采集荧光信号）	

荧光信号通道的设置

靶标	报告基团	淬灭基团	参比荧光
猫泛白细胞减少症病毒核酸	FAM	None	None
内标	VIC	None	

2 判定

2.1 试验成立条件 阳性对照VIC通道Ct值≤29.8，FAM通道Ct值≤29.3，且有典型的扩增曲线；阴性对照VIC通道Ct值≤29.8，且有典型的扩增曲线，FAM通道无Ct值，且无典型扩增曲线。以上要求需要在同一次试验中同时满足，否则本次试验无效，需重新进行。

2.2 结果判定 阈值线依据仪器噪声情况进行调整,阈值线设置在扩增曲线指数增长期的中后期。在VIC通道Ct值 ≤ 29.8 ,且有典型的扩增曲线时,根据FAM通道Ct值与扩增曲线进行结果判定。

2.2.1 FAM通道Ct值 ≤ 35.5 ,且有明显扩增曲线,该样品判为阳性。

2.2.2 $35.5 < \text{FAM通道Ct值} < 40.0$,该样品判为可疑,可疑的样品复检一次,根据复检结果进行判定,如仍为可疑,则判为阳性。

2.2.3 FAM通道无Ct值,且无明显扩增曲线,则判为阴性。

【注意事项】 (1) 实验前请仔细阅读本试剂盒说明书,严格按步骤执行,不使用本试剂盒提供的组份或不按照说明书进行实验可能导致错误结果。

(2) 所有试剂应在 -15°C 及以下保存,使用前应充分混匀。试剂盒应避免多次反复冻融。

(3) 实验操作应按照国家有关临床基因扩增实验室管理规范执行,实验过程应分区(试剂准备区、样品制备区、核酸扩增区),各区物品为专用,不得交叉使用,避免污染。

(4) 操作台、移液器、离心机等仪器应用1%次氯酸钠、75%酒精或紫外灯进行消毒,移液枪头、离心管等应选用无核酸酶耗材。

(5) 待检样品、试剂盒组份及实验中的废弃物需按照具有潜在传染性物质处理方法进行处理。

(6) 为防止荧光干扰,应避免使用含荧光物质的手套,避免用手直接接触,预防交叉污染。

(7) 检测结果为阴性,并不完全代表为非感染状态,具体诊断需结合兽医临床。

【规格】 4T/盒或6T/盒或25T/盒。

【贮藏与有效期】 -15°C 及以下冷冻避光保存,有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

(二) 猫泛白细胞减少症病毒荧光PCR检测试剂盒标签文字样稿

兽用

猫泛白细胞减少症病毒荧光PCR检测试剂盒

4T/盒或6T/盒或25T/盒

批准文号:

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 -15°C 及以下冷冻避光保存,有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

PCR反应液

60 μl /管或90 μl /管或375 μl /管

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 -15℃及以下冷冻避光保存, 有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

内标

100μl/管
批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 -15℃及以下冷冻避光保存, 有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照

100μl/管
批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 -15℃及以下冷冻避光保存, 有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照

100μl/管
批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 -15℃及以下冷冻避光保存, 有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

七、小反刍兽疫病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒说明书和标签

(一)小反刍兽疫病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 小反刍兽疫病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒
商品名称
英文名称 Competitive ELISA Kit for Detecting Antibody of Peste Des Petits Ruminants virus
汉语拼音 XiaofanchushouyiBingdu Jingzheng ELISA Kangti JianceShijihe

【主要成分与含量】

序号	组分名称	数量		
1	PPRV抗原包被板	96T×1块	96T×2块	96T×5块
2	PPRV酶结合物	6ml×1瓶	12ml×1瓶	30ml×1瓶
3	PPRV阴性对照	0.3ml×1瓶	0.6ml×1瓶	1.5ml×1瓶
4	PPRV阳性对照	0.3ml×1瓶	0.6ml×1瓶	1.5ml×1瓶
5	显色液A	6ml×1瓶	12ml×1瓶	30ml×1瓶
6	显色液B	6ml×1瓶	12ml×1瓶	30ml×1瓶
7	终止液	6ml×1瓶	12ml×1瓶	30ml×1瓶
8	25倍浓缩洗涤液	30ml×1瓶	60ml×1瓶	60ml×2瓶
9	加样槽	1个	2个	5个
10	封板膜	2张	4张	10张
11	说明书	1份	1份	1份

【作用与用途】 用于羊血清中小反刍兽疫病毒（PPRV）抗体的检测。

【用法与判定】

1 用法

1.1 平衡 使用前, 将试剂盒从冷藏柜中取出, 放至15~25℃, 所有试剂用前轻轻旋转或震荡混匀。

1.2 洗涤工作液配制 估算洗板所需要的洗涤液的体积。使用前将25倍浓缩洗涤液用蒸馏水或纯化水25倍稀释（1份25倍浓缩洗涤液加24份纯化水, 例如: 40ml 25倍浓缩洗涤液加入960ml纯化水）。在无菌条件下配制（无菌水和无菌容器）的洗涤液可以在2~8℃条件下保存7日。

1.3 操作步骤

1.3.1 取出PPRV抗原包被板, 每块板可检测样品92份, 设阳性对照2孔、阴性对照2孔; 样品孔每孔加入25μl样品, 阴、阳对照孔每孔加入25μl PPRV阴、阳性对照, 再向以上各孔中加入50μl PPRV酶结合物, 振荡混匀。

1.3.2 在37℃条件下温育30分钟（±1分钟）。

1.3.3 将各孔的液体弃入废液筒, 用300μl洗涤液洗涤板孔, 共洗涤5次。每次洗涤后应弃去孔内的液体。在最后一次洗涤液弃去后, 将孔中残留的洗涤液在吸水纸上拍干。

1.3.4 每孔加入50μl显色液A和50μl显色液B。

1.3.5 在37℃条件下温育15分钟（±1分钟）。

1.3.6 每孔加入50μl终止液, 立即测量并且记录样品孔和对照孔的OD值（450nm）, 15分钟内读值有

兽用

PPRV抗原包被板

96孔/板

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

PPRV酶结合物

6 (12、30) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

PPRV阴性对照

0.3 (0.6、1.5) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

PPRV阳性对照

0.3 (0.6、1.5) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

显色液A

6 (12、30) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

显色液B

6 (12、30) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

终止液

6 (12、30) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

25倍浓缩洗涤液

(30、60) × (1、2) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

八、头孢噻呋晶体标签

兽用

- 【兽药名称】
通用名称 头孢噻呋晶体
英文名称 Ceftiofur Crystalline Free Acid
汉语拼音 Toubaosaifu Jingti
- 【包装规格】
- 【生产日期】
- 【生产批号】
- 【有效期】 至
- 【运输注意事项】
- 【贮藏】 避光, 密封, 20~25℃保存。
- 【批准文号】
- 【生产企业】

九、头孢噻呋晶体注射液（猪用）说明书和标签

(一) 头孢噻呋晶体注射液（猪用）说明书

兽用处方药

- 【兽药名称】
通用名称 头孢噻呋晶体注射液（猪用）
商品名称
英文名称 Ceftiofur Crystalline Free Acid Injection for Pigs
汉语拼音 ToubaosaifuJingti Zhusheye (Zhuyong)

【主要成分】 头孢噻呋晶体

【性状】 本品为灰白色至灰棕色的混悬液。

【药理作用】 头孢噻呋为动物专用的第三代广谱头孢类抗菌药物, 通过抑制细菌细菌壁的合成起杀菌作用, 对多数革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌(包括产生β-内酰胺酶的菌株)有杀菌活性。

头孢噻呋晶体注射液是一种缓释型制剂, 与头孢噻呋钠和盐酸头孢噻呋一样, 注射给药后在体内很快转化为有活性的初级代谢产物去吠喃头孢噻呋。

【适应证】 用于治疗由胸膜肺炎放线杆菌、多杀性巴氏杆菌、副猪嗜血杆菌和猪链球菌引起的猪呼吸系统疾病。

【用法与用量】 以头孢噻呋晶体计。耳后缘颈部单次肌肉注射: 每1kg体重, 猪5.0mg (即每20kg体重注射1ml)。

【不良反应】 按推荐剂量使用, 未见不良反应。

【注意事项】 (1) 使用前将药液摇匀。

- (2) 本产品仅用于猪。
- (3) 大部分的动物在3~5天内对治疗的药物起反应, 如果动物的情况没有改善, 需要考虑诊断的准确性。
- (4) 不得用于对此药物过敏的动物。
- (5) 猪每一个注射部位的注射药物剂量不得过2ml。猪体重超过40kg时需要多点注射给药。
- (6) 置于儿童无法触及处。
- 【休药期】 猪63日
- 【规格】 以头孢噻呋晶体计 50ml:5g
- 【包装】
- 【贮藏】 密闭, 20~25℃保存。
- 【有效期】 24个月; 开启后12周。
- 【批准文号】
- 【生产企业】

(二) 头孢噻呋晶体注射液(猪用) 标签

兽用处方药

- 【兽药名称】
 - 通用名称 头孢噻呋晶体注射液(猪用)
 - 商品名称
 - 英文名称 Ceftiofur Crystalline Free Acid Injection for Pigs
 - 汉语拼音 ToubaosaiFuJingti Zhusheye (Zhuyong)
- 【主要成分】 头孢噻呋晶体
- 【性状】 本品为灰白色至灰棕色的混悬液。
- 【适应证】 用于治疗由胸膜肺炎放线杆菌、多杀性巴氏杆菌、副猪嗜血杆菌和猪链球菌引起的猪呼吸系统疾病。
- 【用法与用量】 以头孢噻呋晶体计。耳后缘颈部单次肌肉注射: 每1kg体重, 猪5.0mg (即每20kg体重注射1ml)。
- 【规格】 以头孢噻呋晶体计 50ml:5g
- 【批准文号】
- 【生产日期】
- 【生产批号】
- 【有效期】 至
- 【休药期】 猪63日
- 【包装】
- 【贮藏】 密闭, 20~25℃保存。
- 【生产企业】

十、亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂说明书和标签

(一) 亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称 亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂
商品名称
英文名称 Bacitracin Methylene Disalicylate Premix
汉语拼音 Yajiaji Shuiyangsuan Ganjuntai Yuhunji

【主要成分】 亚甲基水杨酸杆菌肽

【性状】 本品为浅黄色至淡褐色粉末或颗粒。

【药理作用】 杆菌肽为多肽类抗生素，通过非特异性的阻断磷酸化酶反应，抑制细菌的黏肽合成而产生抗菌作用。杆菌肽对大多数革兰氏阳性菌如金黄色葡萄球菌、链球菌、肠球菌、梭状芽孢杆菌和棒状杆菌等均有良好的抗菌活性，对放线菌和螺旋体亦有效。敏感菌对其很少产生耐药性。

本品内服不吸收，排泄迅速。

药物相互作用：本品与青霉素、链霉素、新霉素和黏菌素等合用有协同作用。

【适应证】 用于控制产气荚膜梭菌所引起的肉鸡和蛋鸡坏死性肠炎。

【用法与用量】 以杆菌肽计。混饲：每1000kg饲料，肉鸡和蛋鸡200g，连用7日。

【不良反应】 按推荐的用法和用量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】 (1) 不得用于种禽。

(2) 本品对施药者眼、鼻和呼吸道具刺激性，使用时需做好防护，避免吸入粉尘和接触眼睛或皮肤。如果意外接触本品时可用清水清洗。施药者长期或多次接触本品可能会引起过敏反应。

(3) 废弃本品或使用过的容器应进行无害化处理。

【休药期】 鸡0日；弃蛋期0日。

【规格】 (1) 1g：100mg (4000单位) (2) 1g：150mg (6000单位)

【包装】

【贮藏】 密闭，在干燥处保存。

【有效期】 24个月

【批准文号】

【生产企业】

(二) 亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂标签

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称 亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂
商品名称
英文名称 Bacitracin Methylene Disalicylate Premix
汉语拼音 Yajiaji Shuiyangsuan Ganjuntai Yuhunji

【主要成分】 亚甲基水杨酸杆菌肽
【性状】 本品为浅黄色至淡褐色粉末或颗粒。
【适应证】 用于控制产气荚膜梭菌所引起的肉鸡和蛋鸡坏死性肠炎。
【用法与用量】 以杆菌肽计。混饲：每1000kg饲料，肉鸡和蛋鸡200g，连用7日。
【规格】 （1）1g：100mg（4000单位） （2）1g：150mg（6000单位）
【批准文号】
【生产日期】
【生产批号】
【有效期】 至
【休药期】 鸡0日；弃蛋期0日。
【包装】
【贮藏】 密闭，在干燥处保存。
【生产企业】

十一、茵栀黄口服液说明书和标签

（一）茵栀黄口服液（鸡用）说明书

兽用

【兽药名称】
通用名称 茵栀黄口服液
商品名称
汉语拼音 Yinzhihuang Koufuye
【主要成分】 茵陈提取物、栀子提取物、黄芩提取物、金银花提取物。
【性状】 本品为棕黄色至棕红色的液体。
【功能与主治】 清热解毒，保肝利胆。主治鸡脂肪肝综合征。
【用法与用量】 混饮：每1L水，鸡2ml，连用7日。
【不良反应】 暂未发现不良反应。
【注意事项】 暂无规定。
【规格】 100ml/瓶
【包装】
【贮藏】 密封，置阴凉处。
【有效期】 24个月
【批准文号】
【生产企业】

（二）茵栀黄口服液（猫用）说明书

宠物用

【兽药名称】

通用名称 茵栀黄口服液

商品名称

汉语拼音 Yinzhihuang Koufuye

【主要成分】 茵陈提取物、栀子提取物、黄芩提取物、金银花提取物。

【性状】 本品为棕黄色至棕红色的液体。

【功能与主治】 清热解毒，保肝利胆。主治猫黄疸（阳黄），症见眼部、口腔可视黏膜，耳廓等组织出现明显黄染、精神沉郁、食欲不振、呕吐；肝前性黄疸、肝性黄疸和肝后性黄疸见上述证候者。

【用法与用量】 喂服：一次量，每1kg体重，猫0.6ml，一日2次，连用7日。

【不良反应】 暂未发现不良反应。

【注意事项】 暂无规定。

【规格】 100ml/瓶

【包装】

【贮藏】 密封，置阴凉处。

【有效期】 24个月

【批准文号】

【生产企业】

（三）茵栀黄口服液（鸡用）标签

兽用

【兽药名称】

通用名称 茵栀黄口服液

商品名称

汉语拼音 Yinzhihuang Koufuye

【主要成分】 茵陈提取物、栀子提取物、黄芩提取物、金银花提取物。

【性状】 本品为棕黄色至棕红色的液体。

【功能与主治】 清热解毒，保肝利胆。主治鸡脂肪肝综合征。

【用法与用量】 混饮：每1L水，鸡2ml，连用7日。

【规格】 100ml/瓶

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【包装】

【贮藏】 密封，置阴凉处。

【生产企业】

(四)茵栀黄口服液(猫用)标签

宠物用

【兽药名称】

通用名称 茵栀黄口服液

商品名称

汉语拼音 Yinzhihuang Koufuye

【主要成分】 茵陈提取物、栀子提取物、黄芩提取物、金银花提取物。

【性状】 本品为棕黄色至棕红色的液体。

【功能与主治】 清热解毒，保肝利胆。主治猫黄疸(阳黄)，症见眼部、口腔可视黏膜，耳廓等组织出现明显黄染、精神沉郁、食欲不振、呕吐；肝前性黄疸、肝性黄疸和肝后性黄疸见上述证候者。

【用法与用量】 喂服：一次量，每1kg体重，猫0.6ml，一日2次，连用7日。

【规格】 100ml/瓶

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【包装】

【贮藏】 密封，置阴凉处。

【生产企业】

十二、狂犬病灭活疫苗(SAD株)说明书和标签

(一)狂犬病灭活疫苗(SAD株)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 狂犬病灭活疫苗(SAD株)

商品名称 无

英文名称 Rabies Vaccine, Inactivated (Strain SAD)

汉语拼音 Kuangquanbing MiehuoYimiao (SAD Zhu)

【主要成份与含量】 疫苗中含有灭活的狂犬病病毒SAD株，每头份至少为2.0IU。

【性状】 红色混悬液，久置后，下层有易摇散的淡乳白色沉淀。

【作用与用途】 用于预防犬的狂犬病。接种后14日产生免疫力，免疫期为12个月。

【用法与用量】 适用于3月龄以上的犬，皮下或肌肉注射，每只1.0ml，建议在3月龄首免，14日后加强免疫1次，以后每年加强免疫1次。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】 (1)本品严禁冻结。

(2)仅用于接种健康犬。

- (3)本品可在犬妊娠期间使用。
(4)使用前应将疫苗恢复至15~25℃,并充分摇匀。
(5)疫苗瓶开启后,应在3小时内用完。

【规格】

【包装】

【批准文号】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为24个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二)狂犬病灭活疫苗(SAD株)内包装标签

兽用

狂犬病灭活疫苗(SAD株)

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防犬的狂犬病。接种后14日产生免疫力,免疫期为12个月。

【用法与用量】 适用于3月龄以上的犬,皮下或肌肉注射,每只1.0ml,建议在3月龄首免,14日后加强免疫1次,以后每年加强免疫1次。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为24个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

十三、猪圆环病毒2型灭活疫苗(SH株, II)说明书和标签

(一)猪圆环病毒2型灭活疫苗(SH株, II)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 猪圆环病毒2型灭活疫苗(SH株, II)

商品名称

英文名称 Porcine Circovirus Type 2 Vaccine, Inactivated (Strain SH, II)

汉语拼音 Zhu YuanhuanBingduerXing MiehuoYimiao (SH Zhu, II)

【主要成分与含量】 疫苗中含灭活的猪圆环病毒2型SH株,灭活前每毫升病毒含量为 $10^{6.0}$ TCID₅₀。

【性状】 淡红色或灰白色均匀混悬液。

【作用与用途】 用于预防由猪圆环病毒2型感染引起的疾病。免疫产生期为二免后7日;免疫期为4个月。

【用法与用量】 颈部肌肉注射。14~21日龄仔猪首免,1.0ml/头,间隔3周后以同样剂量加强免疫1次。母猪分娩前40~45天首免,4.0ml/头,间隔3周后以同样剂量加强免疫1次。

【不良反应】 一般无明显不良反应。个别猪接种疫苗后,于注射部位可能出现轻度肿胀,体温轻度升高,1~3日后恢复正常。

【注意事项】 (1)用前和使用中应充分摇匀。
(2)用前应使疫苗温度升至室温。
(3)一经开瓶启用,应尽快用完。
(4)仅供健康猪只预防接种。
(5)接种工作完毕,双手应立即洗净并消毒,疫苗瓶及剩余的疫苗,应以燃烧或煮沸破坏,并做无害化处理。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二)猪圆环病毒2型灭活疫苗(SH株,II)内包装标签

兽用

猪圆环病毒2型灭活疫苗(SH株,II)

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 详见说明书。

【用法与用量】 颈部肌肉注射。14~21日龄仔猪首免,1.0ml/头,间隔3周后以同样剂量加强免疫1次。
母猪分娩前40~45天首免,4.0ml/头,间隔3周后以同样剂量加强免疫1次。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

附件6

残留检测方法标准（试行）

杆菌肽残留检测方法标准（试行）

鸡蛋中杆菌肽残留量的测定 液相色谱-串联质谱法（试行）

1 范围

本标准规定了鸡蛋中杆菌肽的制样和液相色谱-串联质谱的测定方法。

本标准适用于鸡蛋中杆菌肽残留量的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则第1部分: 标准的结构和编写规则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 原理

试料中的残留药物用10%三氯乙酸乙腈溶液和0.5%三氟乙酸溶液提取, 正己烷除脂, 经HLB固相萃取柱净化, 浓缩后残余物用0.1%甲酸溶液溶解, 供液相色谱-串联质谱法测定。用基质匹配标准溶液校准, 外标法定量。

4 试剂和材料

以下所用的试剂, 除特别注明者外均为分析纯试剂; 水为符合GB/T 6682规定的一级水。

4.1 杆菌肽标准品: 杆菌肽A以及杆菌肽B1、B2和B3含量≥78.6%。

4.2 甲醇: 色谱纯。

4.3 乙腈: 色谱纯。

4.4 甲酸: 色谱纯。

4.5 正己烷。

4.6 三氟乙酸。

4.7 三氯乙酸。

4.8 10%三氯乙酸乙腈溶液: 准确称取三氯乙酸50g, 用水溶解并稀释至500ml, 混匀即得。

4.9 0.5%三氟乙酸溶液: 取0.5ml三氟乙酸溶液, 用水稀释至100ml, 混匀即得。

4.10 2%甲醇溶液: 取2ml甲醇, 用水稀释至100ml, 混匀即得。

4.11 2%甲酸-甲醇/乙腈(V/V=1:1): 取2ml甲酸溶液, 用体积比为1:1的甲醇:乙腈溶液稀释至100ml, 混匀即得。

4.12 0.1%甲酸水溶液: 取甲酸500μL, 用水稀释至500ml, 混匀超声5min即得。

4.13 杆菌肽标准储备液(1mg/ml): 经纯度折算的杆菌肽标准约10mg, 精密称定, 用甲醇溶解, 稀释并定容至10ml容量瓶中, 配制成杆菌肽总组分为1mg/ml的标准储备液。-20℃冰箱中保存, 有效期3个月。

4.14 杆菌肽标准工作液的配制: 准确吸取杆菌肽储备液1ml于10ml容量瓶中, 用0.1%甲酸溶液稀释至刻度, 配置成浓度为100μg/ml的标准工作液, 再依次稀释得到杆菌肽总组分浓度为100、200、500、1000、2000、2500ng/ml的系列标准工作液。2~8℃下保存, 有效期1周。

5 仪器和设备

5.1 液相色谱-串联质谱仪: 配电喷雾离子源。

5.2 分析天平: 感量0.00001g。

5.3 天平: 感量0.01g。

5.4 涡旋混合器。

5.5 高速离心机。

5.6 固相萃取装置。

5.7 HLB固相萃取柱: 200mg/6ml, 或相当者。

5.8 氮吹仪。

5.9 微孔滤膜: 水相0.22 μ m。

6 试样的制备与保存

6.1 试样的制备

取适量新鲜空白或供试鸡蛋, 去壳, 混合均匀。

——取匀质的供试样品, 作为供试试料。

——取匀质的空白样品, 作为空白试料。

——取匀质的空白样品, 添加适宜浓度的标准工作液, 作为空白添加试料。

6.2 试样的保存 -20℃以下保存。

7 测定步骤

7.1 提取

准确称取样品2g (精确至0.01g), 置于50ml离心管中, 加入10%三氯乙酸乙腈溶液4ml, 涡旋1min。加入0.5%三氟乙酸溶液10ml, 振荡提取10min, 于10000r/min离心8min, 转移至另一离心管中, 残留物重复上述操作, 重复提取一次, 合并两次提取的上清液, 混匀, 35℃下氮吹至20ml左右, 加入正己烷10ml, 振荡5min, 于10000r/min离心5min, 弃去上层正己烷层, 将下层清液转移至另一离心管, 作为备用液。

7.2 净化

分别用甲醇5ml、水5ml活化和平衡HLB固相萃取柱, 将全部备用液过柱, 再分别用2%甲醇溶液5ml和水5ml淋洗, 抽干固相萃取柱。用2%甲酸-甲醇/乙腈 (V/V=1:1) 6ml洗脱, 收集洗脱液, 氮气吹干, 用0.1%甲酸水溶液1.0ml复溶, 0.22 μ m微孔滤膜过滤, 上机测定。

7.3 基质匹配标准曲线的制备

精密量取杆菌肽系列标准工作液各1.0ml, 分别溶解经提取、净化及吹干后的空白残余物, 0.22 μ m微孔滤膜过滤, 制得杆菌肽总组分浓度为100、200、500、1000、2000、2500ng/ml系列基质匹配标准溶液, 供液相色谱-串联质谱仪测定。以测得的杆菌肽特征离子质量色谱峰面积为纵坐标, 对应的基质匹配标准溶液浓度为横坐标, 绘制标准曲线, 求得回归方程和相关系数 (R^2)。

7.4 测定

7.4.1 液相色谱参考条件

- a) 色谱柱: Agilent Zobax Eclipse Plus-C18色谱柱 (3.0mm $\times$ 150mm, 1.8 μ m);
- b) 流动相: 0.2%甲酸溶液和0.2%甲酸甲醇溶液, 梯度洗脱见表1;
- c) 流速: 0.4ml/min;
- d) 柱温: 35℃;
- e) 进样体积: 10 μ l。

表1 梯度洗脱条件表

时间 (min)	0.2%甲酸溶液	0.2%甲酸甲醇溶液
0	90	10
1	90	10
1.5	44	56
4.5	44	56
5	10	90
7	10	90
10	90	10

7.4.2 串联质谱参考条件

- a) 质谱仪: Sciex Triple Quad4500;
 - b) 离子源: 电喷雾离子源;
 - c) 扫描方式: 正离子扫描;
 - d) 检测方式: 多反应监测;
 - e) 离子源温度 (TEM): 550℃;
 - f) 离子化电压 (IS): 5500V;
 - g) 气帘气 (CUR): 25psi;
 - h) 喷雾气 (GS1): 60psi;
 - i) 辅助加热气 (GS2): 50psi;
- 待测药物定性、定量离子对及对应的去簇电压、碰撞能量参考值见表2。

表2 待测药物定性、定量离子对及对应的去簇电压、碰撞能量参考值

分析物	母离子 (m/z)	子离子 (m/z)	去簇电压 (V)	碰撞能量 (eV)
杆菌肽A	712.0	199.1*	130	45
		227.1	130	45
杆菌肽B	705.0	199.0*	130	45
		227.1	130	45

注: *为定量离子

7.4.3 定性测定

通过样品各组分色谱图的保留时间与基质匹配标准溶液各组分的保留时间、样品各组分色谱峰的特征离子与相应浓度基质匹配标准溶液各组分色谱峰的特征离子相对照定性。样品各组分与基质匹配标准溶液各组分的保留时间的相对偏差不大于5%; 样品各组分特征离子的相对丰度与浓度相当基质匹配标准

溶液各组分的相对丰度一致，相对丰度偏差不超过表3的规定，则可判断样品中存在相应的被测物。

表3 定性测定时相对离子丰度的最大允许偏差

相对离子丰度	>50%	>20%至50%	>10%至20%	≤10%
允许的相对偏差	±20%	±25%	±30%	±50%

7.4.4 定量测定

取空白样品溶液与相应的标准工作液，配制基质匹配标准曲线，各组分分别做单点或多点校准，按外标法计算试样中杆菌肽每个组分的残留量，然后将各组分残留量相加即得到杆菌肽总组分的残留量。相关图谱见附录A。

7.4.5 空白试验

取空白试料，不添加药物，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

8 结果计算和表述

8.1 基质匹配标准曲线校准

将基质匹配标准曲线杆菌肽的浓度和相应单组分（杆菌肽A、杆菌肽B）峰面积之和进行回归分析，然后按下式计算供试组织中杆菌肽残留量。

$$X = \frac{(A - b) \times V}{a \times m}$$

式中：

- X——供试试样中杆菌肽残留量（μg/kg）；
- A——供试试样处理后试样溶液中杆菌肽相应单组分（杆菌肽A、杆菌肽B）的色谱峰面积之和；
- b——基质匹配标准曲线回归方程中截距；
- a——基质匹配标准曲线回归方程中斜率；
- m——试样的质量（g）；
- V——残余物定容的体积（ml）。

8.2 单点校准

按下式计算供试组织中杆菌肽残留量。

$$X = \frac{C_s \times A \times V}{A_s \times m}$$

式中：

- X——试料中被测杆菌肽的残留量（μg/kg）；
- C_s——对照溶液中相应杆菌的浓度（ng/ml）；
- A——试样溶液中相应杆菌肽单组分（杆菌肽A、杆菌肽B）组分的色谱峰面积之和；
- A_s——对照溶液中相应杆菌肽单组分（杆菌肽A、杆菌肽B）组分的色谱峰面积之和；
- m——试样的质量（g）；

V ——残余物定容的体积 (ml)；
注：计算结果需扣除空白值，测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留3位有效数字。

9 检测方法灵敏度、准确度和精密度

- 9.1 灵敏度
本方法在鸡蛋的检测限为 $50\mu\text{g/kg}$ ，定量限为 $100\mu\text{g/kg}$ 。
- 9.2 准确度
本方法鸡蛋在杆菌肽总组分为 $100\mu\text{g/kg}\sim 1000\mu\text{g/kg}$ 添加浓度水平下回收率范围为 $60\%\sim 110\%$ 。
- 9.3 精密度
本方法批内相对标准偏差 $\leq 15\%$ ，批间相对标准偏差 $\leq 15\%$ 。

附录

(资料性附录)
杆菌肽特征离子质量色谱图




图1 空白鸡蛋 (杆菌肽A) 特征离子质量色谱图




图2 空白鸡蛋添加杆菌肽标准溶液 (杆菌肽A) 特征离子质量色谱图 (500 µg/kg)




图3 空白鸡蛋基质匹配杆菌肽标准溶液 (杆菌肽A) 特征离子质量色谱图 (1000 µg/L)




图4 空白鸡蛋(杆菌肽B)特征离子质量色谱图




图5 空白鸡蛋添加杆菌肽标准溶液(杆菌肽B)特征离子质量色谱图(500μg/kg)




图6 空白鸡蛋基质匹配杆菌肽标准溶液(杆菌肽B)特征离子质量色谱图(1000 μ g/L)

中华人民共和国农业农村部公告

第 893 号

为满足珍贵濒危水生动物增殖放流需要,推进水生生物增殖放流物种结构优化调整,加强水生生物多样性保护,经我部组织对新申报的珍贵濒危水生动物增殖放流苗种供应单位进行评审,确定中国水产科学研究院北戴河中心实验站等30家单位为珍贵濒危水生动物增殖放流苗种供应单位,现予以公布。

特此公告。

附件: 珍贵濒危水生动物增殖放流苗种供应单位名单(第二批)

农业农村部

2025年3月24日

(附件详见农业农村部公报网络版, [http:// www.moa.gov.cn](http://www.moa.gov.cn))

中华人民共和国农业农村部公告

第 894 号

依据《中华人民共和国种子法》《非主要农作物品种登记办法》，决定对晋同薯7号等马铃薯、甘薯、谷子、高粱、大麦（青稞）、蚕豆、豌豆、油菜、花生、亚麻（胡麻）、向日葵、甘蔗、甜菜、大白菜、结球甘蓝、黄瓜、番茄、辣椒、西瓜、甜瓜、苹果、柑橘、梨、葡萄、茶树等25种农作物1254个品种予以登记，对慧谷2号等甘薯、高粱、大麦（青稞）、蚕豆、豌豆、油菜、花生、向日葵、大白菜、黄瓜、番茄、辣椒、西瓜、甜瓜等14种农作物114个品种变更登记信息，对浦红12号等番茄、辣椒、向日葵、结球甘蓝、桃等5种农作物313个品种撤销登记。现予公告。

自本公告发布之日起，上述撤销登记品种停止推广。

- 附件：1. 甘农薯19号等1254个品种登记信息
2. 慧谷2号等114个品种变更登记信息
3. 浦红12号等313个撤销登记品种目录

农业农村部

2025年3月26日

（附件详见农业农村部公报网络版，[http:// www.moa.gov.cn](http://www.moa.gov.cn)）

中华人民共和国农业农村部公告

第 895 号

根据《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》有关规定，批准瑞士百福公司等98家公司生产的189种饲料和饲料添加剂产品在我国登记或续展登记，并颁发进口登记证（见附件1）。其中，批准（新西兰）滋益有限公司的“滋益巅峰微蒸风干新西兰野生南太平洋鱼配方猫粮”、美国阿尔菲亚集团西捷食品股份有限公司（Plant 10）的“素力高® Indigo Moon® 含鸡肉&蛋粉猫粮”产品改变质量标准，重新颁发进口登记证，原登记证“（2024）外饲准字433号”“（2024）外饲准字743号”作废。

批准14个产品的申请企业名称、生产厂家名称、中文商品名称、英文商品名称变更（见附件2）。所登记产品的监督检验，按中华人民共和国国家标准和农业农村部发布的质量标准执行。

特此公告。

- 附件：1.进口饲料和饲料添加剂产品登记证目录（2025—02）
2.换发进口饲料和饲料添加剂产品登记证目录（2025—02）

农业农村部

2025年3月28日

（附件详见农业农村部公报网络版，[http:// www.moa.gov.cn](http://www.moa.gov.cn)）

中华人民共和国农业农村部公告

第 896 号

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经审查，批准齐鲁动物保健品有限公司等29家单位申报的氟雷拉纳等8种兽药产品为新兽药，核发《新兽药注册证书》，发布产品质量标准、工艺规程、说明书和标签，自发布之日起执行。

批准中国农业科学院兰州兽医研究所等2家单位申报的口蹄疫病毒A型单抗竞争ELISA抗体检测试剂盒注册，发布产品质量标准、工艺规程、说明书和标签，自发布之日起执行。

批准上海汉维生物医药科技有限公司等6家单位申报的环孢素内服溶液等2种兽药产品变更注册，发布修订后的说明书和标签，自发布之日起执行；批准新昌和宝生物科技有限公司等2家单位申报的盐酸多西环素可溶性粉等2种兽药产品变更注册，申请人按照农业农村部批准的变更事项，自行修改原批准的说明书和标签对应内容，并印制、使用。

特此公告。

- 附件：1.新兽药注册目录
2.兽药变更注册目录
3.质量标准
4.工艺规程
5.说明书和标签

农业农村部
2025年3月28日

附件1

新兽药注册目录

新兽药名称	研制单位	类别	新兽药注册证书号	监测期
氟雷拉纳	齐鲁动物保健品有限公司、齐鲁晟华制药有限公司	二类	(2025)新兽药证字22号	4年
氟雷拉纳溶液	齐鲁动物保健品有限公司、齐鲁晟华制药有限公司	二类	(2025)新兽药证字23号	4年
牛产气荚膜梭菌病(A型)灭活疫苗(CNM0708株)	金宇保灵生物药品有限公司、辽宁益康生物股份有限公司	二类	(2025)新兽药证字24号	4年

新兽药名称	研制单位	类别	新兽药注册证书号	监测期
牛支原体灭活疫苗（HM株）	天康生物制药有限公司、天康制药股份有限公司、哈药集团生物疫苗有限公司	二类	（2025）新兽药证字25号	4年
小反刍兽疫病毒化学发光抗体检测试剂盒	中国农业科学院兰州兽医研究所、中国动物疫病预防控制中心、洛阳现代生物技术研究院有限公司、洛阳莱普生信息科技有限公司、兰州兽研生物科技有限公司、北京亿森宝生物科技有限公司	二类	（2025）新兽药证字26号	4年
烯丙孕素片	宁波三生生物科技股份有限公司	四类	（2025）新兽药证字27号	3年
奥美拉唑肠溶胶囊	北京生泰尔科技股份有限公司、生泰尔（内蒙古）科技有限公司、爱迪森（北京）生物科技有限公司、北京爱宠族科技有限公司、爱宠族（江苏）科技有限公司、五洲牧洋（黑龙江）科技有限公司	四类	（2025）新兽药证字28号	3年
米氮平软膏	南京金盾动物药业有限责任公司、江苏基宇生物医药科技有限公司、江苏优力维生物医药有限公司、江苏南京农大动物药业有限公司、常州齐晖药业有限公司、江苏南京农大动物药业有限公司盱眙分公司、山东亚华生物科技有限公司、扬州大学、浙江乾炎生物信息技术有限公司	五类	（2025）新兽药证字29号	3年
口蹄疫病毒A型单抗竞争ELISA抗体检测试剂盒	中国农业科学院兰州兽医研究所、兰州兽研生物科技有限公司	/	/	/

附件2

兽药变更注册目录

兽药名称	申请单位	兽药标准来源	变更事项	监测期 （针对变更事项）
环孢素内服溶液	上海汉维生物医药科技有限公司、上海市动物疫病预防控制中心	（2023）新兽药证字75号	增加靶动物犬，变更兽药有效期为“36个月。开启后应在10周内用完”	3年
盐酸特比萘芬搽剂	南京金盾动物药业有限责任公司、河北远征药业有限公司、江苏福润德科技有限公司、南京金盾生物科技有限公司	（2022）新兽药证字36号	增加靶动物猫	3年
盐酸多西环素可溶性粉	新昌和宝生物科技有限公司	《兽药质量标准》（2017年版）同品种内容	在5%、10%、20%、50%规格基础上增加80%规格	/
牛流行热灭活疫苗	中国农业科学院哈尔滨兽医研究所	（97）新兽药证字第31号	将有效期由“4个月”变更为“12个月”	/

附件3(略)

附件4(略)

附件5

说明书和标签

一、氟雷拉纳标签

兽用

- 【兽药名称】
 - 通用名称 氟雷拉纳
 - 英文名称 Fluralaner
 - 汉语拼音 Fuleilana
- 【包装规格】
- 【生产日期】
- 【生产批号】
- 【有效期】 至
- 【运输注意事项】 轻搬轻放,切勿挤压。
- 【贮藏】 密闭保存。
- 【批准文号】
- 【生产企业】

二、氟雷拉纳溶液说明书和标签

(一) 氟雷拉纳溶液说明书

兽用

- 【兽药名称】
 - 通用名称 氟雷拉纳溶液
 - 商品名称
 - 英文名称 Fluralaner Solution
 - 汉语拼音 Fuleilana Rongye
- 【主要成分】 氟雷拉纳
- 【性状】 本品为淡黄色至黄色的澄清液体。
- 【药理作用】 药效学 氟雷拉纳为异噁唑啉类杀虫剂,通过拮抗γ-氨基丁酸受体和谷氨酸受体门

控氯离子通道,使氯离子无法渗透进入突触后膜,干扰神经系统的跨膜信号传递,导致部分节肢动物神经系统紊乱,进而死亡。氟雷拉纳与狄氏剂无交叉耐药性。螨虫通过吸血进食接触氟雷拉纳,氟雷拉纳对鸡皮刺螨在4小时内起效,抑制雌螨产卵,破坏螨虫的生命周期。首次给药后,药效可以持续15日。体外生物分析结果显示氟雷拉纳对有机磷酸酯类、拟除虫菊酯类和氨基甲酸盐类抗寄生虫药耐药的螨虫有效。

药动学 鸡单剂量灌服氟雷拉纳溶液后,消除缓慢,半衰期长,生物利用度高,达峰时间(T_{max})为 $26.4\pm 6.7h$,峰值浓度(C_{max})为 $293.6\pm 43.9ng/ml$,平均药时曲线下面积(AUC_{0-t})为 $17587.3\pm 2075.0\text{ ng}\cdot h/ml$,消除半衰期($t_{1/2}$)约为 $39.7\pm 11.0h$,灌服给药的绝对生物利用度为74.8%。

【适应证】 用于治疗产蛋鸡的鸡皮刺螨(红螨)感染。

【用法与用量】 以本品计。混饮:鸡每1kg体重0.05ml(相当于以氟雷拉纳计每1kg体重0.5mg),每7日给药1次,连用2次。

每日所需本品用量(ml/日)=拟治疗鸡群的体重总估值(kg) $\times$ 0.05ml/kg,如:1L本品可用于总体重为20000kg的鸡。

【不良反应】 按推荐剂量使用,未见不良反应。

【注意事项】 (1)为取得满意的治疗效果,应给予足量足程治疗;为减少耐药性,不宜长期频繁使用同一类除螨剂。

(2)药液应现用现配。根据拟治疗的鸡群体重总估值,计算每日所需本品用量,再估计鸡饮水给药时间内消耗的饮水量进行稀释,一般饮水时间为4~8小时,具体时间应根据鸡龄、体重、气候干燥程度确定。药液饮完后更换清水。

(3)应采取生物安全防范措施,防止治疗家禽再感染。为保障给药圈舍的寄生虫感染得到长期控制,必要时对即将发病的鸡同时给药。

(4)本品的给药间隔应不低于3个月。

(5)未进行相容性研究前,本品不得与其他兽药产品混合使用。

(6)产蛋鸡按5倍推荐剂量3倍推荐给药时间治疗,产蛋量无不良影响。

(7)本品对皮肤和/或眼睛具有轻微刺激性,应避免本品接触皮肤、眼睛及黏膜。给药时,不得饮食、喝水或抽烟;眼睛接触药液后,应立即用水彻底冲洗;使用本品后,脱下受污染的衣服,用肥皂洗手和皮肤。

(8)避免儿童接触本品。

(9)未使用完的兽药及包材,应进行无害化处理,本品有水生生物毒性,不得将本品弃入河道。

【休药期】 鸡14日;弃蛋期0日。

【规格】 1%

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【有效期】 36个月;开启后12个月。

【批准文号】

【生产企业】

(二) 氟雷拉纳溶液标签

兽用

【兽药名称】

通用名称 氟雷拉纳溶液

商品名称

英文名称 Fluralaner Solution

汉语拼音 Fuleilana Rongye

【主要成分】 氟雷拉纳

【性状】 本品为淡黄色至黄色的澄清液体。

【适应证】 用于治疗产蛋鸡的鸡皮刺螨（红螨）感染。

【用法与用量】 以本品计。混饮：鸡每1kg体重0.05ml（相当于以氟雷拉纳计每1kg体重0.5mg），每7日给药1次，连用2次。

每日所需本品用量（ml/日）=拟治疗鸡群的体重总估值（kg）×0.05ml/kg，如：1L本品可用于总体重为20000kg的鸡。

【规格】 1%

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 鸡14日；弃蛋期0日。

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【生产企业】

三、牛产气荚膜梭菌病（A型）灭活疫苗（CNM0708株）说明书和标签

(一) 牛产气荚膜梭菌病（A型）灭活疫苗（CNM0708株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 牛产气荚膜梭菌病（A型）灭活疫苗（CNM0708株）

商品名称 无

英文名称 Bovine Clostridium Perfringens Disease Vaccine (Type A), Inactivated (Strain CNM0708)

汉语拼音 Niu Chanqijiamosuojunbing (A Xing) MiehuoYimiao (CNM0708 Zhu)

【主要成份与含量】 本品主要含灭活的牛A型产气荚膜梭菌CNM0708株毒素，每毫升疫苗含灭活的毒素为256～640个小鼠MID。

【性状】 静置后，上层为淡黄色或黄褐色澄清液体，下层有灰白色或淡黄色沉淀，振摇后呈均匀混悬液。

【作用与用途】 用于预防由A型产气荚膜梭菌引起的牛猝死症。免疫产生期为首免后21日，免疫期为二免后4个月。

【用法与用量】 颈部或臀部肌肉注射。充分摇匀，1月龄以上（含1月龄）牛首免，每头牛2.0ml。14~21日后以相同方式相同剂量加强免疫一次，以后每隔4个月免疫一次。

【不良反应】 （1）正常反应 注射动物可能有一过性体温升高，48小时内恢复正常，注射部位可能出现轻微肿胀，泌乳正常，无其他可见临床体征变化。

（2）不良反应 如体温升高超过1.5℃且超过48小时，可注射肾上腺素进行治疗。

【注意事项】 （1）怀孕后期牛慎用。

（2）疫苗应在2~8℃冷藏运输，不得冻结，并尽快运往使用地点。运输和使用过程中避免日光直射。

（3）使用前应仔细检查疫苗。疫苗中若有其他异物、瓶体有裂纹或封口不严、变质者不得使用，疫苗瓶开启后限当日用完。

（4）严格遵守操作规程，曾接触过病畜人员，在更换衣、帽、鞋和进行必要消毒之后，方可参与疫苗注射。

（5）疫苗对安全区、受威胁区、疫区牛均可使用。疫苗应从安全区到受威胁区，最后再注射疫区内受威胁畜群。

（6）在非疫区，牛注苗21日后方可移动或调运。

（7）在紧急防疫中，除用本品紧急接种外，还应同时采用其他综合防治措施。

（8）注射部位应做消毒处理，使用过的器具、疫苗瓶和未用完的疫苗需进行无害化处理。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为24个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

（二）牛产气荚膜梭菌病（A型）灭活疫苗（CNM0708株）内包装标签

批准文号：

批 号：

有效期至：

【作用与用途】 用于预防由A型产气荚膜梭菌引起的牛猝死症。免疫产生期为首免后21日，免疫期为二免后4个月。

【用法与用量】 颈部或臀部肌肉注射。充分摇匀，1月龄以上（含1月龄）牛首免，每头牛2.0ml。14~21日后以相同方式相同剂量加强免疫一次，以后每隔4个月免疫一次。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为24个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

四、牛支原体灭活疫苗(HM株)说明书和标签

(一)牛支原体灭活疫苗(HM株)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 牛支原体灭活疫苗(HM株)
商品名称 无
英文名称 Mycoplasma bovis Vaccine, Inactivated (Strain HM)
汉语拼音 Niu Zhiyuanti MiehuoYimiao (HM Zhu)

【主要成分与含量】 疫苗中含灭活的牛支原体HM株,灭活前活菌数为 1.56×10^9 CFU/头份。

【性状】 乳白色均匀乳状液。

【作用与用途】 用于预防牛支原体肺炎。免疫产生期为首次免疫后35日,免疫持续期为加强免疫后6个月。

【用法与用量】 肌肉注射。3~4周龄犊牛首次免疫2ml(1头份),间隔2周加强免疫2ml(1头份)。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。个别牛接种后可能会出现过敏反应,应立即使用肾上腺素等抗过敏性药物对症治疗。

- 【注意事项】 (1)仅用于接种健康牛。
(2)疫苗运输过程需冷藏,避光保存,切勿冻结。
(3)使用前将疫苗恢复至室温,并充分摇匀。
(4)使用无菌注射器材进行接种。
(5)疫苗瓶开封后应一次用完。
(6)用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为18个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二)牛支原体灭活疫苗(HM株)内包装标签

兽用

牛支原体灭活疫苗(HM株)

批准文号:
批 号:
有效期至:

【作用与用途】 用于预防牛支原体肺炎。免疫产生期为首次免疫后35日,免疫持续期为加强免疫后6个月。

【用法与用量】 肌肉注射。3~4周龄犊牛首次免疫2ml (1头份), 间隔2周加强免疫2ml (1头份)。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为18个月。
【生产企业】

仅在兽医指导下使用

五、小反刍兽疫病毒化学发光抗体检测试剂盒说明书和标签

(一)小反刍兽疫病毒化学发光抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 小反刍兽疫病毒化学发光抗体检测试剂盒
商品名称 无
英文名称 CLIA Kit to Detect Peste Des Petits Ruminants Virus Antibody
汉语拼音 Xiaofanchushouyi Bingdu HuaxueFaguang Kangti Jiance Shijihe

【主要成分与含量】

序号	组分名称	数量		
1	PPRV发光包被板	96孔×1板	96孔×2板	96孔×5板
2	PPRV酶结合物	10ml×1瓶	20ml×1瓶	50ml×1瓶
3	校准品1	0.5ml×1瓶	1ml×1瓶	2.5ml×1瓶
4	校准品2	0.5ml×1瓶	1ml×1瓶	2.5ml×1瓶
5	校准品3	0.5ml×1瓶	1ml×1瓶	2.5ml×1瓶
6	校准品4	0.5ml×1瓶	1ml×1瓶	2.5ml×1瓶
7	校准品5	0.5ml×1瓶	1ml×1瓶	2.5ml×1瓶
8	校准品6	0.5ml×1瓶	1ml×1瓶	2.5ml×1瓶
9	发光底物A	6ml×1瓶	12ml×1瓶	30ml×1瓶
10	发光底物B	6ml×1瓶	12ml×1瓶	30ml×1瓶
11	固体洗液	5g×1包	5g×2包	5g×5包
12	血清稀释板	1板	2板	5板
13	封板膜	2张	4张	10张
14	加样槽	1个	2个	5个

【作用与用途】 用于检测羊血清中小反刍兽疫病毒 (PPRV) 抗体。

【用法与判定】 1 用法

1.1 洗涤液配制 用纯化水溶解固体洗液（每包固体洗液加500ml纯化水），在无菌条件下配制（无菌水和无菌容器）的洗涤液可在2~8℃保存7日。

1.2 平衡 在使用前，将试剂盒从冷藏柜中取出，平衡至室温（10~30℃），液体试剂使用前轻轻旋转或振荡混匀。

1.3 操作步骤

1.3.1 加样 每次试验需设置系列校准品6孔，在血清稀释板上校准品孔依次加入校准品1~6各70μl，样品孔依次加入待检样品70μl，再向以上各孔加入70μl PPRV酶结合物。振荡混匀，每孔吸取100μl转移至PPRV发光包被板对应孔内。

1.3.2 温育 贴上封板膜，置37±1℃恒温培养箱中温育30分钟（±1分钟）。

1.3.3 洗板 将各孔的液体弃入废液筒，每孔加入300μl洗涤液，再弃去洗涤液，共重复5次。在最后一次洗涤液弃去后，将孔中残留的洗涤液在吸水纸上拍干。

1.3.4 加入底物 每孔加入50μl发光底物A和50μl发光底物B，振荡混匀。

1.3.5 静置 在室温（10~30℃）避光静置5分钟。

1.3.6 读值 用化学发光免疫分析仪读取发光值。

2 判定

2.1 标准曲线的绘制 本试剂盒提供的系列校准品1~6对应的抗体剂量值分别为0NCU/ml、10NCU/ml、20NCU/ml、40NCU/ml、100NCU/ml、200NCU/ml。以校准品发光值为纵坐标，对应的校准品剂量值为横坐标，通过软件（如：ELISACalc）绘制四参数拟合曲线。

2.2 试验成立条件 当校准曲线相关系数 $R^2 \geq 0.99$ 时，试验成立。

2.3 判定标准 将样品发光值代入校准曲线，通过软件计算得出样品中小反刍兽疫病毒抗体剂量值。若抗体剂量值<40NCU/ml，样品应判定为阴性；若抗体剂量值≥40NCU/ml，样品应判定为阳性。

2.4 线性范围 本试剂盒线性范围为0~200NCU/ml，对于检测值超过200 NCU/ml的样本，将结果记作>200 NCU/ml，样品判定为阳性。

【注意事项】（1）为确保试验结果正确，请在试验前仔细阅读本说明书。

（2）所有试剂使用前恢复至室温（10~30℃），以免温度过低影响检测结果。

（3）试验前应用温度计检查温箱温度，温度过高或过低影响发光值。

（4）包被板温育时严禁堆叠放置，应该平铺且板间有空隙，不要离温箱壁太近。

（5）试验所用移液器及设备应定期校准。

【规格】（1）1板/盒 （2）2板/盒 （3）5板/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）小反刍兽疫病毒化学发光抗体检测试剂盒内包装标签

兽用

小反刍兽疫病毒化学发光抗体检测试剂盒

1(2、5)板/盒

批准文号:
批 号:
有效期至:

【作用与用途】 用于检测羊血清中小反刍兽疫病毒(PPRV)抗体。
【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

PPRV发光包被板

96孔/板

批 号:
有效期至:

兽用

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

PPRV酶结合物

10(20、50)ml/瓶

批 号:
有效期至:

兽用

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

校准品1

0.5(1、2.5)ml/瓶

批 号:
有效期至:

兽用

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存,有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

校准品2

兽用

0.5 (1、2.5) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

校准品3

兽用

0.5 (1、2.5) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

校准品4

兽用

0.5 (1、2.5) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

校准品5

兽用

0.5 (1、2.5) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

校准品6			兽用
0.5 (1、2.5) ml/瓶	批 号:		
	有效期至:		
【用法与判定】 详见说明书。			
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。			
【生产企业】			
仅供兽医诊断使用			
发光底物A			兽用
6 (12、30) ml/瓶	批 号:		
	有效期至:		
【用法与判定】 详见说明书。			
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。			
【生产企业】			
仅供兽医诊断使用			
发光底物B			兽用
6 (12、30) ml/瓶	批 号:		
	有效期至:		
【用法与判定】 详见说明书。			
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为15个月。			
【生产企业】			
仅供兽医诊断使用			

六、烯丙孕素片说明书和标签

(一) 烯丙孕素片说明书	兽用
【兽药名称】	
通用名称 烯丙孕素片	
商品名称	
英文名称 Altrenogest Tablets	
汉语拼音 Xibingyunsu Pian	
【主要成分】 烯丙孕素	

【性状】 本品为白色至淡黄色片。

【药理作用】 **药效学** 性激素类药。烯丙孕素与天然黄体酮的作用类似，外源给予烯丙孕素能够抑制脑垂体分泌促性腺激素，阻止卵泡发育及发情；给药结束后，脑垂体恢复分泌促性腺激素，促进卵泡发育及发情。停药时卵泡发育程度一致，加上促性腺激素的分泌同步恢复，促使所有动物在停药5~8日后同期发情。

药动学 本品在胃肠道迅速吸收，单次给药1小时后血药浓度达峰值，多次给药，第18次给药约4小时后血药浓度达峰值。烯丙孕素主要经肝脏代谢，通过胆汁排泄，消除半衰期约14小时。

【适应证】 用于控制后备母猪同期发情。

【用法与用量】 以烯丙孕素计。内服（直接放置于饲喂槽或拌在饲料中）。一次量，后备母猪20mg（1片）/头，一日1次，连用18日。

【不良反应】 给药量不足可能导致卵泡囊肿。

【注意事项】 （1）仅用于至少发情过一次的性成熟的后备母猪。

（2）每头母猪单独给药，确保每日给药剂量。

（3）有急性、亚急性、慢性子宫内膜炎的母猪慎用。

（4）操作时应戴上手套，操作后和用餐前应洗手。

（5）妊娠和育龄妇女应避免接触本品，如须操作应非常小心。意外摄入可能导致月经紊乱或妊娠期延长。

（6）瓶子开启后120日内有效，过期未用完产品应进行无害化处理。

【休药期】 猪9日

【规格】 20mg

【包装】

【贮藏】 避光，密封保存。

【有效期】 24个月

【批准文号】

【生产企业】

（二）烯丙孕素片标签

兽用

【兽药名称】

通用名称 烯丙孕素片

商品名称

英文名称 Altrenogest Tablets

汉语拼音 Xibingyunsu Pian

【主要成分】 烯丙孕素

【性状】 本品为白色至淡黄色片。

【适应证】 用于控制后备母猪同期发情。

【用法与用量】 以烯丙孕素计。内服（直接放置于饲喂槽或拌在饲料中）。一次量，后备母猪20mg（1

片)/头,一日1次,连用18日。

- 【规格】 20mg
- 【批准文号】
- 【生产日期】
- 【生产批号】
- 【有效期】 至
- 【休药期】 猪9日
- 【包装】
- 【贮藏】 避光,密封保存。
- 【生产企业】

七、奥美拉唑肠溶胶囊说明书和标签

(一)奥美拉唑肠溶胶囊说明书

宠物用

- 【兽药名称】
 - 通用名称 奥美拉唑肠溶胶囊
 - 商品名称
 - 英文名称 Omeprazole Enteric Capsules
 - 汉语拼音 Aomeilazuo Changrong Jiaonang

- 【主要成分】 奥美拉唑
- 【性状】 本品内容物为白色或类白色肠溶小丸。

【药理作用】 药效学 质子泵抑制剂。本品为脂溶性弱碱性药物,易浓集于酸性环境中,因此口服后可特异地分布于胃黏膜壁细胞的分泌小管中,并在此高酸环境下转化为亚磺酰胺的活性形式,然后通过二硫键与壁细胞分泌膜中的H⁺-K⁺-ATP酶(又称质子泵)的巯基呈不可逆性结合,生成亚磺酰胺和质子泵的复合物,从而抑制该酶活性,阻断胃酸分泌的最后步骤。因此本品对由胃酸分泌引起的胃溃疡具有强而持久的作用。

药动学 本品口服后,经小肠吸收,比格犬按1mg/kg体重剂量内服,奥美拉唑在体内的血药浓度峰值、达峰时间和平均驻留时间分别为683.55±209.87ng/ml、1.69±0.89小时、2.28±0.65小时,单剂量绝对生物利用度为37.73%±15.61%。本品主要经尿排泄,其余由胆汁分泌后从粪便排泄,消除半衰期为0.83±0.32小时。

【适应证】 用于治疗犬胃溃疡。

【用法与用量】 以奥美拉唑计。内服:每1kg体重,犬1mg,一日1次,连用14日。或在兽医指导下使用。具体推荐给药剂量见下表:

胶囊规格	犬的体重(kg)与使用胶囊的数量(粒)										
	≤2	>2~2.5	>2.5~3.5	>3.5~5	>5~7.5	>7.5~10	>10~15	>16~22.5	>22.5~30	>30~37.5	>37.5~45
1.25mg	1		3								
2.5mg		1		2		4					
7.5mg					1		2	3	4	5	6

【不良反应】 按规定的用法与用量使用, 尚未见不良反应。

【注意事项】 (1) 本品对育种用犬、怀孕或哺乳母犬安全性尚未得到证实, 使用前需遵从兽医建议。

(2) 本品为肠溶胶囊, 犬服用时注意应整粒吞服, 以免药物在胃内过早释放而影响疗效。

(3) 将本品置于儿童无法触及处。

【休药期】 无需制定。

【规格】 按奥美拉唑计 (1) 1.25mg (2) 2.5mg (3) 7.5mg

【包装】

【贮藏】 遮光, 密封, 置干燥处保存。

【有效期】 24个月

【批准文号】

【生产企业】

(二) 奥美拉唑肠溶胶囊标签

宠物用

【兽药名称】

通用名称 奥美拉唑肠溶胶囊

商品名称

英文名称 Omeprazole Enteric Capsules

汉语拼音 Aomeilazuo Changrong Jiaonang

【主要成分】 奥美拉唑

【性状】 本品内容物为白色或类白色肠溶小丸。

【适应证】 用于治疗犬胃溃疡。

【用法与用量】 以奥美拉唑计。内服: 每1kg体重, 犬1mg, 一日1次, 连用14日。或在兽医指导下使用。

具体推荐给药剂量见下表:

胶囊规格	犬的体重(kg) 与使用胶囊的数量(粒)										
	≤2	>2~2.5	>2.5~3.5	>3.5~5	>5~7.5	>7.5~10	>10~15	>16~22.5	>22.5~30	>30~37.5	>37.5~45
1.25mg	1		3								
2.5mg		1		2		4					
7.5mg					1		2	3	4	5	6

【规格】 按奥美拉唑计 (1) 1.25mg (2) 2.5mg (3) 7.5mg

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

- 【休药期】 无需制定。
- 【包装】
- 【贮藏】 遮光, 密封, 置干燥处保存。
- 【生产企业】

八、米氮平软膏说明书和标签

(一) 米氮平软膏说明书

兽用处方药 外用

- 【兽药名称】
 - 通用名称 米氮平软膏
 - 商品名称
 - 英文名称 Mirtazapine Ointment
 - 汉语拼音 Midanping Ruangao

- 【主要成分】 米氮平
- 【性状】 本品为白色至类白色软膏。

【药理作用】 米氮平是一种 $\alpha 2$ -肾上腺素能受体拮抗剂和5-羟色胺(5-HT)能抗抑郁药。米氮平是中枢神经系统中5-HT₂和5-HT₃受体的有效拮抗剂,也是组胺H₁受体的有效抑制剂。由于米氮平阻断5-HT₂和5-HT₃受体,只有5-HT_{1A}介导的5-羟色胺能传递增强。米氮平导致体重增加的确切机制尚未明确阐明,但似乎是多因素导致的结果。抑制5-HT₂受体可能是米氮平促进食欲作用的原因。米氮平诱导体重增加的另一个原因可能是和瘦素蛋白因子和肿瘤坏死因子 α (TNF- α)系统变化有关。

- 【适应证】 用于控制猫体重减轻。

【用法与用量】 按照标尺将3.8cm的软膏条带(相当于2mg米氮平)均匀涂抹在猫的耳廓内侧,每日一次,连用14日,交替在左右耳廓内侧使用,不要涂抹于耳的其他部位。



【不良反应】 (1)用药部位反应(红斑、结痂、药物残留、脱屑、干燥、皮炎或刺激、脱毛和瘙痒等)和行为改变(叫声增强、多动、定向障碍或共济失调、嗜睡/虚弱、寻求关注和攻击行为等)在安全性和临床研究中非常常见。

(2)呕吐、尿比重降低相关的多尿、血尿素氮(BUN)升高和脱水在安全性和临床研究中很常见。根据呕吐、脱水或行为改变的严重程度,可根据兽医的获益风险评估停止给药。

- (3)不良反应包括局部反应,在治疗结束时无需特殊治疗即可恢复。
- (4)在极少数情况下,可能发生超敏反应。在这种情况下,应立即停止治疗。

- 【禁忌症】 (1)不得用于育种猫、怀孕或哺乳期的猫。
- (2)不得用于6月龄以下或体重低于2kg的猫。
- (3)不得用于对米氮平或任何辅料过敏的猫。

(4) 由于可能会增加5-羟色胺综合征的风险, 本品不得与赛庚啶、曲马多或单胺氧化酶抑制剂(MAOI)联合用药, 或在治疗前后14日内使用单胺氧化酶抑制剂(如盐酸司来吉兰、双甲胍)。

【注意事项】 (1) 本品不得经口或眼睛给药。

(2) 本品不得涂抹在破损皮肤上。

(3) 本品对患有严重肾脏疾病和/或肿瘤的猫的有效性和安全性尚未确定。

(4) 本品可能引起血清肝酶水平升高, 患有肝病的猫慎用; 肾脏疾病可能导致米氮平清除率降低, 这可能导致更高的药物暴露, 患有肾脏疾病的猫慎用。在这些特殊情况下如需使用本品, 治疗过程中应定期检测肝、肾功能生化参数。

(5) 米氮平对血糖调节的作用尚未得到评价。在用于患有糖尿病的猫时, 应定期监测血糖。

(6) 当用于低血容量的猫时, 应实施支持性治疗(液体疗法)。

(7) 当前研究仅证实了本品推荐的14日给药方案的疗效。没有对重复治疗进行研究, 因此只有在兽医进行利益风险评估后才能进行重复治疗。

(8) 本品的应用不能取代对引起体重减轻的潜在疾病的必要诊断和/或治疗方案。

(9) 停药后, 需重点监测猫的食物摄取量。如果几天内进食量显著减少(大于75%), 或猫停止进食超过48小时, 需经兽医重新评估。

(10) 治疗期间如错过一次给药, 第二日继续按照每日剂量给药或遵医嘱。

(11) 本品是皮肤致敏剂, 已知对米氮平过敏的人不得接触本品。

(12) 关于米氮平生殖毒性的研究数据有限。鉴于孕妇被认为是较为敏感人群, 建议孕妇或备孕女性在整个治疗期避免接触本品, 并避免与治疗后的动物接触。

(13) 避免直接接触本品。在每天用药后的12小时内, 避免与治疗过的动物接触, 直到用药部位干燥。在整个治疗期间, 不允许治疗过的动物与主人睡觉, 尤其是儿童和孕妇。用药部位干燥前, 其他动物避免与用药动物接触。

(14) 本品可通过皮肤或口服吸收, 引起嗜睡或镇静。在操作或使用本品时必须佩戴一次性防护手套, 防止意外的局部暴露。使用后, 丢弃手套, 并用肥皂及清水洗手。

(15) 本品置于儿童无法触及处。给猫用药时, 儿童不得在场。

(16) 操作本品时不得进食、饮水和吸烟。

(17) 本品可能产生眼部和皮肤刺激, 在手彻底洗净前避免接触嘴和眼睛。如接触到眼睛, 用清水彻底冲洗; 如接触到皮肤, 用肥皂和温水彻底清洗。如出现皮肤或眼部刺激, 或不慎误食, 应立即就医, 并向医生出示本品说明书或标签。

【休药期】 无需制定。

【规格】 5g: 100mg

【包装】

【贮藏】 密闭, 在25℃以下保存。

【有效期】 24个月; 开启后30日。

【批准文号】

【生产企业】

(二) 米氮平软膏标签

兽用处方药 外用

【兽药名称】

通用名称 米氮平软膏
商品名称
英文名称 Mirtazapine Ointment
汉语拼音 Midanping Ruangao

【主要成分】 米氮平

【性状】 本品为白色至类白色软膏。

【适应证】 用于控制猫体重减轻。

【用法与用量】 按照标尺将3.8cm的软膏条带（相当于2mg米氮平）均匀涂抹在猫的耳廓内侧，每日一次，连用14日，交替在左右耳廓内侧使用，不要涂抹于耳的其他部位。



【规格】 5g：100mg

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定。

【包装】

【贮藏】 密闭，在25℃以下保存。

【生产企业】

九、口蹄疫病毒A型单抗竞争ELISA抗体检测试剂盒说明书和标签

(一) 口蹄疫病毒A型单抗竞争ELISA抗体检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 口蹄疫病毒A型单抗竞争ELISA抗体检测试剂盒
商品名称
英文名称 MAbs Competitive ELISA Kit for Detecting Foot and Mouth Disease Virus Type A Antibodies

汉语拼音 Koutiyi Bingdu A Xing Dankang Jingzheng ELISA Kangti Jiance Shijihe

【主要成分与含量】

组份名称	规格	
酶标反应板	5块/盒	2块/盒
A型酶标抗体工作液	30 ml	12 ml
阳性对照血清	500 μl	500 μl
阴性对照血清	500 μl	500 μl
样品稀释液	40 ml	15 ml
25倍浓缩洗涤液	60 ml	30 ml
底物溶液	30 ml	12 ml
终止液	30 ml	12 ml

- 【性状】** 试剂盒应密封完好, 组份齐全, 无破损, 无渗漏。其中:
- (1) 酶标反应板 96孔微孔板, 孔底光洁、透明、无裂纹, 铝箔袋包装密封完好。
 - (2) 阳性对照血清 呈黄色或淡黄色澄清液体。
 - (3) 阴性对照血清 呈黄色或淡黄色澄清液体。
 - (4) A型酶标抗体工作液 呈橙色澄清液体。
 - (5) 样品稀释液 呈澄清透明液体。
 - (6) 25倍浓缩洗涤液 呈无色, 透明溶液 (2~8℃保存时有结晶析出, 微热融化)。
 - (7) 底物溶液 为棕色瓶装, 无色, 透明液体。
 - (8) 终止液 无色, 透明液体。

【作用与用途】

用于检测牛、羊、猪等感染或免疫动物血清中口蹄疫病毒A型抗体。

【用法与判定】

1 用法

1.1 试剂准备 (现用现配)

1倍洗涤液的配制: 用去离子或蒸馏水对25倍浓缩洗涤液进行25倍稀释。

1.2 操作步骤

◆ 根据不同的需要进行布局, 选择下图中的一种布局来设定相应的检测目的。图1 为检测10份血清样品布局, 图2为检测20份血清样品布局。

图1 检测10份血清样品布局图

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	S1 1:8	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	+ 1:32	- 1:8
B	1:16										1:64	1:16
C	1:32										1:128	1:32
D	1:64										1:256	1:64

E	1:128										1:512	酶标对照
F	1:256										1:1024	
G	1:512										1:2048	
H	1:1024										1:4096	

+: 阳性对照血清; -: 阴性对照血清

图2 检测20份血清样品布局图

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	S1 1:8	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	+ 1:32	- 1:8
B	1:16										1:64	1:16
C	1:32										1:128	1:32
D	1:64										1:256	1:64
E	S11 1:8	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	1:512	酶标对照
F	1:16										1:1024	
G	1:32										1:2048	
H	1:64										1:4096	

+: 阳性对照血清; -: 阴性对照血清

◆ 稀释血清

建议在血清稀释板上按照实验需求稀释血清, 之后整体移至酶标反应板中。

在血清稀释板中, 以60μl/孔的量用样品稀释液2倍系列稀释血清, 被检血清在第1~10列均从1:4 (即A1~A10孔, 90μl样品稀释液加30μl被检血清) 稀释至1:512; 在第11列稀释阳性对照血清, 稀释方法同待检血清; 在第12列稀释阴性对照血清, 从A12~D12, 稀释方法同待检血清; E12~H12为酶标对照 (仅为样品稀释液)。

由于本方法是竞争ELISA方法, 当稀释血清移至酶标反应板后, 再加入等量的酶标抗体工作液, 此时血清的稀释度加倍, 被检血清稀释梯度从1:8到1:1024。阳性对照血清制备时已预先进行了1:4倍稀释, 因此其稀释梯度从1:32到1:4096。

◆ 加样 将稀释板中血清整体平移至酶标反应板中, 每孔50μl; 随后给所有反应孔加50μl酶标抗体工作液, 轻轻震荡, 封板, 37℃反应30分钟。

◆ 洗涤 取出酶标反应板, 将其甩干, 用洗涤液洗涤3~5次, 300μl/孔, 在吸水纸上拍干。

◆ 显色 每孔加入底物溶液50μl, 于37℃温箱静置避光反应12±1分钟。

◆ 终止 每孔加入50μl终止液。

◆ 读值 在酶标仪OD_{450nm}波长处, 测定酶标板每孔光吸收值。

1.3 试验成立条件 酶标抗体对照孔的OD_{450nm}值应大于或等于1.0; 阴性对照血清抗体效价应小于1:8; 阳性对照抗体效价应在1:512~1:2048滴度范围内。

1.4 结果计算 测定酶标板每孔的OD_{450nm}值, 求出A型酶标抗体对照孔的平均OD_{450nm}值。

1.5 血清抗体效价的判定

以A型酶标抗体对照孔平均OD_{450nm}值的60%为临界值, 被检血清OD_{450nm}值大于临界值的孔为阴性孔, 不高于临界值的孔为阳性孔。某份血清系列稀释中, 阳性孔的最高稀释倍数为被检血清的抗体效价。若临界值处于两个稀释孔OD_{450nm}值之间, 抗体效价取相邻阳性孔和阴性孔稀释倍数的对数中间值, 如处于1:64与1:128之间, 则判定该份血清的抗体效价为1:90。

2 判定

2.1 当被检血清效价大于等于1:90时, 为口蹄疫病毒A型抗体阳性;

2.2 当被检血清效价小于等于1:45时, 为口蹄疫病毒A型抗体阴性;

2.3 当血清样本效价介于1:45~1:90时, 为可疑, 需重新测定。若仍在此范围, 则判为阴性。

【注意事项】 (1) 使用前, 认真阅读说明书。

(2) 按照说明书清单, 核对试剂盒组份及瓶签信息。

(3) 底物溶液和终止液对皮肤有刺激性, 需小心操作。

(4) 避免底物溶液被强光照射, 或接触到氧化剂。

(5) 试剂盒应2~8℃保存。使用前, 恢复至室温20~25℃。

(6) 操作过程中, 严防试剂盒各成分交叉污染。

(7) 试验废弃物应进行无害化处理。

(8) 禁止使用过期的试剂盒, 禁止非同批试剂盒组份混用。

(9) 严格按照操作程序进行实验, 保证取量准确, 以获得最佳检测结果。

【规格】 2×96孔/盒、5×96孔/盒。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

(二) 口蹄疫病毒A型单抗竞争ELISA抗体检测试剂盒内包装标签

兽用

口蹄疫病毒A型单抗竞争ELISA抗体检测试剂盒

2(5) 板/盒

批准文号:

批 号:

有效期至:

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。

【生产企业】

兽用

酶标反应板

96孔/板

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

A型酶标抗体工作液

12 (30) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照血清

500μl/管

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照血清

500μl/管

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

样品稀释液

15 (40) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

25倍浓缩洗涤液

30 (60) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

底物溶液

12 (30) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

终止液

12 (30) ml/瓶

批 号：
有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。
【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为12个月。
【生产企业】

仅供兽医诊断使用

十、环孢素内服溶液说明书和标签

(一) 环孢素内服溶液说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称 环孢素内服溶液
商品名称
英文名称 Ciclosporin Oral Solution
汉语拼音 Huanbaosu Neifu Rongye

【主要成分】 环孢素

【性状】 本品为淡黄色或黄色的澄清油状液体。

【药理作用】 **药效学** 环孢素是一种选择性免疫调节剂，特异性、可逆性作用于T淋巴细胞。环孢素在治疗过敏性皮炎中发挥抗炎和止痒作用。环孢素通过阻止IL-2和其他T细胞衍生细胞因子的产生，优先抑制抗原刺激下T淋巴细胞的活化。环孢素也可以抑制皮肤免疫系统的抗原呈递功能。它同样可以阻断嗜酸性粒细胞的募集和活化、角质形成细胞产生细胞因子、朗格汉斯细胞的功能、肥大细胞的脱颗粒，从而阻断组胺和促炎细胞因子的释放。环孢素并不抑制造血干细胞，亦不影响吞噬细胞的功能。

生物等效性试验表明，犬按照5mg/kg的剂量给予本品和Elanco France S.A.S.生产的环孢素内服溶液后，两制剂生物等效；猫按照7mg/kg的剂量给予本品和Elanco Australasia Pty Ltd生产的环孢素内服溶液后，两制剂生物等效。

【适应证】 本品用于治疗犬慢性特应性皮炎和猫慢性过敏性皮炎。

【用法与用量】 以环孢素计。内服：每1kg体重，犬5mg（相当于以本品计。内服：每1kg体重，犬0.05ml）；猫7mg（相当于以本品计。内服：每1kg体重，猫0.07ml）。

犬应至少在喂食前2小时或喂食后2小时给药，给药时将给药器直接插入犬的口腔并注入全部剂量；猫可拌食给药或直接内服给药。如果拌食给药，本品应与少量食物混合，为确保猫完全食用拌药食物，给药前最好充分禁食。当使用给药器直接给药时，将给药器插入猫的口腔并注入全部剂量。

治疗初期，本品应每日给药，直至观察到满意的临床症状改善（犬通常4周内，猫通常4~8周内）。如果犬8周内仍没有改善，应停止治疗。应定期重新评估患犬或患猫并复核治疗方案。

一旦特应性皮炎或过敏性皮炎的临床体征得到满意控制，本品可每隔一天给药1次。在每隔一天给药1次即可控制临床症状的一些病例中，兽医可每3~4天给予本品1次。当临床症状得到控制时可停止治疗。当临床症状复发时，应恢复至每日给药进行治疗，在某些情况下，可能需要进行重复治疗。

【不良反应】 **犬** （1）最常见的不良反应是胃肠道紊乱，如多涎、呕吐、粘液便或软便和腹泻。这些症状是轻微和短暂的，通常不需要停止治疗。

（2）其他不太常见的不良反应包括嗜睡或多动、厌食、轻度至中度牙龈增生（牙龈过度生长）、皮肤反应（如疣状病变或皮毛变化）、耳廓（外耳）红肿、肌肉无力或肌肉痉挛。这些症状通常在停止治疗后自行消退。

（3）非常罕见的不良反应是糖尿病，主要在西高地白梗犬中有报道。

猫 （1）本品治疗期间可能发生食欲下降和体重减轻，建议监测体重。体重显著降低可能导致肝脏

脂质沉积。如果在治疗期间发生持续的、渐进性体重减轻,建议停止治疗,直至确定原因。

(2)非常常见的不良反应是胃肠道紊乱,如呕吐和腹泻。这些症状通常是轻微和短暂的,不需要停止治疗。

【注意事项】 (1)不得用于对本品活性物质或任何辅料过敏的动物。

(2)不得用于感染白血病病毒(FeLV)或免疫缺陷病毒(FIV)的猫。

(3)不得用于有恶性疾病史或进行性恶性疾病史的动物。

(4)不得用于6月龄以下或体重低于2kg的犬。

(5)尚未在6月龄以下或体重低于2.3kg的猫中评估环孢素的有效性和安全性。不得用于6月龄以下或体重低于2.3kg的猫。

(6)尚未在雄性种犬或种猫以及妊娠期或哺乳期的犬或猫中研究药物的安全性。在用于繁殖期、妊娠期或哺乳期的犬或猫之前,应进行全面的风险/效益分析。

(7)环孢素可能引起血糖水平升高。尚未评价环孢素对患有糖尿病的犬和猫的影响。患有糖尿病的犬和猫不建议使用环孢素。

(8)环孢素虽然不诱发肿瘤,但可以抑制T淋巴细胞,因此用环孢素治疗可能增加临床上明显的恶性肿瘤的发生率。如果在接受环孢素治疗的犬和猫中观察到淋巴结病变,建议进行进一步的临床研究,必要时停止治疗。

(9)多种药物可竞争性抑制或诱导参与环孢素代谢的酶,尤其是细胞色素P450(CYP 3A 4)。唑类化合物(如酮康唑)可增加犬和猫体内环孢素的血药浓度。大环内酯类药物(如红霉素)可使血浆环孢素水平增加两倍。细胞色素P450的某些诱导剂、抗惊厥药和抗生素(如甲氧苄啶、磺胺嘧啶)可降低环孢素的血药浓度。

(10)环孢素作为MDR 1 P-糖蛋白转运载体的底物和抑制剂,与P-糖蛋白底物(如大环内酯类)联合给药可降低这些药物从血脑屏障细胞内流出,可能导致中枢神经系统(CNS)毒性体征。在临床研究中,对猫采用环孢素和赛拉菌素或米尔贝肟联合治疗,没有发现这些药物联合运用与神经毒性之间的相关性。

(11)环孢素可增加氨基糖苷类抗生素和甲氧苄啶的肾毒性。不建议环孢素与这些活性成分同时使用。

(12)本品治疗可能引起疫苗接种的免疫应答降低,不建议在治疗期间或给药前后两周内接种疫苗。

(13)对于弓形虫血清呈阴性的猫,在治疗期间感染时会有患上弓形虫病的风险。在极少情况下可能会致命。因此应尽量减少血清阴性猫接触弓形虫的可能性(例如,室内饲养、避免生肉或腐食)。在一项对照实验研究中,发现环孢素没有引起弓形虫卵母细胞脱落的增加。在治疗中发现弓形虫病或其他严重的全身性疾病时,应停止环孢素的使用并开始适当的治疗。

(14)由于环孢素具有免疫抑制作用,因此在开始治疗前应对任何其他的感染进行适当治疗。治疗期间发生的感染无需停药,除非感染严重。

(15)猫的过敏性皮炎有多种表现形式,包括嗜酸性斑块、头颈部表皮脱落、对称性脱毛和/或粟粒性皮炎等。

(16)不建议与其他免疫抑制剂同时使用。

(17)意外摄入本品可能导致恶心和/或呕吐,应立即就医。应避免与眼睛接触,如不慎接触,请用大

量水冲洗。

- (18) 使用本品后, 应清洗双手和暴露的皮肤。
- (19) 环孢素可能引起超敏(过敏)反应。对环孢素过敏的人应避免接触本品。
- (20) 置儿童不可触及处。

【休药期】 无需制定。

【规格】 10%

【包装】

【贮藏】 15~30℃密封保存, 避免冷藏。不要在低于20℃的条件下贮藏超过一个月。

【有效期】 36个月。开启后应在10周内用完。

【批准文号】

【生产企业】

(二) 环孢素内服溶液标签

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称 环孢素内服溶液

商品名称

英文名称 Ciclosporin Oral Solution

汉语拼音 Huanbaosu Neifu Rongye

【主要成分】 环孢素

【性状】 本品为淡黄色或黄色的澄清油状液体。

【适应证】 本品用于治疗犬慢性特应性皮炎和猫慢性过敏性皮炎。

【用法与用量】 以环孢素计。内服: 每1kg体重, 犬5mg(相当于以本品计。内服: 每1kg体重, 犬0.05ml); 猫7mg(相当于以本品计。内服: 每1kg体重, 猫0.07ml)。犬应至少在喂食前后2小时给药, 猫可拌食给药或直接内服给药。具体详见说明书。

【规格】 10%

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定。

【包装】

【贮藏】 15~30℃密封保存, 避免冷藏。不要在低于20℃的条件下贮藏超过一个月。

【生产企业】

十一、盐酸特比萘芬搽剂说明书和标签

(一) 盐酸特比萘芬搽剂说明书

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称 盐酸特比萘芬搽剂
商品名称
英文名称 Terbinafine Hydrochloride Liniment
汉语拼音 Yansuantebinaifen Chaji

【主要成分】 盐酸特比萘芬

【性状】 本品为无色至淡黄色澄清液体。

【药理作用】 丙烯胺类抗真菌药。主要是通过抑制真菌角鲨烯环氧化酶影响真菌细胞膜的生成，发挥杀灭和抑制真菌的作用。特比萘芬抗菌谱较广，体外抑菌表明对念珠菌、癣菌、霉菌、孢子丝菌等多种真菌有抑制或杀灭作用，其中最敏感者为皮肤癣菌。药物具有强亲脂性，蓄积于皮肤深层，停药后仍能持续发挥药效。药物在皮肤、毛发等组织浓度较高，能渗入并储存于皮肤角质层和新生的毛发、指（趾）甲角质部分。

【适应证】 用于治疗犬、猫由犬小孢子菌引起的真菌性皮肤病。

【用法与用量】 外用。将本品涂于犬、猫皮肤患处及其周围，0.5mg/cm²（约1滴/cm²），1日2次，连用14日。用药前请清洁患处。

【不良反应】 偶在用药部位出现刺痛感，用药动物会出现轻微挣扎现象，不必停药。过敏反应较少发生，发生后请立即停药。

【注意事项】 （1）对本品过敏的犬猫不得使用。

（2）文献资料显示盐酸特比萘芬无生殖毒性，但由于缺乏对怀孕犬猫和哺乳犬猫的相关试验研究，因此不推荐使用，或遵医嘱使用。

（3）本品仅供外用，避免误入眼睛和口中，谨防犬猫偷食。

（4）置于儿童无法触及处。

【休药期】 无需制定。

【规格】 1%

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【有效期】 24个月

【批准文号】

【生产企业】

(二) 盐酸特比萘芬搽剂内标签

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称 盐酸特比萘芬搽剂
商品名称
英文名称 Terbinafine Hydrochloride Liniment
汉语拼音 Yansuantebinaifen Chaji

【适应证】 用于治疗犬、猫由犬小孢子菌引起的真菌性皮肤病。

【规格】 1%

【生产批号】

【生产日期】

【生产企业】