

Edge Function

Pintér Bálint

November 22, 2025


Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	3
2	Edge function levezetése	4
3	Edge function működési elve	5


1 Bevezetés

Az edge function egy lineáris függvény, amellyel egy egyenessel kettéosztott síkon lévő pontokat lehet három régióba osztani:

- Az egyenestől 'jobbra' lévő pontok (ahol a függvény értéke pozitív).
- Az egyenestől 'balra' lévő pontok (ahol a függvény értéke negatív).
- Az egyenesre illeszkedő pontok (ahol a függvény értéke nulla).



1. Ábra
Sík felosztása A-n és B-n átmenő egyenessel



2. Ábra
Az AB, BC és CA szakaszok által meghatározott egyenesek "jobb" oldalainak metszete egy háromszög

A 2. ábra szemlélteti, hogy a háromszög 'belseje' a három oldalhoz tartozó megfelelő irányú edge function előjelei alapján meghatározható.

2 Edge function levezetése

- Legyen a szakasz kezdőpontja $P_0 = (X, Y)$
- Legyen a szakasz végpontja $P_1 = (X + dX, Y + dY)$
 - Ekkor a $P_0\vec{P}_1 = \vec{v} = ((X + dX) - X, (Y + dY) - Y) = (dX, dY)$
- Legyen a vizsgált pont $P = (x, y)$
 - Ekkor a $P_0\vec{P} = \vec{u} = (x - X, y - Y)$

Az edge function lényegében egy 'kereszt-szorzat'. Kettő két dimenziós vektor 'kereszt-szorzata' a rájuk merőleges vektor Z koordinátáját adja meg.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \det \begin{bmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{bmatrix} = u_x v_y - v_x u_y$$

Helyettesítsuk be az értékeinket:

$$\begin{aligned} u_x &= x - X \\ u_y &= y - Y \\ v_x &= dX \\ v_y &= dY \end{aligned}$$

A végeredmény:

$$\boxed{E(x, y) = (x - X)dY - (y - Y)dX}$$

3 Edge function működési elve

Források

Juan Pineda. A parallel algorithm for polygon rasterization. Technical report, Apollo Computer Inc., 1988. URL <https://www.cs.drexel.edu/~deb39/Classes/Papers/comp175-06-pineda.pdf>.