

Tartalomjegyzék

Kombinatorika 1 Tankönyv	2
Előszó	2
I. RÉSZ: LESZÁMLÁLÁS	3
1. A leszámolás alapelvei	3
2. A skatulyaelv és a bijekció-elv	5
3. Permutációk és variációk	6
4. Kombinációk és a binomiális együtthatók	8
5. Ismétléses kombináció	9
6. A Pascal-háromszög és a binomiális tétel	10
7. A logikai szita	13
8. A logikai szita alkalmazásai	15
Az I. rész összefoglalása	19
II. RÉSZ: KERESÉS, REKURZIÓK ÉS CATALAN-SZÁMOK	20
9. Keresési feladatok: a barkochba	20
10. A Fibonacci-sorozat	22
11. Lineáris rekurziók: a mértani sorozat ötlete	24
12. Az általános másodrendű lineáris rekurzió	26
13. A lépcsómászás feladata	29
14. Rácsutak és a tükrözési elv	30
15. A Catalan-számok	31
16. A Catalan-számok rekurziója és alkalmazásai	34
A II. rész összefoglalása	37
III. RÉSZ: GRÁFELMÉLET	37
17. Gráfok, egyszerű gráfok, izomorfia	37
18. Fokszám és a kézfogási lemma	39
19. Séták, vonalak, utak, körök	39
20. Összefüggőség és komponensek	40
21. Fák és levelek	41
22. A fák élszáma	42
23. Részgráfok és feszítőfák	43
24. A fák ekvivalens jellemzése	44
25. Minimális összsúlyú feszítőfa	46
26. Címkezett fák: a Cayley-tétel és a Prüfer-kód	48
27. Fokszámsorozatok realizálása	52

28. Egyszerű gráfok fokszámsorozatai	53
A III. rész összefoglalása	58

Kombinatorika 1 Tankönyv

Leszámlálás és gráfelmélet lépésről lépésre — az előadás jegyzetei alapján

„Számolni nem úgy kell, hogy egyenként végigszámoljuk a dolgokat, hanem úgy, hogy megértjük, hogyan épülnek fel.”

Előszó

A Kombinatorika 1 előadáshoz nincs hivatalos jegyzet. Ez a könyv az előadáson készült kéziratos jegyzetekből született, és ugyanazt az utat járja be, **ugyanabban a sorrendben**, ahogyan az előadás haladt: a leszámlálás alapelveitől a binomiális együtthatókon, a logikai szitán, a rekurziókon és a Catalan-számokon át a gráfelmélet első fejezeteiig (fák, feszítőfák, Prüfer-kód, fokszámsorozatok). Ahol ismert, a szakasz elején feltüntettük az előadás dátumát is, hogy a könyv és a saját jegyzet könnyen összevethető legyen.

A könyv azonban nem csupán a jegyzet letisztázott változata. Az előadáson sok minden szóban hangzik el, vagy csak egy rajz utal rá; itt ezeket a lépéseket kiírtuk. Minden új fogalom előtt igyekeztünk megmutatni, milyen kérdés teszi szükségessé, utána pedig példákon kipróbáltuk.

A szürke dobozok

Az előadáson nem minden állítás kapott bizonyítást: némelyiket csak tényként mondtuk ki, egy másik bizonyítását házi feladatnak hagytuk, egy harmadiknál pedig elhangzott, hogy „most nem nézzük meg”. Ezeket a bizonyításokat **kiegészítésként** megírtuk, de világosszürke háttérrel elkülönítettük a szöveg többi részétől, például így:

Kiegészítés. Az ilyen dobozok tartalma *nem hangzott el* az előadáson. Az ott kimondott tételek bizonyítását, illetve a kimondott tényekhez szükséges hiányzó lépéseket tartalmazza. Első olvasáskor átugorhatók, de vizsgára készülve érdemes őket is végigolvasni: gyakran éppen ezekben derül ki, *miért* igaz valami.

Ami szürke háttér nélkül szerepel, az az előadás anyaga, legfeljebb részletesebben kifejtve.

Hogyan használjuk ezt a könyvet?

Lassan és ceruzával. A kombinatorikában a legtöbb hiba abból adódik, hogy valamit kétszer vagy egyszer sem számolunk meg. Ezért minden képletet érdemes kis esetekre ($n = 1, 2, 3$) kézzel is ellenőrizni.

A gyakorlattal együtt. A feladatokat a *Kombinatorika 1 Gyakorlat Feladatsorok* gyűjtemény tartalmazza, a megoldásokat a *Kombinatorika 1 Gyakorlat Megoldások*. Ez a könyv az elméleti háttérrel adja hozzájuk.

A könyvben használt jelölések

- **Definíció, Tétel, Állítás, Lemma, Következmény** — a szokásos értelemben. A definíciókat és a tételeket behúzott blokkban szedtük.
 - **Bizonyítás** — végét a ■ jel mutatja.
 - $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, továbbá $|A|$ az A véges halmaz elemszáma.
 - $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, és megállapodás szerint $0! = 1$.
 - $\lceil x \rceil$ az x felső egészrésze (a legkisebb egész, amely $\geq x$), $\lfloor x \rfloor$ az alsó egészrésze.
-

I. RÉSZ: LESZÁMLÁLÁS

A kombinatorika a véges struktúrák tudománya. Ebben a félévben három nagy területével ismerkedünk meg:

- **leszámlálás:** hányféleképpen lehet valamit megtenni, hány adott tulajdonságú objektum van;
- **gráfelmélet:** pontok és az őket összekötő vonalak rendszereinek vizsgálata;
- **halmazrendszerek:** egy alaphalmaz részhalmazainak családjai.

Az első rész a leszámolásról szól. A kérdések egyszerűen hangzanak („hány átlója van egy konvex 100-szögnek?”, „hányféleképpen ülhet le öt házaspár egy kerek asztal köré?”), a válaszhoz azonban rendszerezett gondolkodásra van szükség. Ennek az eszköztárát építjük fel.

1. A leszámolás alapelvei

Előadás: 2026. 09. 08.

Minden leszámolási feladat mögött néhány egészen egyszerű elv áll. Az előadáson ezeket a négy alapl művelet jelével foglaltuk össze — érdemes így megjegyezni őket.

(+) Esetszétválasztás

Ha a megszámlálandó dolgok néhány **diszjunkt** csoportra bonthatók, akkor elég a csoportokat külön-külön megszámlálni, és az eredményeket összeadni:

$$A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j) \implies |A| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|.$$

Példa. Hány olyan legfeljebb háromjegyű pozitív egész van, amelynek minden jegye páratlan? Válasszuk szét az eseteket a jegyek száma szerint: egyjegyű 5, kétjegyű $5 \cdot 5 = 25$, háromjegyű $5^3 = 125$ ilyen szám van (a szorzásról lásd alább), összesen $5 + 25 + 125 = 155$. A lényeg az, hogy a csoportok **ne fedjék egymást**, és **együtt mindent lefedjenek**.

(-) Dobjuk ki a rosszat!

Gyakran könnyebb az *összes* esetet megszámlálni, majd levonni belőle a *rosszakat*:

$$|\text{jó}| = |\text{összes}| - |\text{rossz}|.$$

Példa. Hány olyan négyjegyű szám van, amelyben előfordul a 7-es számjegy? Az összes négyjegyű szám 9000. A „rosszak” azok, amelyekben nincs 7-es: az első jegy 8-féle lehet (nem 0 és nem 7), a többi 9-féle, ez $8 \cdot 9^3 = 5832$. A válasz tehát $9000 - 5832 = 3168$. (A $8 \cdot 9^3$ szorzat a következő elvet használta.)

(×) Független választás

Ha egy objektumot lépésenként választunk ki, és **minden lépésben ugyanannyi lehetőség van, függetlenül attól, hogy korábban mit választottunk**, akkor a lehetőségek száma a lépésenkénti lehetőségszámok szorzata.

Példa. Három ingből és négy nadrágból $3 \cdot 4 = 12$ -féle öltözék állítható össze.

Figyeljük meg a pontos feltételt: nem az kell, hogy a választások „ne hassanak egymásra”, hanem az, hogy a lehetőségek **száma** ne függjön a korábbi választásoktól. A négyjegyű számos példában az első jegy 8-féle volt, a második jegy 9-féle — és ez a 9 akkor is 9, ha az első jegy 1, és akkor is, ha 8.

(/) A tehénszabály

Tehénszabály. Ha minden objektumot pontosan ugyanannyiszor, mondjuk d -szer számoltunk meg, akkor a kapott számot d -vel osztva megkapjuk az objektumok számát.

A név onnan ered, hogy egy legelőn a tehenek számát úgy is meghatározhatjuk, hogy megszámloljuk a lábakat, és elosztjuk 4-gyel. A lényeges feltétel az, hogy **mindegyik** tehennek 4 lába legyen: ha egyeseket kétszer, másokat háromszor számoltunk, akkor az osztás nem segít.

Példa. Hány átlója van egy konvex n -szögnek? Minden csúcsból $n - 3$ átló indul (ön-magához és a két szomszédjához nem húzunk átlót). Ez összesen $n(n - 3)$ — de így minden átlót **pontosan kétszer** számoltunk, mindkét végpontjánál egyszer. A tehénszabály szerint az átlók száma

$$\frac{n(n - 3)}{2}.$$

2. A skatulyaelv és a bijekció-elv

A skatulyaelv

Az előző szakasz elvei *pontos* értéket adtak. A skatulyaelv ezzel szemben *létezés*t bizonyít: azt mondja meg, hogy valami biztosan bekövetkezik, de azt nem, hogy hol.

Skatulyaelv (egyszerű alak). Ha n skatulyába n -nél több golyót teszünk, akkor lesz olyan skatulya, amelyben egynél több golyó van.

Skatulyaelv (általános alak). Ha n skatulyába $k \cdot n$ -nél több golyót teszünk, akkor lesz olyan skatulya, amelyben k -nál több, vagyis legalább $k + 1$ golyó van.

Az egyszerű alak a $k = 1$ eset.

Kiegészítés — a skatulyaelv bizonyítása. Elég az általános alakot igazolni. Tegyük fel indirekt, hogy minden skatulyában legfeljebb k golyó van. Az esetszétválasztás elve szerint (a golyókat aszerint csoportosítva, hogy melyik skatulyában vannak) a golyók száma ekkor legfeljebb

$$\underbrace{k + k + \cdots + k}_{n \text{ darab}} = k \cdot n,$$

ami ellentmond annak, hogy $k \cdot n$ -nél több golyó van. ■

Példa. Bármely $n + 1$ egész szám között van kettő, amelyek különbsége osztható n -nel. Valóban: a skatulyák legyenek az n -nel való osztási maradékok $(0, 1, \dots, n - 1)$, a golyók a számok. Mivel $n + 1 > n$, van két szám azonos maradékkal, és ezek különbsége osztható n -nel.

Példa. Egy 25 fős csoportban biztosan van három ember, akik ugyanabban a hónapban született: 12 skatulya (hónap), $25 > 2 \cdot 12$ golyó, tehát valamelyik hónapra legalább 3 születésnap jut.

A bijekció-elv

Bijekció-elv (kölsönösen egyértelmű megfeleltetés). Ha az A és B véges halmazok elemei között van kölsönösen egyértelmű megfeleltetés (bijekció), akkor $|A| = |B|$.

Ez kézenfekvőnek tűnik, mégis a leszámolás egyik leghatékonyabb eszköze. Ha egy halmaz elemeit nehéz közvetlenül megszámolni, keressünk egy másik halmazt, amelynek elemei kölsönösen egyértelműen megfeleltethetők az elsőéinek, és amelyet *könnyű* megszámolni.

Példa. Hány részhalmaza van az $[n] = \{1, \dots, n\}$ halmaznak? Feleltessük meg minden $H \subseteq [n]$ részhalmaznak azt a 0–1 sorozatot, amelynek i -edik jegye 1, ha $i \in H$, és 0, ha $i \notin H$. Például $n = 5$ esetén a $\{2, 3, 5\}$ részhalmaznak a 01101 sorozat felel meg. Ez kölsönösen egyértelmű megfeleltetés, a 0–1 sorozatokat pedig a független választás elvével könnyű megszámolni: minden jegy 2-féle, tehát 2^n sorozat van. Így az $[n]$ halmaznak 2^n részhalmaza van.

A félév során a bijekció-elv újra és újra előkerül: a Catalan-számoknál (15. szakasz) és a Prüfer-kódnál (26. szakasz) is ez lesz a kulcs.

3. Permutációk és variációk

Ebben és a következő két szakaszban a középiskolából ismert alapvető leszámolási képleteket foglaljuk össze. Az előadáson a képletek elhangzottak, a levezetésük azonban nem; ezeket a szürke dobozokban pótoljuk. Mindegyik az 1. szakasz négy elvének közvetlen alkalmazása.

Permutációk

Ismétlés nélküli permutáció. n különböző elemet $n!$ -féleképpen lehet sorba rendezni.

Kiegészítés — bizonyítás. Független választás: az első helyre n elem közül választhatunk, a másodikra a maradék $n - 1$ közül, ..., az utolsó helyre 1 marad. Minden lépésben a lehetőségek száma független attól, hogy korábban mit választottunk, ezért a sorrendek száma $n(n - 1) \cdots 1 = n!$. ■

Ismétléses permutáció. Ha n_1 darab egyforma első típusú, n_2 darab egyforma második típusú, ..., n_k darab egyforma k -adik típusú elemünk van, akkor ezek sorrendjeinek

száma

$$\frac{(n_1 + n_2 + \dots + n_k)!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

Kiegészítés — bizonyítás (tehén szabály). Legyen $n = n_1 + \dots + n_k$. Különböztessük meg ideiglenesen az egyforma elemeket is (például számozzuk meg őket). Így n különböző elemünk lesz, ezek sorrendjeinek száma $n!$. Ha a számozást töröljük, egy-egy „valódi” sorrendet többször is megkaptunk: annyiszor, ahányféleképpen az első típusú elemek számozását ($n_1!$ -féle), a második típusúakét ($n_2!$ -féle), ... permutálhatjuk. Ez **minden** valódi sorrendre ugyanannyi, nevezetesen $n_1! n_2! \dots n_k!$, tehát a tehén szabály szerint ezzel osztani kell. ■

Példa. A KOMBINATORIKA szó 13 betűből áll: K, O, I, A kétszer-kétszer, M, B, N, T, R egyszer-egyszer. Az anagrammák (betűsorrendek) száma

$$\frac{13!}{2! 2! 2! 2!} = \frac{6\,227\,020\,800}{16} = 389\,188\,800.$$

Variációk

Ismétlés nélküli variáció. Ha n különböző elemből k darabot ($k \leq n$) választunk ki sorba rendezve, akkor a lehetőségek száma

$$n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Ismétléses variáció. Ha n -féle elemből választunk k -szor egymás után, és ugyanaz az elem többször is választható, akkor a lehetőségek száma n^k .

Kiegészítés — bizonyítás. Mindkettő a független választás elve. Ismétlés nélkül az első helyre n , a másodikra $n-1$, ..., a k -adikra $n-k+1$ lehetőség van, és

$$n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1) \cdot (n-k)!}{(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Ismétléssel mind a k helyre n -féle elem kerülhet, ez $n \cdot n \dots n = n^k$. ■

Példa. Egy 20 fős futóversenyen az első három hely $20 \cdot 19 \cdot 18 = 6840$ -féleképpen alakulhat. Egy 4 jegyű PIN-kód 10^4 -féle lehet.

4. Kombinációk és a binomiális együtthatók

Előadás: 2026. 09. 10.

Most olyan kiválasztásokat számolunk, amelyekben a **sorrend nem számít**.

Kérdés. Adott n különböző elem. Hányféleképpen választhatunk ki közülük k darabot, ha a kiválasztás sorrendje nem számít? (Más szóval: hány k elemű részhalmaza van egy n elemű halmaznak?)

Az előző szakasz szerint, ha a sorrend számítana, a válasz $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ volna. Ebben a számolásban azonban minden k elemű részhalmazt többször is megkaptunk: annyiszor, ahányféleképpen az elemeit sorba lehet rendezni, vagyis **mindegyiket pontosan $k!$ -szor**. A tételeszabály szerint tehát a k elemű részhalmazok száma

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

Definíció (binomiális együttható). Legyen $0 \leq k \leq n$ egész. Az

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

számot **binomiális együtthatónak** nevezzük (olvasd: „ n alatt a k ”). Ez egy n elemű halmaz k elemű részhalmazainak száma.

A név a 6. szakaszban kimondandó binomiális tételből származik. Kényelmes megállapodás, hogy $k < 0$ vagy $k > n$ esetén $\binom{n}{k} = 0$ (ennyi elemű részhalmaz nincs).

Az előadáson a binomiális együtthatók három alapvető tulajdonsága hangzott el.

Állítás. Minden $n \geq 0$ és $0 \leq k \leq n$ esetén

1. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$;
2. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (szimmetria);
3. ha $n \geq 1$ és $1 \leq k \leq n$, akkor $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ (Pascal-szabály).

Kiegészítés — bizonyítás. Mindhárom állítást kétféleképpen is igazoljuk: számolással és „kombinatorikusan”, vagyis annak alapján, hogy mit számol meg a két oldal. A második módszer a fontosabb, mert megmutatja, *miért* igaz az azonosság.

1. *Számolással:* $\frac{n!}{0!n!} = 1$. *Kombinatorikusan:* 0 elemű részhalmaz egy van (az üres halmaz), n elemű is egy (az egész halmaz).

2. *Számolással:* a definícióban k és $n - k$ szerepe szimmetrikus: $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$. *Kombinatorikusan:* a $H \mapsto [n] \setminus H$ megfeleltetés (komplementerképzés) bijekció a k elemű és az $n - k$ elemű részhalmazok között, mert kétszer alkalmazva visszaadja H -t. A bijekció-elv szerint a kettő száma egyenlő. Szemléletesen: kiválasztani azt a k elemet, amelyet *elviszünk*, ugyanaz, mint kiválasztani azt az $n - k$ -t, amelyet *otthagynak*.
3. *Kombinatorikusan:* osszuk két csoportba az $[n]$ halmaz k elemű részhalmazait aszerint, hogy tartalmazzák-e az n elemet (esetszétválasztás).

- Ha **tartalmazzák**, akkor a többi $k - 1$ elemüket az $[n - 1]$ halmazból kell választani: ez $\binom{n-1}{k-1}$ lehetőség.
- Ha **nem tartalmazzák**, akkor mind a k elemük az $[n - 1]$ halmazból kerül ki: $\binom{n-1}{k}$ lehetőség.

A két csoport diszjunkt, és együtt mindent lefed, így $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. (A $k = n$ esetben a második tag $\binom{n-1}{n} = 0$, ami a megállapodásunkkal összhangban van.)

Számolással ($1 \leq k \leq n - 1$ esetén): közös nevezőre hozva

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} = \frac{(n-1)!(k+(n-k))}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \blacksquare$$

5. Ismétléses kombináció

Kérdés. Egy fagyizóban n -féle fagyalt kapható. Hányféleképpen kérhetünk k gombócot, ha egy fajtából több gombóc is lehet, és a gombócok sorrendje nem számít?

Itt a kiválasztott „elemek” ismétlődhetnek, ezért a $\binom{n}{k}$ képlet nem alkalmazható. Az előadásban egy szép ötlettel oldottuk meg a feladatot, amely a bijekció-elvre épül.

Az ötlet. Rendezzük a fajtákat sorba (1., 2., ..., n . fajta), és egy rendelést írjunk le így: először annyi pöttyöt (●) rajzolunk, ahány gombócot az 1. fajtából kérünk, aztán egy elválasztó vonalat (|), majd annyi pöttyöt, ahány gombócot a 2. fajtából kérünk, aztán újra elválasztót, és így tovább. Például $n = 5$ fajta és $k = 7$ gombóc esetén a

● ● | | ● ● ● | ● | ●

jelsorozat azt a rendelést jelenti, amelyben az 1. fajtából 2, a 2.-ból 0, a 3.-ból 3, a 4.-ből

és az 5.-ből 1-1 gombócot kérünk.

Minden ilyen jelsorozat k **pöttyből** és $n - 1$ **elválasztóból** áll (n fajtát $n - 1$ vonal választ el), és megfordítva: minden olyan sorozat, amely k pöttyből és $n - 1$ vonalból áll, pontosan egy rendeltést ír le. Ez tehát kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a rendelések és az ilyen jelsorozatok között.

A jelsorozatokat már könnyű megszámolni: összesen $k + n - 1$ hely van, és ezek közül kell kiválasztani azt a k -t, ahová pötty kerül (a többi helyre elválasztó jön). A válasz tehát

$$\frac{(k + n - 1)!}{k! (n - 1)!} = \binom{k + n - 1}{k}.$$

Tétel (ismétléses kombináció). Ha n -féle elemből k darabot választunk ki úgy, hogy egy elem többször is választható, és a sorrend nem számít, akkor a lehetőségek száma

$$\binom{n + k - 1}{k}.$$

Példa. 4-féle fagyiból 3 gombócot $\binom{6}{3} = 20$ -féleképpen kérhetünk.

Másik szemlélet. Ugyanez a szám adja meg az $x_1 + x_2 + \dots + x_n = k$ egyenlet nemnegatív egész megoldásainak számát is: x_i az i -edik fajtából kért gombócok száma.

6. A Pascal-háromszög és a binomiális tétel

A Pascal-háromszög

Írjuk a binomiális együtthatókat háromszög alakba úgy, hogy az n -edik sorba (a számozás 0-tól indul) a $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$ számok kerüljenek:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & & \\ & & & & 1 & & 1 & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\ 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1 \end{array}$$

Ez a **Pascal-háromszög**. A 4. szakasz állításai itt szemmel láthatók: minden sor 1-gyel kezdődik és végződik, a sorok szimmetrikusak, és — a Pascal-szabály szerint — minden

belső szám a felette álló két szám összege. A háromszöget tehát fentről lefelé, összeadással is fel lehet építeni, faktoriálisok számolása nélkül.

A binomiális tétel

Tétel (binomiális tétel). Minden x, y valós számra és $n \geq 0$ egészre

$$(x + y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i} y^i = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \dots + \binom{n}{n} y^n.$$

Bizonyítás. Írjuk ki a hatványt szorzatként:

$$(x + y)^n = \underbrace{(x + y)(x + y) \cdots (x + y)}_{n \text{ tényező}}.$$

A zárójeleket felbontva úgy kapunk egy tagot, hogy **mindegyik** tényezőből kiválasztjuk vagy az x -et, vagy az y -t, és a kiválasztottakat összeszorozzuk. Ha i tényezőből választottuk az y -t (és a maradék $n - i$ -ből az x -et), akkor az $x^{n-i} y^i$ tagot kapjuk. Hányszor kapjuk ezt a tagot? Annyiszor, ahányféleképpen az n tényezőből kiválasztható az az i , amelyből y -t veszünk — ez $\binom{n}{i}$. Az összevonás után tehát $x^{n-i} y^i$ együtthatója $\binom{n}{i}$. ■

Innen ered a „binomiális együttható” elnevezés: ezek az $(x + y)^n$ kéttagú (binom) kifejezés kifejtésének együtthatói. Például $(x + y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$ — az együtthatók a Pascal-háromszög 4. sora.

Következmények: a Pascal-háromszög sorainak összege

A binomiális tételbe konkrét számokat helyettesítve azonosságokat kapunk.

Az $x = y = 1$ helyettesítés.

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = (1 + 1)^n = 2^n.$$

A Pascal-háromszög n -edik sorában álló számok összege tehát 2^n .

Kiegészítés — kombinatorikus bizonyítás. A számolás helyett érdemes meggondolni, mit számol meg a két oldal. A jobb oldal, 2^n , az $[n]$ halmaz összes részhalmazának száma (2. szakasz). A bal oldal ugyanezeket a részhalmazokat számolja meg, csak **elemszám szerint csoportosítva** (esetszétválasztás): $\binom{n}{0}$ darab 0 elemű, $\binom{n}{1}$ darab 1 elemű, ..., $\binom{n}{n}$ darab n elemű részhalmaz van. A két szám tehát ugyanannak a halmaznak az elemszáma.

■

(A kézírásos jegyzetben szerepel egy kísérlet arra is, hogy az azonosságot a $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ törtet közvetlen összeadásával igazoljuk. Ez nem vezet egyszerűen célhoz — jó példa arra, hogy a kombinatorikus érvelés sokszor sokkal rövidebb a számolásnál.)

Az $x = 1, y = -1$ helyettesítés. Ha $n \geq 1$, akkor

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = (1 - 1)^n = 0.$$

A Pascal-háromszög sorainak **váltakozó előjelű összege** tehát 0 (kivéve a 0-adik sort, ahol az összeg 1). Ezt az azonosságot a következő szakaszban, a logikai szita bizonyításában fogjuk használni.

Ha az azonosságban a negatív tagokat átvisszük a másik oldalra, azt kapjuk, hogy

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots$$

A két oldal összege 2^n , így mindkét oldal 2^{n-1} . Kombinatorikusan:

Következmény. Egy $n \geq 1$ elemű alaphalmaznak ugyanannyi páros elemszámú, mint páratlan elemszámú részhalmaza van, nevezetesen mindkettőből 2^{n-1} .

Kiegészítés — bijektív bizonyítás. A következmény számolás nélkül is belátható. Rögzítsük az alaphalmaz egy elemét, mondjuk az 1-et, és minden H részhalmazhoz rendeljük hozzá azt a H' halmazt, amelyet úgy kapunk, hogy az 1-et „átbillentjük”: ha $1 \in H$, kivesszük, ha $1 \notin H$, betesszük. Ez a megfeleltetés kétszer alkalmazva visszaadja H -t, tehát bijekció; és mivel $|H'| = |H| \pm 1$, a páros elemszámú részhalmazokat éppen a páratlan elemszámúakba viszi. A bijekció-elv szerint a kettő száma egyenlő. ■

Érdekesség: az $x = 1, y = i$ helyettesítés. Az előadáson elhangzott, hogy érdemes az $(1 + i)^n$ komplex számot is megvizsgálni.

Kiegészítés — mit ad az $(1 + i)^n$? A binomiális tétel komplex számokra is igaz (a bizonyítás szó szerint ugyanaz). Mivel $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, az

$$(1 + i)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} i^k$$

összegben a páros k -jú tagok valósak, váltakozó előjellel, a páratlanok képzetesek. A valós részeket összevetve

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{2} + \binom{n}{4} - \binom{n}{6} + \dots = \operatorname{Re} (1 + i)^n = 2^{n/2} \cos \frac{n\pi}{4},$$

hiszen $1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$, és a Moivre-képlet szerint $(1 + i)^n = 2^{n/2} \left(\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} \right)$. Például $n = 4$ esetén $1 - 6 + 1 = -4 = (1 + i)^4$, hiszen $(1 + i)^2 = 2i$.

Ezzel a „minden negyedik” binomiális együttható összege is kiszámolható. Ha az $(1 + 1)^n$, $(1 - 1)^n$, $(1 + i)^n$, $(1 - i)^n$ kifejtéseket összeadjuk, akkor $\binom{n}{k}$ együtthatója $1 + (-1)^k + i^k + (-i)^k$, ami 4, ha $4 \mid k$, és 0 egyébként. Ezért $n \geq 1$ esetén

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{4} + \binom{n}{8} + \dots = \frac{2^n + 0 + (1 + i)^n + (1 - i)^n}{4} = \frac{2^n + 2^{n/2+1} \cos \frac{n\pi}{4}}{4}.$$

Ellenőrzés $n = 4$ -re: $\binom{4}{0} + \binom{4}{4} = 2$, és a jobb oldal $\frac{16-8}{4} = 2$.

7. A logikai szita

Egy bevezető példa

Egy 80 fős évfolyamon a diákok angolul (A), németül (N) és franciául (F) tanulhatnak. Tudjuk, hogy

- angolul 25, németül 24, franciául 23 diák tanul;
- angolul és németül 10, angolul és franciául 9, németül és franciául 7 diák tanul;
- mindhárom nyelvet 1 diák tanulja.

Hányan nem tanulnak egyik nyelvet sem?

Az első ötlet: $80 - 25 - 24 - 23 = 8$. Ez azonban hibás, mert aki két nyelvet tanul, azt kétszer vontuk le. Adjuk tehát vissza a párokat: $8 + 10 + 9 + 7 = 34$. De most meg az, aki mindhárom nyelvet tanulja, háromszor lett levonva és háromszor visszaadva, vagyis egyszer sem vontuk le — pedig le kellene. Vonjuk le tehát még egyszer:

$$80 - (25 + 24 + 23) + (10 + 9 + 7) - 1 = 33.$$

Ellenőrizzük egy Venn-diagrammal! Belülről kifelé haladva: mindhárom nyelvet 1 diák tanulja; csak angolul és németül $10 - 1 = 9$, csak angolul és franciául $9 - 1 = 8$, csak németül és franciául $7 - 1 = 6$; csak angolul $25 - 9 - 8 - 1 = 7$, csak németül $24 - 9 - 6 - 1 = 8$, csak franciául $23 - 8 - 6 - 1 = 8$. Legalább egy nyelvet tehát $1 + 9 + 8 + 6 + 7 + 8 + 8 = 47$ diák tanul, egyiket sem $80 - 47 = 33$. Egyezik.

Az eljárás neve **logikai szita** (vagy szitaformula, angolul *inclusion–exclusion*): felváltva vonunk le és adunk hozzá, mintha egy szitán rostálnánk át a halmazt.

Az általános szitaformula

Legyen A egy véges **alaphalmaz**, és $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq A$ részhalmazai. (A példában A az évfolyam, A_1, A_2, A_3 az angolul, németül, illetve franciául tanulók halmaza.) Tegyük fel, hogy ismerjük az $|A|, |A_i|, |A_i \cap A_j|, |A_i \cap A_j \cap A_k|, \dots$ számokat, és azt szeretnénk tudni, hány elem nem tartozik egyik A_i -hez sem, vagyis mennyi

$$|A \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)|.$$

Tétel (logikai szita).

$$|A \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i| = |A| - \sum_i |A_i| + \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| - \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|.$$

Itt a $\sum_{i < j}$ összeg az összes $\binom{n}{2}$ párra, a $\sum_{i < j < k}$ az összes $\binom{n}{3}$ hármasra fut, és így tovább.

Tömörebben: ha $I \subseteq [n]$ esetén $A_I = \bigcap_{i \in I} A_i$ és $A_\emptyset = A$, akkor

$$|A \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} |A_I|.$$

Bizonyítás. A jobb oldal egy összeg, amelyben minden $x \in A$ elemet néhányszor pozitív, néhányszor negatív előjellel számolunk. Azt kell megmutatnunk, hogy minden elemet pontosan annyszor számolunk, ahányszor kell — az előadás szavaival: **mindenkit „pontosan egyszer”**. Vagyis aki egyik A_i -ben sincs benne, azt összesen 1-szer, aki valamelyikben benne van, azt összesen 0-szor.

Legyen $x \in A$ tetszőleges, és tegyük fel, hogy x pontosan t darab A_i halmaznak eleme.

- Ha $t = 0$, akkor x csak az $|A|$ tagban szerepel, ott $+1$ -gyel. Összesen tehát egyszer számoltuk — helyes.
- Ha $t \geq 1$, akkor x szerepel az $|A|$ tagban ($+1$ -szer); a $\sum |A_i|$ összegben annyszor, ahány halmaznak eleme, vagyis $t = \binom{t}{1}$ -szer, negatív előjellel; a $\sum |A_i \cap A_j|$ összegben annyszor, ahány párnak a metszetében benne van — ez a t halmaz közül választott párok száma, $\binom{t}{2}$ —, pozitív előjellel; és így tovább. Az x elemet tehát összesen

$$\binom{t}{0} - \binom{t}{1} + \binom{t}{2} - \binom{t}{3} + \cdots + (-1)^t \binom{t}{t}$$

alkalommal számoltuk, ami a 6. szakasz szerint — a Pascal-háromszög t -edik sorának váltakozó előjelű összegeként — 0, mert $t > 0$. Helyes.

Mivel minden elemet pontosan annyszor számoltunk, ahányszor kell, az összeg valóban a keresett elemszámot adja. ■

Megjegyzés. A tétel ekvivalens a gyakran használt

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

alakkal: ez a fenti képletből $|A \setminus \bigcup A_i| = |A| - |\bigcup A_i|$ felhasználásával adódik. Két halmazra ez az ismert $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$ képlet.

8. A logikai szita alkalmazásai

Előadás: 2026. 09. 15.

A szitaformulát akkor érdemes használni, ha a „rossz” tulajdonságok **metszeteit** könnyű megszámolni, a „jó” elemeket közvetlenül viszont nehéz. Három alkalmazást nézünk meg.

Első alkalmazás: egy azonosság $n!$ -ra

Állítás. Minden $n \geq 1$ esetén

$$n! = n^n - \binom{n}{1}(n-1)^n + \binom{n}{2}(n-2)^n - \dots + (-1)^n \binom{n}{n} 0^n = \sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^n.$$

Elsőre meglepő, hogy egy ilyen bonyolult összeg egyszerűen $n!$. Ellenőrizzük kis esetekre: $n = 2$ -re $4 - 2 \cdot 1 + 0 = 2$, $n = 3$ -ra $27 - 3 \cdot 8 + 3 \cdot 1 - 0 = 6$. A bizonyítás kulcsa, hogy mindkét oldal **ugyanazt** számolja meg.

Bizonyítás. Osszunk ki n különböző tárgyat n embernek (minden tárgyat valakinek odaadunk, egy ember több tárgyat is kaphat). Számoljuk meg, hány olyan kiosztás van, amelyben **mindenki kap valamit**.

- *Közvetlenül:* ha n tárgyat n ember között úgy osztunk ki, hogy mindenki kap, akkor mindenki pontosan egyet kap. Ez egy sorba rendezés: $n!$ lehetőség.
- *Szítával:* legyen A az összes kiosztás halmaza; minden tárgy n ember valamelyikéhez kerül, így $|A| = n^n$. Legyen A_i azoknak a kiosztásoknak a halmaza, amelyekben az i -edik ember **nem kap semmit**. Ha I egy j elemű embercsoport, akkor A_I -ben az I -beli emberek semmit sem kapnak, a tárgyak tehát a maradék $n - j$ ember között oszlanak meg: $|A_I| = (n - j)^n$. Mivel j elemű csoport $\binom{n}{j}$ van, a szitaformula szerint a jó kiosztások száma

$$\sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^n.$$

Ugyanazt a mennyiséget kétféleképpen számoltuk meg, így a két eredmény egyenlő. ■

Megjegyzés. Ugyanez a számolás k tárgyra azt adja, hogy k különböző tárgyat n embernek úgy, hogy mindenki kapjon, $\sum_{j=0}^n (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^k$ -féleképpen lehet kiosztani (ennyi $[k] \rightarrow [n]$ szürjektív függvény van). Ha $k < n$, ez 0 — ami szintén egy nem nyilvánvaló azonosság.

Második alkalmazás: fixpontmentes permutációk

A ruhatár-probléma. Egy színházi előadás után a ruhatáros n kabátot teljesen véletlenszerűen ad vissza n embernek. Hányféleképpen történhet ez úgy, hogy **senki se** a saját kabátját kapja vissza?

Matematikailag: az $[n]$ halmaz π permutációit (önmagára vett bijekcióit) vizsgáljuk. Az i pont **fixpontja** π -nek, ha $\pi(i) = i$ (az i -edik ember a saját kabátját kapta). A kérdés: hány **fixpontmentes** permutáció van? Jelöljük ezt D_n -nel.

Megoldás szitával. Legyen A az összes permutáció halmaza, $|A| = n!$. Legyen A_i azoknak a permutációknak a halmaza, amelyekben i fixpont.

- $|A_i| = (n-1)!$: az i helyben marad, a többi $n-1$ elem tetszőlegesen permutálható.
- $|A_i \cap A_j| = (n-2)!$: i és j is helyben marad.
- $|A_i \cap A_j \cap A_k| = (n-3)!$, és általában egy j elemű I halmazra $|A_I| = (n-j)!$.

A szitaformula szerint

$$D_n = n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \dots + (-1)^n \binom{n}{n} 0!.$$

Mivel $\binom{n}{j}(n-j)! = \frac{n!}{j!(n-j)!}(n-j)! = \frac{n!}{j!}$, ez egyszerűbb alakra hozható:

Tétel. Az $[n]$ halmaz fixpontmentes permutációinak száma

$$D_n = n! \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right) = n! \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j}{j!}.$$

Az első néhány érték: $D_1 = 0$, $D_2 = 1$, $D_3 = 2$, $D_4 = 9$, $D_5 = 44$. (Például $D_3 = 2$: a 231 és a 312 permutáció.)

Mit mond ez a valószínűségről? Annak a valószínűsége, hogy véletlen kabátkiosztásnál senki sem kapja a sajátját, $\frac{D_n}{n!}$ — ez éppen a zárójelben álló összeg. Az előadáson elhangzott, hogy ez $n \rightarrow \infty$ esetén $\frac{1}{e} \approx 0,3679$ -hez tart. Meglepő módon tehát a valószínűség gyakorlatilag nem függ attól, hogy 5 vagy 500 ember van a ruhatárban.

Kiegészítés — miért $\frac{1}{e}$? Az analízisből ismert, hogy az exponenciális függvény hatványsora minden valós x -re konvergens, és $e^x = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!}$; speciálisan

$$\frac{1}{e} = e^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

A $\frac{D_n}{n!}$ szám ennek a sornak az első $n+1$ tagjából álló részletösszege, tehát valóban $\frac{1}{e}$ -hez tart.

Ennél több is igaz: D_n az $\frac{n!}{e}$ számhoz legközelebbi egész ($n \geq 1$). Valóban,

$$\frac{n!}{e} - D_n = n! \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!} = (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} - \dots \right).$$

A zárójelben egy váltakozó előjelű sor áll, amelynek tagjai abszolút értékben szigorúan csökkenően tartanak 0-hoz. Az ilyen sor összege (a Leibniz-típusú sorokról tanultak szerint) az első tag és 0 közé esik, így

$$\left| \frac{n!}{e} - D_n \right| < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2}.$$

Például $\frac{5!}{e} \approx 44,146$, és valóban $D_5 = 44$.

Harmadik alkalmazás: az Euler-féle φ függvény

Definíció. Egy $n \geq 1$ egészre $\varphi(n)$ az $[n] = \{1, \dots, n\}$ halmaz azon elemeinek száma, amelyek **relatív prímek** n -hez (vagyis n -nel vett legnagyobb közös osztójuk 1).

Például $\varphi(10) = |\{1, 3, 7, 9\}| = 4$, és $\varphi(p) = p - 1$ minden p prímre. (Az előadáson $f(n)$ -nel jelöltük; a φ jelölés a számelméletben szokásos.)

Hogyan számolható ki $\varphi(n)$ általában? Legyen $n > 1$ prímtényezős felbontása

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k},$$

ahol $p_1, \dots, p_k$ különböző prímek. Egy $m \in [n]$ szám pontosan akkor **nem** relatív prím n -hez, ha van közös prímosztójuk, vagyis ha valamelyik p_i osztja m -et. Ez tipikus szitahelyzet:

- az alaphalmaz $A = [n]$, $|A| = n$;
- A_i a p_i -vel osztható elemek halmaza, $|A_i| = \frac{n}{p_i}$;
- $A_i \cap A_j$ a $p_i p_j$ -vel osztható elemek halmaza, $|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}$; és így tovább.

A szitaformula szerint

$$\varphi(n) = n - \frac{n}{p_1} - \frac{n}{p_2} - \dots - \frac{n}{p_k} + \frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \dots + \frac{n}{p_{k-1} p_k} - \frac{n}{p_1 p_2 p_3} - \dots$$

és ez a kifejezés szorzattá alakítható:

Tétel. Ha $n > 1$ különböző prímosztói $p_1, \dots, p_k$, akkor

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

Például $\varphi(10) = 10 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 4$ és $\varphi(12) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 4$ (valóban: 1, 5, 7, 11).

Kiegészítés — a két hiányzó lépés.

1. *A metszetek elemszáma.* Legyen $I \subseteq [k]$ nemüres, és $d = \prod_{i \in I} p_i$. Egy m szám pontosan akkor osztható minden p_i -vel ($i \in I$), ha osztható d -vel: az egyik irány nyilvánvaló, a másik a prímfelbontás egyértelműségéből következik, hiszen a p_i -k különböző prímek, így mind szerepelnek m prímfelbontásában. Tehát A_I a d többszöröseinek halmaza $[n]$ -ben. Mivel $d \mid n$, ezek a $d, 2d, \dots, \frac{n}{d} \cdot d$ számok, vagyis $|A_I| = \frac{n}{d}$.

2. *A szorzattá alakítás.* Bontsuk fel a zárójeleket az

$$n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

szorzatban! Mint a binomiális tétel bizonyításában, egy tagot úgy kapunk, hogy minden tényezőből vagy az 1-et, vagy a $-\frac{1}{p_i}$ -t választjuk. Ha a második lehetőséget éppen az $I \subseteq [k]$ indexekre választjuk, akkor a kapott tag

$$n \prod_{i \in I} \left(-\frac{1}{p_i}\right) = (-1)^{|I|} \frac{n}{\prod_{i \in I} p_i}.$$

Minden I pontosan egyszer fordul elő, így a kifejtés $\sum_{I \subseteq [k]} (-1)^{|I|} \frac{n}{\prod_{i \in I} p_i}$, ami éppen a szitaformula jobb oldala. ■

A következő előadáson két új témát kezdünk el: a **keresési feladatokat** és a **Fibonacci-számokat**.

Az I. rész összefoglalása

- A leszámolás négy alapelve: **esetszétválasztás** (+), **a rossz esetek kidobása** (−), **független választás** (×) és a **tehén szabály** (/). Ezekhez jön a **skatulyaelv** (létezés)

és a **bijekció-elv** (két halmaz azonos elemszámú, ha kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők).

- Képletek: $n!$, $\frac{(n_1 + \dots + n_k)!}{n_1! \dots n_k!}$, $\frac{n!}{(n-k)!}$, n^k , $\binom{n}{k}$, $\binom{n+k-1}{k}$.
 - A binomiális együtthatók tulajdonságai: szimmetria, Pascal-szabály, $\sum_i \binom{n}{i} = 2^n$, a váltakozó összeg 0 ($n \geq 1$). Binomiális tétel: $(x + y)^n = \sum_i \binom{n}{i} x^{n-i} y^i$.
 - **Logikai szita:** $|A \setminus \bigcup A_i| = \sum_I (-1)^{|I|} |A_I|$. Bizonyítás: mindenkit pontosan egyszer számolunk.
 - Alkalmazások: $n! = \sum_j (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^n$; a fixpontmentes permutációk száma $D_n = n! \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j}{j!} \approx \frac{n!}{e}$; $\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$.
-

II. RÉSZ: KERESÉS, REKURZIÓK ÉS CATALAN-SZÁMOK

Ebben a részben két új gondolat jelenik meg. Az egyik a **keresés**: hány kérdés kell ahhoz, hogy egy ismeretlen elemet megtaláljunk? A másik a **rekurzió**: egy sorozat tagjait az előző tagokból fejezzük ki, és ebből próbálunk explicit képletet nyerni. A rész végén a Catalan-számok mindkét eddigi eszköztárat — a bijekció-elvet és a rekurziót — egyszerre használják.

9. Keresési feladatok: a barkochba

Előadás: 2026. 09. 17.

A **barkochba** ismert társasjáték: az egyik játékos gondol valamire, a másik eldöntendő (igen/nem) kérdésekkel próbálja kitalálni. (A játék nevét Bar Kochbáról, a Római Birodalom elleni 132–135-ös zsidó felkelés vezetőjéről kapta.) A matematikai változat a **keresési elmélet** egyik alapfeladata.

Feladat. Valaki gondol egy $x \in \{1, 2, \dots, n\}$ számra. Igen/nem kérdéseket tehetünk fel. Legalább hány kérdés kell ahhoz, hogy **a legrosszabb esetben is** biztosan kitaláljuk x -et?

Minden kérdés egyenértékű azzal, hogy „ $x \in S$?” valamely $S \subseteq [n]$ halmazzal: az S azoknak a számoknak a halmaza, amelyekre a válasz „igen” volna. A kérdés tehát úgy is fogalmazható: hány részhalmazzal rákérdezve tudjuk biztosan azonosítani x -et?

Egy példa: $n = 100$

Kérdezzünk mindig úgy, hogy a még szóba jövő számok **felét** (amennyire lehet) fedje le a kérdés. Ekkor a szóba jövő számok száma a válaszoktól függetlenül legfeljebb

$$100 \rightarrow 50 \rightarrow 25 \rightarrow 13 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1,$$

vagyis 7 kérdés elég. Kevesebb nem elég, mert 6 kérdésre legfeljebb $2^6 = 64$ -féle válasz-sorozat érkezhetsz, ez pedig nem tud 100 különböző számot megkülönböztetni. A kettes hatványok:

$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64, 2^7 = 128,$$

és $\log_2 100 \approx 6,64$, tehát a válasz $\lceil \log_2 100 \rceil = 7$.

Kell is ennyi kérdés

Tétel. Az $\{1, \dots, n\}$ halmazból egy elem kitalálásához a legrosszabb esetben legalább $\lceil \log_2 n \rceil$ kérdés kell — akkor is, ha a kérdéseket a korábbi válaszok ismeretében tehetjük fel.

Bizonyítás (az ördög ellen játszunk). Képzeld el, hogy a gondoló játékos egy rosszindulatú **ördög**, aki nem dönti el előre, melyik számra gondolsz, hanem menet közben válaszol, mindig úgy, hogy a lehető legjobban megnehezítse a dolgodat. Csalni azonban nem csalsz (vagy ha csalsz, és rajtakapjuk, veszít): **mindig lennie kell legalább egy olyan számnak, amellyel az eddigi összes válasza összhangban van.** Ha egy ilyen ördög ellen is kitaláljuk a számot q kérdéssel, akkor bármely „becsületes” gondolóval szemben is.

Jelölje C_j azoknak a számoknak a halmazát, amelyek a j -edik válasz után még szóba jönnek (amelyekkel az első j válasz összhangban van); $C_0 = [n]$. A következő kérdés a C_j halmazt két részre vágja: azokra, amelyekre a válasz „igen” volna, és azokra, amelyekre „nem”. Az ördög **stratégiája**: mindig úgy válaszol, hogy a még szóba jövő elemek száma a lehető legnagyobb maradjon, vagyis a nagyobbik részt választja. Ezért

$$|C_{j+1}| \geq \frac{|C_j|}{2}, \quad \text{tehát} \quad |C_1| \geq \frac{n}{2}, |C_2| \geq \frac{n}{4}, \dots, |C_j| \geq \frac{n}{2^j}.$$

Tegyük fel, hogy q kérdés után biztosan tudjuk a választ. Ekkor $|C_q| = 1$, különben két, a válaszokkal egyaránt összhangban levő szám közül nem tudnánk dönteni (és az ördög mindig a másikat mondaná). Így

$$1 = |C_q| \geq \frac{n}{2^q} \implies 2^q \geq n \implies q \geq \log_2 n,$$

és mivel q egész, $q \geq \lceil \log_2 n \rceil$. ■

Mi van, ha előre le kell írni az összes kérdést?

A felezgetésnél minden kérdés függ a korábbi válaszoktól: a második kérdés attól függ, hogy a gondolt szám az első kérdésben szereplő felbe esett-e. Mi a helyzet, ha az összes kérdést **előre le kell írunk**, és csak utána kapjuk meg a válaszokat? Meglepő módon ugyanennyi kérdés ekkor is elég — és ez egyúttal általános n -re is igazolja a felső becslést.

Állítás. $\lceil \log_2 n \rceil$ kérdés elég, akkor is, ha az összes kérdést előre le kell írunk.

Bizonyítás. Gondolatban csökkentjük a gondolt számot 1-gyel, így az $A = \{0, 1, \dots, n-1\}$ halmazból kell kitalálnunk egy elemet. Legyen $m = \lceil \log_2 n \rceil$; ekkor $n \leq 2^m$, tehát A minden eleme kisebb 2^m -nél, így felírható a **kettes számrendszerben** m jeggyel (szükség esetén vezető nullákkal kiegészítve). A kérdések:

1. „Az első (legmagasabb helyiértékű) jegye 1-es?”
2. „A második jegye 1-es?”
3. ...és így tovább az m -edik jegyig.

Az m válasz együtt megadja a gondolt szám összes bináris jegyét, vagyis magát a számot. ■

A két eredményt összevetve: **a barkochbában $\lceil \log_2 n \rceil$ kérdés kell és elég**, és ehhez nem is kell alkalmazkodnunk a válaszokhoz.

Megjegyzés (információelmélet). Az alsó becslés így is elmondható: q igen/nem válasz összesen legfeljebb 2^q -féle válaszsorozatot ad. Ha egy kérdezési stratégiát **bináris fával** ábrázolunk — minden csúcsban egy kérdés áll, és a válasz szerint balra vagy jobbra lépünk —, akkor egy q mélységű fának legfeljebb 2^q levele van, minden levélhez pedig legfeljebb egy szám tartozhat. Ehhez $2^q \geq n$ kell. Ez az információelmélet alapgondolata: n lehetőség közül egy kiválasztásához $\log_2 n$ bit információ szükséges.

10. A Fibonacci-sorozat

Definíció (Fibonacci-számok). Legyen $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, és $n \geq 3$ esetén

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}. \quad (*)$$

Az első néhány tag:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

A (*) egyenlőség egy **másodrendű rekurzió**: minden tagot az előző **kettőből** állít elő. Fontos látni, hogy a rekurzió (a „képzési szabály”) önmagában **nem határozza meg** a sorozatot: a 2, 5, 7, 12, 19, ... sorozat is kielégíti. A sorozat egyértelmű megadásához **kezdeti feltétel** is kell — itt $F_1 = F_2 = 1$. Kényelmes a sorozatot visszafelé is kiterjeszteni: a (*) szabály szerint $F_2 = F_1 + F_0$, ezért legyen $F_0 = 0$.

Mivel a sorozatot rekurzió definiálja, a tulajdonságait természetes módon **teljes indukcióval** bizonyíthatjuk.

A Fibonacci-számok összege

Feladat. Mennyi $F_1 + F_2 + \dots + F_k$?

Az első ötlet az lehetne, hogy a tagokat a rekurzió segítségével visszabontjuk F_1 -re és F_2 -re, és megszámoljuk, melyik hányszor szerepel. Ez azonban gyorsan áttekinthetetlenné válik. Számoljunk inkább néhány esetet!

k	1	2	3	4	5	6	7
$F_1 + \dots + F_k$	1	2	4	7	12	20	33
F_{k+2}	2	3	5	8	13	21	34

A minta szembeötlő.

Állítás. Minden $k \geq 1$ esetén $\sum_{i=1}^k F_i = F_{k+2} - 1$.

Bizonyítás (teljes indukció k szerint). $k = 1$ -re: $F_1 = 1 = 2 - 1 = F_3 - 1$. Tegyük fel, hogy az állítás igaz k -ra, és bizonyítsuk $k + 1$ -re:

$$F_1 + \dots + F_k + F_{k+1} = (F_{k+2} - 1) + F_{k+1} = (F_{k+1} + F_{k+2}) - 1 = F_{k+3} - 1,$$

ahol az utolsó lépésben a (*) rekurziót használtuk. ■

Figyeljük meg a módszert: **sejtés kis esetekből, majd bizonyítás indukcióval**. Ez a rekurzív sorozatoknál újra és újra bevált stratégia.

Egy érdekesség

Az egymást követő Fibonacci-számok hányadosa:

$$\frac{F_3}{F_2} = 2, \quad \frac{F_4}{F_3} = 1,5, \quad \frac{F_5}{F_4} \approx 1,667, \quad \frac{F_6}{F_5} = 1,6, \quad \dots, \quad \frac{F_{10}}{F_9} \approx 1,6176, \dots$$

Úgy tűnik, a hányados egy 1,618 ... körüli számhoz tart. Ez az **aranymetszés** aránya; hogy miért, azt a következő szakaszban, az explicit képlet birtokában látjuk be.

11. Lineáris rekurziók: a mértani sorozat ötlete

Létezik-e **explicit képlet** F_n -re, amelyből a sorozat tagjai az előzők kiszámolása nélkül is megkaphatók?

Az ötlet

Keressünk olyan **mértani sorozatot**, amely kielégíti a $(*)$ rekurziót! Ha $a_n = q^n$, akkor a $(*)$ feltétel

$$q^n = q^{n-1} + q^{n-2}.$$

A $q = 0$ megoldás érdektelen (a csupa 0 sorozatot adja). Ha $q \neq 0$, oszthatunk q^{n-2} -vel:

$$q^2 = q + 1, \quad q^2 - q - 1 = 0, \quad q_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Tehát a

$$\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n \quad \text{és} \quad \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

sorozatok kielégítik a $(*)$ rekurziót. Persze egyik sem a Fibonacci-sorozat (nem is egészek). Hogyan lehetne belőlük „kikeverni” a Fibonacci-számokat?

A megoldások vektorteret alkotnak

Idézzük fel a lineáris algebrából: egy **vektortér** olyan halmaz, amelynek elemei összeadhatók és számmal szorozhatók, a szokásos szabályok szerint (például $\lambda(v_1 + v_2) = \lambda v_1 + \lambda v_2$). A valós számsorozatok vektorteret alkotnak, ha az összeadást és a számmal szorzást tagonként végezzük: $(a_n) + (b_n) = (a_n + b_n)$ és $c(a_n) = (c a_n)$.

Állítás. A $(*)$ rekurziót kielégítő sorozatok **alteret** alkotnak a sorozatok vektorterében:

1. ha (a_n) kielégíti $(*)$ -ot és $c \in \mathbb{R}$, akkor $(c \cdot a_n)$ is kielégíti;
2. ha (a_n) és (b_n) kielégíti $(*)$ -ot, akkor $(a_n + b_n)$ is kielégíti.

Bizonyítás. 1. Ha $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, akkor $c a_n = c(a_{n-1} + a_{n-2}) = c a_{n-1} + c a_{n-2}$.

2. Ha $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ és $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$, akkor összeadva

$$a_n + b_n = (a_{n-1} + b_{n-1}) + (a_{n-2} + b_{n-2}). \blacksquare$$

Következésképpen az előbb talált két mértani sorozat bármely **lineáris kombinációja**,

$$a_n = \alpha \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \beta \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n,$$

is kielégíti a $(*)$ rekurziót, bármilyen α, β számokra. Már csak α -t és β -t kell úgy megválasztani, hogy a **kezdeti feltételek** is teljesüljenek. Ehhez a következő egyszerű, de fontos észrevételre van szükség.

Kiegészítés — Lemma (egyértelműség). Ha az $(a_n)_{n \geq 0}$ és $(b_n)_{n \geq 0}$ sorozatok ugyanazt a másodrendű rekurziót elégítik ki — vagyis valamely rögzített c_1, c_2 számokkal $n \geq 2$ esetén $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ és $b_n = c_1 b_{n-1} + c_2 b_{n-2}$ —, és $a_0 = b_0$, $a_1 = b_1$, akkor $a_n = b_n$ minden n -re.

Bizonyítás. Erős teljes indukció n szerint. $n = 0, 1$ -re ez a feltétel. Ha $n \geq 2$, és $a_m = b_m$ minden $m < n$ -re, akkor

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} = c_1 b_{n-1} + c_2 b_{n-2} = b_n. \blacksquare$$

Egy másodrendű rekurzió megoldását tehát az első két tagja egyértelműen meghatározza. Ezért ha olyan α, β -t találunk, amelyekkel a fenti lineáris kombináció az $n = 0$ és $n = 1$ helyen egyezik a Fibonacci-sorozattal, akkor **minden** n -re egyezik vele.

A Binet-képlet

Írjuk fel a feltételeket $n = 0$ és $n = 1$ esetén ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$):

- $n = 0$: $\alpha + \beta = F_0 = 0$, tehát $\beta = -\alpha$.
- $n = 1$: $\alpha \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} - \alpha \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \alpha\sqrt{5} = F_1 = 1$, tehát $\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

Tétel (Binet-képlet). Minden $n \geq 0$ esetén

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

Meglepő, hogy a jobb oldal — tele irracionális számokkal — mindig egész. Jelölje $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ és $\Psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0,618$ a két gyököt. Mivel $|\Psi| < 1$, a Ψ^n tag gyorsan eltűnik, és a Fibonacci-számok lényegében egy mértani sorozat tagjai: $F_n \approx \frac{\Phi^n}{\sqrt{5}}$.

Kiegészítés — az aranymetszés.

1. $\frac{F_{n+1}}{F_n} \rightarrow \Phi$. A Binet-képlet szerint, Φ^n -nel egyszerűsítve,

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{\Phi^{n+1} - \Psi^{n+1}}{\Phi^n - \Psi^n} = \Phi \cdot \frac{1 - (\Psi/\Phi)^{n+1}}{1 - (\Psi/\Phi)^n}.$$

Mivel $|\Psi/\Phi| < 1$, a mértani sorozatokról tanultak szerint $(\Psi/\Phi)^n \rightarrow 0$, így a tört 1-hez, a hányados Φ -hez tart.

2. F_n a $\frac{\Phi^n}{\sqrt{5}}$ számhoz legközelebbi egész. Valóban, $\left| F_n - \frac{\Phi^n}{\sqrt{5}} \right| = \frac{|\Psi|^n}{\sqrt{5}} \leq \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}$ minden $n \geq 0$ -ra. Például $\frac{\Phi^{10}}{\sqrt{5}} \approx 55,004$, és $F_{10} = 55$.

12. Az általános másodrendű lineáris rekurzió

A Fibonacci-sorozatnál alkalmazott módszer jóval általánosabban is működik.

Definíció. Állandó együtthatós, másodrendű lineáris rekurciónak nevezzük az

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \quad (n \geq 2) \quad (**)$$

összefüggést, ahol c_1, c_2 adott számok. Ehhez két **kezdeti feltétel** tartozik: a_0 és a_1 adott.

(Feltesszük, hogy $c_2 \neq 0$; ha $c_2 = 0$, akkor a rekurzió valójában elsőrendű, és a megoldás egyszerűen mértani sorozat.) Az előző szakasz állítása és bizonyítása szó szerint átvihető: a $(**)$ -ot kielégítő sorozatok alteret alkotnak. A lemma szerint pedig minden megoldást egyértelműen meghatároz az (a_0, a_1) pár — szemléletesen: a megoldások altere **kétdimenziós**.

Az ötlet ugyanaz: keressünk (q^n) alakú mértani sorozatot, amely kielégíti $(**)$ -ot:

$$q^n = c_1 q^{n-1} + c_2 q^{n-2}.$$

Mivel $c_2 \neq 0$, a $q = 0$ nem jó, így q^{n-2} -vel oszthatunk:

Definíció. A $(**)$ rekurzió **karakterisztikus egyenlete**

$$q^2 - c_1 q - c_2 = 0.$$

Két különböző gyök

Tétel. Ha a karakterisztikus egyenletnek két különböző gyöke van, $q_1 \neq q_2$, akkor a $(**)$ rekurzió minden megoldása

$$a_n = \alpha q_1^n + \beta q_2^n$$

alakú, ahol az α, β számokat a kezdeti feltételek egyértelműen meghatározzák.

Bizonyítás. A (q_1^n) és a (q_2^n) sorozat kielégíti $(**)$ -ot, így — mivel a megoldások alteret alkotnak — tetszőleges α, β mellett az $\alpha q_1^n + \beta q_2^n$ sorozat is. Az $n = 0$ és $n = 1$ helyen a kezdeti feltételek:

$$\alpha + \beta = a_0, \quad \alpha q_1 + \beta q_2 = a_1.$$

Ha ebből a lineáris egyenletrendszerből α és β egyértelműen meghatározható, akkor kész vagyunk: a kapott sorozat és (a_n) az első két tagban megegyezik, tehát a lemma szerint minden tagban. ■

Kiegészítés — az egyenletrendszer megoldása. Az első egyenlet q_2 -szeresét a másodikból kivonva $\alpha(q_1 - q_2) = a_1 - a_0 q_2$, az első egyenlet q_1 -szereséből a másodikat kivonva $\beta(q_1 - q_2) = a_0 q_1 - a_1$. Mivel $q_1 \neq q_2$, oszthatunk:

$$\alpha = \frac{a_1 - a_0 q_2}{q_1 - q_2}, \quad \beta = \frac{a_0 q_1 - a_1}{q_1 - q_2},$$

és ez az egyetlen megoldás. (A lineáris algebra nyelvén: az egyenletrendszer determinánsa $q_2 - q_1 \neq 0$.)

Komplex gyökök. Ha a diszkrimináns $c_1^2 + 4c_2 < 0$, akkor a két gyök egymás komplex konjugáltja, $q_2 = \overline{q_1}$. A fenti érvelés szó szerint működik a komplex számok körében is: a megoldás $\alpha q_1^n + \beta q_2^n$, most komplex α -val és β -val. Valós kezdőértékek esetén $\beta = \overline{\alpha}$ adódik, és a két tag összege (egymás konjugáltjai lévén) valós. Például az $a_n = -a_{n-2}$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ rekurzió karakterisztikus egyenlete $q^2 + 1 = 0$, gyökei $\pm i$, a megoldás $a_n = \frac{i^n - (-i)^n}{2i}$, vagyis a $0, 1, 0, -1, 0, 1, \dots$ periodikus sorozat.

Kétszeres gyök

Mi a helyzet, ha a karakterisztikus egyenletnek **kétszeres** gyöke van, $q_1 = q_2 = q$? Ez pontosan akkor fordul elő, ha a diszkrimináns 0, vagyis $c_1^2 + 4c_2 = 0$; ekkor $q = \frac{c_1}{2}$. Ilyenkor a fenti módszer csak **egy** mértani sorozatot ad, (q^n) -t, amelynek többszörösei általában nem elégíthetik ki mindkét kezdeti feltételt. Kell egy második, tőle „független” megoldás.

Állítás. Ha a karakterisztikus egyenletnek q kétszeres gyöke, akkor nemcsak a (q^n) , hanem az $(n \cdot q^n)$ sorozat is kielégíti a $(**)$ rekurziót.

Az előadáson elhangzott, hogy ez igaz, a bizonyítás házi feladat volt.

Kiegészítés — bizonyítás. Azt kell belátnunk, hogy minden $n \geq 2$ -re

$$nq^n = c_1(n-1)q^{n-1} + c_2(n-2)q^{n-2}.$$

Mivel $q = \frac{c_1}{2} \neq 0$ (hiszen $c_2 \neq 0$ miatt $c_1 \neq 0$), oszthatunk q^{n-2} -vel, és átrendezve a bizonyítandó állítás:

$$nq^2 - c_1(n-1)q - c_2(n-2) = 0 \iff n(q^2 - c_1q - c_2) + (c_1q + 2c_2) = 0.$$

Az első zárójel 0, mert q gyöke a karakterisztikus egyenletnek. A második zárójel:

$$c_1q + 2c_2 = c_1 \cdot \frac{c_1}{2} + 2c_2 = \frac{c_1^2 + 4c_2}{2} = 0,$$

mert a diszkrimináns 0. ■

Tétel. Ha a karakterisztikus egyenletnek q kétszeres gyöke, akkor a $(**)$ rekurzió minden megoldása

$$a_n = \alpha q^n + \beta n q^n$$

alakú, ahol α, β a kezdeti feltételekből egyértelműen meghatározható.

Kiegészítés — bizonyítás. Az állítás és az altér-tulajdonság szerint minden ilyen alakú sorozat megoldás. A kezdeti feltételek: $n = 0$ -ra $\alpha = a_0$; $n = 1$ -re $(\alpha + \beta)q = a_1$, ahonnan ($q \neq 0$ miatt) $\beta = \frac{a_1}{q} - \alpha$. Ezek egyértelműen meghatározott számok, és a lemma szerint a kapott sorozat minden tagban megegyezik (a_n) -nel. ■

Kidolgozott példa

Feladat. Oldjuk meg az $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ rekurziót az $a_0 = 2, a_1 = 6$ kezdeti feltételekkel!

Megoldás. 1. **A karakterisztikus egyenlet felírása:** $q^2 - 4q + 4 = 0$, azaz $(q - 2)^2 = 0$. A gyök kétszeres: $q_1 = q_2 = 2$.

2. **Két megoldássorozat:** (2^n) és $(n \cdot 2^n)$, tehát $a_n = \alpha \cdot 2^n + \beta \cdot n \cdot 2^n$.

3. **Kezdeti feltételek:**

- $n = 0$: $2 = \alpha \cdot 2^0 + \beta \cdot 0 \cdot 2^0 = \alpha$, tehát $\alpha = 2$;
- $n = 1$: $6 = \alpha \cdot 2 + \beta \cdot 1 \cdot 2 = 4 + 2\beta$, tehát $\beta = 1$.

4. **Eredmény:** $a_n = 2 \cdot 2^n + n \cdot 2^n = (n + 2) \cdot 2^n$.

Ellenőrzés: a rekurzióból $a_2 = 4 \cdot 6 - 4 \cdot 2 = 16$, a képletből $a_2 = 4 \cdot 4 = 16$. ■

13. A lépcsőmászás feladata

Feladat. Egy n fokú lépcsőn hányféleképpen lehet felmenni, ha minden lépésben 1 vagy 2 fokot lépünk?

Ez a feladat jól mutatja a rekurzív gondolkodás menetét, amelyet az előadáson három lépésre bontottunk.

0. lépés: nevezzük el a keresett mennyiséget. Jelölje L_n az n fokú lépcsőn való felmenések számát.

1. lépés: számoljunk ki kis eseteket.

n	1	2	3	4
L_n	1	2	3	5

Például $n = 3$ -ra a lehetőségek: $1 + 1 + 1$, $1 + 2$, $2 + 1$; $n = 4$ -re: $1 + 1 + 1 + 1$, $1 + 1 + 2$, $1 + 2 + 1$, $2 + 1 + 1$, $2 + 2$.

2. lépés: keressünk lineáris rekurziót (esetszétválasztással). Válasszuk szét a felmenéseket aszerint, hogy az **utolsó** lépés 1 vagy 2 fokos volt-e. Ha 1 fokos, akkor előtte az $(n - 1)$ -edik fokra kellett feljutnunk, ez L_{n-1} -féleképpen történhetett. Ha 2 fokos, akkor előtte az $(n - 2)$ -edik fokra, ez L_{n-2} lehetőség. A két eset diszjunkt, így $n \geq 3$ esetén

$$L_n = L_{n-1} + L_{n-2}.$$

Ez éppen a Fibonacci-rekurzió! A kezdőértékek: $L_1 = 1 = F_2$ és $L_2 = 2 = F_3$. Mivel a két sorozat ugyanazt a rekurziót elégíti ki, és az első két tagjuk egyezik, a 11. szakasz lemmája szerint (eltolt indexeléssel)

$$L_n = F_{n+1} \quad \text{minden } n \geq 1 \text{ esetén.}$$

14. Rácsutak és a tükrözési elv

A Catalan-számok előkészítéseként két, első ránézésre egymástól távoli feladatot vizsgálunk.

Rácsutak

Feladat. A síkon az $S = (0, 0)$ pontból az $E = (a, b)$ pontba szeretnénk eljutni úgy, hogy minden lépésben 1-et lépünk **jobbra** vagy 1-et **felfelé**. Hányféle ilyen útvonal (töröttvonal) van?

Állítás. Az ilyen útvonalak száma $\binom{a+b}{a}$.

Kiegészítés — bizonyítás. Minden útvonal pontosan a jobbra és b felfelé lépésből áll, összesen $a + b$ lépésből. Az útvonalat egyértelműen meghatározza, hogy az $a + b$ lépés közül melyik a a jobbra lépés; és minden ilyen kiválasztás pontosan egy útvonalat ad. (Ez bijekció az útvonalak és az $[a + b]$ halmaz a elemű részhalmazai között.) Az útvonalak száma tehát $\binom{a+b}{a}$. Másképp: ez a $J \dots J F \dots F$ szó (a darab J , b darab F) ismétléses permutációinak száma, $\frac{(a+b)!}{a!b!}$. ■

A folyó-probléma

Feladat. Egy egyenes folyó ugyanazon partján áll a B pont és az M pont. A B -ből az M -be kell eljutnunk úgy, hogy közben **érintjük a folyót** (például vizet merítünk belőle). Melyik a legrövidebb útvonal?

Az ötlet a **tükrözés**. Tükrözzük az M pontot a folyó egyenesére; a tükörképe legyen M' . Ha P a folyó egy tetszőleges pontja, akkor a tükrözés miatt $|PM| = |PM'|$, így a $B \rightarrow P \rightarrow M$ útvonal hossza

$$|BP| + |PM| = |BP| + |PM'| \geq |BM'|$$

a háromszög-egyenlőtlenség szerint, egyenlőséggel pontosan akkor, ha P a BM' szakaszon van. A legrövidebb útvonal tehát az, amelyik a folyót a BM' szakasz és a folyó metszéspontjában érinti.

Valójában többet is kaptunk: egy **kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést** a folyót érintő $B \rightarrow M$ útvonalak és a $B \rightarrow M'$ útvonalak között. Egy folyót érintő útvonalnak az **első** érintési pont *utáni* részét tükrözzük a folyóra, így egy B -ből M' -be vezető útvonalat kapunk; megfordítva, minden $B \rightarrow M'$ útvonal keresztezi a folyót (hiszen B és M' a két ellentétes parton van), és ha az első közös pont utáni részét visszatükrözzük, a folyót érintő $B \rightarrow M$ útvonalat kapunk. Ez a két művelet egymás inverze. Ez a **tükrözési elv**, és a következő szakaszban rácsutakra alkalmazzuk.

15. A Catalan-számok

A **Catalan-számok** Eugène Charles Catalan belga matematikusról kapták a nevüket. A sorozat első tagjai

$$1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, \dots$$

Rengeteg leszámplálási feladat vezet rájuk. Most egy ilyen feladaton keresztül vezetjük be őket, és megmutatjuk, hogyan számolhatók ki: először a tükrözési elvvel, a következő szakaszban pedig — ahol előkerül a rekurziós gondolat is — rekurzióval.

A pénztár-feladat

Feladat. Egy mozipénztár előtt $2n$ ember áll sorban. A jegy 1 euróba kerül; n embernél egy 1 eurós, n embernél egy 2 eurós érme van. A pénztárban kezdetben **nincs pénz**. A 2 eurós érmével fizetőknek 1 eurót vissza kell adni. Hányféle lehet a sorban állók sorrendje

(csak azt figyeljük, ki milyen érmével fizet), ha azt szeretnénk, hogy a pénztáros **mindig vissza tudjon adni?**

Ha például az első ember 2 euróval fizet, akkor nem lehet visszaadni: ez egy rossz sorban állás. Kis esetek: $n = 1$ -re csak az $(1, 2)$ sorrend jó; $n = 2$ -re az $(1, 1, 2, 2)$ és az $(1, 2, 1, 2)$, tehát 2 jó sorrend van; $n = 3$ -ra 5.

A feladat sokféle alakban megfogalmazható:

- **± 1 sorozatok.** Írjunk $+1$ -et minden 1 eurós és -1 -et minden 2 eurós fizetőhöz. A pénztárban levő 1 eurósok száma a sorozat részletösszege. A jó sorrendek tehát éppen azok a sorozatok, amelyek n darab $+1$ -ből és n darab -1 -ből állnak, és **minden kezdőszeletük összege nemnegatív**. Például $n = 5$ -re a

+ - + + + - + - - -

sorozat részletösszegei 1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 0, tehát jó.

- **Helyes zárójelezések.** Ha $+1$ helyett „(-t, -1 helyett „)“-t írunk, a jó sorozatok éppen a helyesen zárójelezett kifejezések n zárójelpárral, például $(((\dots) \dots) \dots)$.
- **Rácsutak.** Ezt a változatot érdemes lerajzolni.

Ábrázoljuk!

Feleltessük meg minden sorrendnek egy rácsutat (töröttvonalat): az 1 eurós fizető legyen egy **jobbra** lépés, a 2 eurós egy **felfelé** lépés. Ez kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a sorrendek és a $(0, 0)$ -ból az (n, n) -be vezető rácsutak között. Ha j ember fizetett már, és közülük x fizetett 1, y pedig 2 euróval, akkor az út az (x, y) pontban van, a pénztárban pedig $x - y$ darab 1 eurós van.

Mikor rossz egy sorrend? Pontosan akkor, ha valamikor egy 2 eurós fizető üres pénztárhoz érkezik, vagyis ha az út valamikor az $y = x$ átló **főlé** lép. Mivel az út rácspontokon halad, ez azt jelenti, hogy az út **rálép az $y = x + 1$ egyenesre**. Ez a **tiltott egyenes**: ha rálépünk, baj van.

Dobjuk ki a rosszat!

Az összes út száma $\binom{2n}{n}$ (14. szakasz). A jó utak számához meg kell számolnunk a rossz utakat, vagyis azokat, amelyek érintik a tiltott egyenest. Ehhez a tükrözési elvet használjuk.

Állítás. A $(0, 0)$ -ból (n, n) -be vezető, az $y = x + 1$ egyenest érintő rácsutak kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők a $(0, 0)$ -ból az $(n - 1, n + 1)$ pontba vezető rácsutaknak.

Bizonyítás. Az $y = x + 1$ egyenesre való tükrözés az (x, y) pontot az $(y - 1, x + 1)$ pontba viszi, és a jobbra lépéseket felfelé lépésekké alakítja, és fordítva. Az (n, n) pont tükörképe $(n - 1, n + 1)$.

Legyen P egy rossz út, és T az a pont, ahol P **először** érinti a tiltott egyenest. Tükrözzük P -nek a T **utáni** részét az egyenesre, a T előtti részt pedig hagyjuk változatlanul. Az így kapott út $(0, 0)$ -ból indul, és a tükörképbe, $(n - 1, n + 1)$ -be érkezik.

Megfordítva: minden $(0, 0) \rightarrow (n - 1, n + 1)$ út érinti a tiltott egyenest. Az $y - x$ különbség ugyanis a $(0, 0)$ pontban 0, a végpontban 2, és minden lépés ± 1 -gyel változtatja, tehát valahol 1 — ott az út a tiltott egyenesen van. Az első ilyen pont utáni részt visszatükrözve egy $(0, 0) \rightarrow (n, n)$ rossz utat kapunk.

A két eljárás egymás inverze, mert a tükrözés nem változtat az első érintési ponton és az azt megelőző szakaszon. ■

A 14. szakasz szerint a $(0, 0) \rightarrow (n - 1, n + 1)$ utak száma $\binom{(n-1)+(n+1)}{n-1} = \binom{2n}{n-1}$. Így a jó utak száma $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$.

Tétel (a Catalan-számok képlete). A pénztár-feladat jó sorrendjeinek száma — az n -edik **Catalan-szám** —

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

Kiegészítés — a második egyenlőség. Mivel $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ és $n! = n \cdot (n-1)!$,

$$\binom{2n}{n-1} = \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!} = \frac{(2n)!}{n!n!} \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{n}{n+1} \binom{2n}{n},$$

így

$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) \binom{2n}{n} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}. \quad \blacksquare$$

Az első néhány érték (megállapodás szerint $C_0 = 1$, ami az üres sornak felel meg):

n	0	1	2	3	4	5	6
$\binom{2n}{n}$	1	2	6	20	70	252	924
C_n	1	1	2	5	14	42	132

16. A Catalan-számok rekurziója és alkalmazásai

Rekurzió

A Catalan-számokra rekurzió is felírható. A kérdés, amely elvezet hozzá: **mikor ürül ki először a pénztár?**

Tétel (Catalan-rekurzió). $C_0 = 1$, és minden $n \geq 1$ esetén

$$C_n = C_0 C_{n-1} + C_1 C_{n-2} + C_2 C_{n-3} + \cdots + C_{n-1} C_0 = \sum_{k=1}^n C_{k-1} C_{n-k}.$$

Bizonyítás. Legyen $n \geq 1$, és tekintsünk egy jó sorrendet. A pénztár kezdetben üres, és a végén is üres (ugyanannyi 1-es és 2-es érkezett). Legyen $2k$ ($1 \leq k \leq n$) az a pillanat, amikor a pénztár az indulás után **először** ürül ki; a rácsúton ez az a pont, ahol az út először tér vissza az $y = x$ átlóra, a (k, k) pont. Válasszuk szét a jó sorrendeket k értéke szerint.

Rögzített k mellett:

- Az **első** fizető 1 eurós (különben rossz volna a sorrend), a $2k$ -**adik** pedig 2 eurós (különben a pénztár nem ürülne ki éppen ekkor).
- A **közbülső** $2k - 2$ ember alatt a pénztár egyszer sem ürül ki, vagyis mindig van benne legalább az az 1 euró, amelyet az első ember hozott. Ha ezt az egy eurót „félretesszük”, a közbülső $2k - 2$ ember egy jó sorrendet alkot $k - 1$ darab 1-essel és $k - 1$ darab 2-essel; és fordítva, bármely ilyen jó sorrend megfelel. Ez C_{k-1} lehetőség. (A rácsúton: a $(1, 0)$ és a $(k, k - 1)$ pont közötti szakasz az $y = x - 1$ egyenesen vagy alatta halad, ami eltolva egy $(k - 1)$ -es jó út.)
- A (k, k) pont **utáni** $2n - 2k$ ember ismét üres pénztárral kezd, tehát tetszőleges jó sorrendet alkothat $n - k$ párral: C_{n-k} lehetőség.

A független választás elve szerint rögzített k mellett $C_{k-1} C_{n-k}$ jó sorrend van, és ezeket $k = 1, \dots, n$ -re összeadva kapjuk az állítást. ■

Ellenőrzés: $C_3 = C_0 C_2 + C_1 C_1 + C_2 C_0 = 2 + 1 + 2 = 5$, és $C_4 = 5 + 2 + 2 + 5 = 14$.

Megjegyzés. Ez a rekurzió nem lineáris, és nem is véges rendű: C_n kiszámolásához az **összes** korábbi tagra szükség van. A 12. szakasz módszere tehát nem alkalmazható rá —

a zárt képlethez itt a bijektív (tükrözéses) gondolatmenet vezetett el. A rekurzió viszont arra kiválóan alkalmas, hogy más feladatokról megmutassuk, hogy ugyancsak a Catalan-számokra vezetnek.

Kiegészítés — Lemma. Ha a $(t_n)_{n \geq 0}$ sorozatra $t_0 = 1$ és minden $n \geq 1$ -re $t_n = \sum_{k=1}^n t_{k-1} t_{n-k}$, akkor $t_n = C_n$ minden n -re.

Bizonyítás. Erős teljes indukció: $t_0 = 1 = C_0$, és ha $t_m = C_m$ minden $m < n$ -re, akkor a jobb oldalon csak n -nél kisebb indexek szerepelnek, így $t_n = \sum_{k=1}^n C_{k-1} C_{n-k} = C_n$. ■

Alkalmazások

(A) Sokszögek háromszögelése. Hányféleképpen bontható fel egy konvex n -szög egymást nem metsző átlóival háromszögekre? Jelölje ezt T_n .

n	3	4	5	6
T_n	1	2	5	14

(A háromszöget nem kell felbontani; a négyszöget a két átló bármelyike felbontja; az ötszögnél bármelyik csúcsból húzott két átló jó.) Az 1, 2, 5, 14 sorozat ismerős! A **sejtés**: $T_n = C_{n-2}$. Az előadáson elhangzott, hogy ez rekurzióval bizonyítható.

Kiegészítés — a háromszögelések és a Catalan-számok.

Előbb két egyszerű tény. Egy konvex n -szög minden háromszögelésében $n - 2$ **háromszög és $n - 3$ átló** van. A háromszögek szögei együtt pontosan kiadják a sokszög szögeit (minden háromszög csúcsa a sokszög egy csúcsa), így a háromszögek száma $\frac{(n-2)\pi}{\pi} = n - 2$. Ha minden háromszög oldalait összeszámoljuk, $3(n - 2)$ -t kapunk; ebben a sokszög minden oldala egyszer, minden átló kétszer (a két oldalán levő háromszögnél) szerepel, így ha d az átlók száma, $3(n - 2) = n + 2d$, ahonnan $d = n - 3$.

A rekurzió. Számozzuk meg a sokszög csúcsait körbe 1-től m -ig ($m \geq 3$). Az $\{1, m\}$ oldal minden háromszögelésben pontosan egy háromszöghöz tartozik; ennek harmadik csúcsa legyen k , ahol $2 \leq k \leq m - 1$. Ez a háromszög a sokszöget két részre vágja: az 1, 2, ..., k csúcsú k -szögre és a $k, k + 1, \dots, m$ csúcsú $(m - k + 1)$ -szögre, amelyeket egymástól függetlenül kell háromszögelni. Ha $k = 2$ (vagy $k = m - 1$), az egyik rész egyetlen szakasszá fajul; ezt úgy vehetjük figyelembe, hogy megállapodás szerint $T_2 = 1$. Így

$$T_m = \sum_{k=2}^{m-1} T_k T_{m-k+1}.$$

Legyen $t_j = T_{j+2}$ ($j \geq 0$), tehát $t_0 = T_2 = 1$. Az $m = n + 2$ helyettesítéssel és $i = k - 2$ jelöléssel

$$t_n = T_{n+2} = \sum_{i=0}^{n-1} T_{i+2} T_{n-i+1} = \sum_{i=0}^{n-1} t_i t_{n-1-i} = \sum_{k=1}^n t_{k-1} t_{n-k}.$$

Ez éppen a Catalan-rekurzió, tehát a lemma szerint $t_n = C_n$, vagyis $T_n = C_{n-2}$. ■

(B) Szorzatok zárójelezése. Hányféleképpen zárójelezhető egy n tényezős szorzat, ha a tényezők sorrendje rögzített, és minden lépésben két tényezőt szorzunk össze? Négy tényezőre például

$$((a \cdot b) \cdot c) \cdot d, \quad (a \cdot (b \cdot c)) \cdot d, \quad (a \cdot b) \cdot (c \cdot d), \quad a \cdot ((b \cdot c) \cdot d), \quad a \cdot (b \cdot (c \cdot d)),$$

ez $5 = C_3$ lehetőség.

Kiegészítés — bizonyítás. Jelölje b_n egy $n + 1$ tényezős szorzat zárójelezéseinek számát; $b_0 = 1$ (egyetlen tényezőről nincs mit zárójelezni). Egy zárójelezésben az **utolsó** szorzás két részre bontja a szorzatot: az első $i + 1$ és az utolsó $n - i$ tényező szorzatára, ahol $0 \leq i \leq n - 1$. A két részt egymástól függetlenül kell zárójelezni, így

$$b_n = \sum_{i=0}^{n-1} b_i b_{n-1-i} = \sum_{k=1}^n b_{k-1} b_{n-k}.$$

A lemma szerint $b_n = C_n$; egy n tényezős szorzat tehát C_{n-1} -féleképpen zárójelezhető. ■

(C) ± 1 sorozatok. Ahogy a 15. szakaszban láttuk, n darab $+1$ és n darab -1 olyan sorrendjeinek száma, amelyekben minden kezdőszelvény összege nemnegatív, éppen C_n — ez a pénztár-feladat átfogalmazása.

Ezzel a leszámolás fejezet végére értünk.

A II. rész összefoglalása

- **Barkochba:** n elem közül egy kitalálásához $\lceil \log_2 n \rceil$ igen/nem kérdés kell és elég. Felső becslés: kettes számrendszer (a kérdések előre leírhatók). Alsó becslés: az ördög a nagyobbik felet választja, így k válasz után még legalább $n/2^k$ lehetőség marad.
- **Fibonacci-számok:** $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$; $\sum_{i=1}^k F_i = F_{k+2} - 1$; Binet-képlet: $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\Phi^n - \Psi^n)$.
- **Lineáris rekurziók:** az $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ megoldásai kétdimenziós alteret alkotnak. Karakterisztikus egyenlet: $q^2 - c_1 q - c_2 = 0$. Két különböző gyök esetén $a_n = \alpha q_1^n + \beta q_2^n$, kétszeres gyök esetén $a_n = \alpha q^n + \beta n q^n$; α és β a kezdeti feltételekből adódik.
- **Rekurzív gondolkodás:** nevezzük el a mennyiséget, számoljunk kis eseteket, keressünk rekurziót esetszétválasztással (lépcsőmászás: $L_n = F_{n+1}$).
- **Rácsutak:** $(0, 0) \rightarrow (a, b)$: $\binom{a+b}{a}$. **Tükrözési elv:** az első érintés utáni rész tükrözése bijekció.
- **Catalan-számok:** $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$, rekurzió: $C_n = \sum_{k=1}^n C_{k-1} C_{n-k}$. Ezek számolják a pénztár-feladat jó sorrendjeit, a helyes zárójelzéseket, a konvex $(n+2)$ -szög háromszögeléseit és az $n+1$ tényezős szorzat zárójelzéseit.

III. RÉSZ: GRÁFELMÉLET

A gráfelmélet a XX. században fejlődött igazán önálló tudományterületté, és mára a matematika egyik legtöbbet alkalmazott ága: hálózatok, útvonaltervezés, ütemezés, kémiai molekulák szerkezete — mind gráfokkal modellezhető. Ebben a részben az alapfogalmaktól a fák elméletén át a fokszámsorozatok vizsgálatáig jutunk el.

17. Gráfok, egyszerű gráfok, izomorfia

Egy gráf pontokból és az őket összekötő vonalakból áll. Rajzoljunk le néhányat:

1. egy háromszög és egy hozzá csatlakozó négyszög;
2. néhány, egymással nem összekötött darab, köztük magányos pontok;
3. olyan rajz, amelyen egy vonal ugyanabba a pontba tér vissza, és két pontot több vonal is összeköt;
4. egy négyzet a két átlójával;

5. egy háromszög, a belsejében egy ponttal, amely mindhárom csúcshoz hozzá van kötve.

A 4. és az 5. rajz első ránézésre különbözik, valójában azonban **ugyanazt** a szerkezetet ábrázolja: négy pontot, amelyek közül bármelyik kettő össze van kötve. A gráf tehát nem maga a rajz — a rajz csak egy szemléltetése.

Definíció (gráf). Egy $G = (V, E)$ **gráf** két részből áll: a **csúcsok** (vertices) $V = V(G)$ halmazából és az **élek** (edges) $E = E(G)$ halmazából. Minden élhez hozzá van rendelve két (nem feltétlenül különböző) csúcs, az él **végpontjai**; az e él végpontjai u és v esetén $e = (u, v)$ vagy $e = uv$ jelöléssel élünk.

A csúcsokat általában $v_1, v_2, \dots, v_n$, az éleket $e_1, e_2, \dots, e_m$ jelöli. Ebben a könyvben minden gráf **véges**.

Definíció.

- Egy élt **hurokélnek** nevezünk, ha a két végpontja azonos.
- Két vagy több élt **többszörös** (párhuzamos) élnek nevezünk, ha ugyanaz a két végpontjuk.
- Egy gráf **egyszerű**, ha nincs benne sem hurokél, sem többszörös él.

Az előadás fókuszában az egyszerű gráfok állnak. A továbbiakban „gráf” alatt egyszerű gráfot értünk, ha mást nem mondunk. (Hurokéleket és többszörös éleket a 27. szakaszban, a fokszámsorozatoknál engedünk meg újra.) Egy egyszerű gráfban egy élt egyértelműen meghatároz a két végpontja, így az éleket a csúcsok kételemű részalmazainak tekinthetjük. Ebből az is következik, hogy egy n csúcsú egyszerű gráfnak

$$0 \leq |E(G)| \leq \binom{n}{2}$$

éle lehet; a felső korlátot a **teljes gráf** éri el, amelyben bármely két csúcs össze van kötve. Ez sok: egy 1000 csúcsú egyszerű gráfnak akár 499 500 éle is lehet.

Izomorfia

Definíció (izomorfia). A G és H egyszerű gráfok **izomorfak**, ha van olyan $f: V(G) \rightarrow V(H)$ bijekció, amely **éltartó**: bármely $u, v \in V(G)$ esetén

$$uv \in E(G) \iff f(u)f(v) \in E(H).$$

A szó görög eredetű: *izo* = ugyanaz, *morf* = alak. Az izomorfia a gráfelméletben azt a szerepet tölti be, amit a geometriában az egybevágóság: két egybevágó háromszöget „ugyanolyannak” tekintünk, akárhol is helyezkednek el a síkon, és ugyanígy két izomorf gráfot is, akárhogyan rajzoltuk le őket. A fenti 4. és 5. rajz izomorf gráfokat ábrázol.

Példa. Legyen $V = \{a, b, c, d, e\}$, és az élek ab, bc, cd, de, bd . Lerajzolhatjuk egy ötszög-szerű alakzatként, de úgy is, hogy a csúcsokat egy egyenesre tesszük a, b, c, d, e sorrendben, a szomszédosakat összekötjük, és a b -t a d -vel egy ívvel. A két rajz ugyanazt a gráfot ábrázolja.

18. Fokszám és a kézfogási lemma

Definíció (fokszám). Egy v csúcs **fokszáma**, $d(v)$ vagy $\deg(v)$, a v -re illeszkedő élek száma (hurokél esetén a hurokél kettővel számít).

Tétel (kézfogási lemma). Minden G gráfban

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2 |E(G)|.$$

Bizonyítás. A bal oldali összegben minden élt **pontosan kétszer** számoltunk: egyszer az egyik, egyszer a másik végpontjánál (a hurokélét kétszer ugyanannál a végpontnál). ■

A név onnan ered, hogy ha egy társaságban mindenki megszámolja, hány emberrel fogott kezét, akkor ezeknek a számoknak az összege a kézfogások számának kétszerese.

Kiegészítés — Következmény. Minden gráfban a páratlan fokszámú csúcsok száma páros.

Bizonyítás. A kézfogási lemma szerint a fokszámok összege páros. Ha a páros fokszámúakat elhagyjuk az összegből, az összeg paritása nem változik, tehát a páratlan fokszámok összege is páros. Páratlan sok páratlan szám összege viszont páratlan volna. ■

19. Séták, vonalak, utak, körök

Gráfban az élek mentén mozoghatunk. A mozgásnak több változata van aszerint, hogy megengedjük-e az ismétlődést.

Definíció (séta). A G gráfban egy k **hosszú séta** (élsorozat) egy

$$u_0, e_1, u_1, e_2, u_2, \dots, e_k, u_k$$

sorozat, ahol $u_i \in V(G)$, $e_j \in E(G)$, és $e_j = (u_{j-1}, u_j)$ minden j -re. A séta **zárt**, ha a vége ugyanaz, mint az eleje: $u_0 = u_k$.

A sétában bármi ismétlődhet: csúcsok is, élek is. Ezen szigoríthatunk.

Definíció.

- Ha egy sétában minden él különböző (a csúcsok azonban ismétlődhetnek), **vonalnak** nevezzük. A vonal lehet nyitott vagy zárt.
- Ha egy sétában minden csúcs különböző, **útnak** nevezzük. Ekkor az élek is automatikusan különbözők.
- Ha egy zárt sétában a csúcsok — eltekintve az $u_0 = u_k$ egyezéstől — mind különbözők, és $k \geq 1$, **körnek** nevezzük. A kör tehát egy „zárt út”.

Egyszerű gráfban a kör hossza legalább 3. (Általános gráfban egy hurokél 1 hosszú, két párhuzamos él 2 hosszú kört alkot.)

Kiegészítés — Lemma (sétából út). *Ha a G gráfban vezet séta az u csúcsból a v csúcsba, akkor vezet út is.*

Bizonyítás. Tekintsük a u -ból v -be vezető séták közül a **legrövidebbet**: $u = u_0, e_1, u_1, \dots, e_k, u_k = v$. Ha volna benne ismétlődő csúcs, $u_i = u_j$ valamilyen $i < j$ -re, akkor az u_i és u_j közötti szakaszt kihagyva ($u_0, \dots, u_i = u_j, e_{j+1}, \dots, u_k$) rövidebb sétát kapnánk u -ból v -be — ellentmondás. Tehát a legrövidebb séta út. ■

Emiatt az alábbiakban a „van séta u és v között” és a „van út u és v között” kijelentések felcserélhetők.

20. Összefüggőség és komponensek

Definíció (összefüggő gráf). A G gráf **összefüggő**, ha bármelyik csúcsából bármelyik csúcsába el lehet jutni, vagyis bármely két csúcsa között vezet út (ekvivalensen: séta).

Ha egy gráf nem összefüggő, akkor természetes módon „darabokra” esik. Ezeket a darabokat két, egymással egyenértékű módon is megfoghatjuk.

Definíció (komponens). A G gráf egy **összefüggő komponense** (röviden komponense) G -nek egy olyan összefüggő részgráfja, amelyhez bármely további csúcsot hozzávéve már nem kapnánk összefüggő részgráfot. A komponensek tehát G „maximális összefüggő darabjai”.

(A részgráf fogalmát a 23. szakaszban pontosítjuk; itt elég annyi, hogy a komponens egy csúcshalmaz, az összes köztük futó éllel együtt.)

A komponensek egy **relációval** is leírhatók. Ha $u, v \in V(G)$, akkor írjuk, hogy $u \sim v$ (u relációban áll v -vel), ha van köztük séta.

Állítás. A $\sim$ reláció **ekvivalenciareláció** $V(G)$ -n.

Bizonyítás.

- **Reflexív:** $v \sim v$ minden v -re, hiszen a 0 hosszú v séta v -ből v -be vezet.
- **Szimmetrikus:** ha $u \sim v$, akkor $v \sim u$, mert egy u -ból v -be vezető sétát visszafelé bejárva v -ből u -ba vezető sétát kapunk.
- **Tranzitív:** ha $u \sim v$ és $v \sim w$, akkor $u \sim w$: az u -ból v -be és a v -ből w -be vezető sétát egymás után fűzve u -ból w -be vezető sétát kapunk. ■

(A tranzitivitás bizonyításában látszik, miért kényelmesebb itt sétákkal dolgozni, mint utakkal: két út egymás után fűzve nem feltétlenül út, de két séta egymás után fűzve mindig séta.)

Egy ekvivalenciareláció az alaphalmazt **ekvivalenciaosztályokra** bontja. A $\sim$ reláció osztályai éppen a G összefüggő komponensei.

Kiegészítés — miért éppen a komponensek az osztályok? Legyen K egy ekvivalenciaosztály, és tekintsük a K -beli csúcsokat a köztük futó összes éllel.

K összefüggő. Ha $u, v \in K$, akkor van köztük G -ben séta. Ennek a sétának minden csúcsa u -val relációban áll (a séta kezdőszelete odavezet), tehát K -ban van; így a séta minden éle is K -beli csúcsokat köt össze. A séta tehát a K által meghatározott részgráfban halad.

K maximális. Ha egy $w \notin K$ csúcsot hozzávennénk, és az így kapott részgráf összefüggő volna, akkor w és egy K -beli csúcs között séta vezetne, vagyis w is K -ban volna. Ellentmondás.

Megfordítva, egy összefüggő részgráf csúcsai mind relációban állnak egymással, tehát egyetlen osztályba esnek, és a maximalitás miatt az egész osztályt kitöltik. ■

21. Fák és levelek

Definíció (fa). Fának nevezzük az összefüggő, körmentes gráfokat.

A fák a „legtakarékosabb” összefüggő gráfok: épp elég élük van ahhoz, hogy összefüggők legyenek. Nézzük meg a kis csúcsszámú fákat (izomorfia erejéig)!

n	az n csúcsú fák	darab
1	egyetlen pont	1
2	egyetlen él	1
3	3 csúcsú út	1
4	4 csúcsú út; „csillag” (egy csúcs, hozzá 3 levél)	2
5	5 csúcsú út; „villa” (egy 3 fokú csúcs két levéllel és egy 2 hosszú ággal); csillag (egy csúcs 4 levéllel)	3

Definíció (levél). Egy fa **levele** egy 1 fokú csúcsa.

Állítás. Minden legalább 2 csúcsú fának van levele.

Első bizonyítás (sétálással). Induljunk el egy tetszőleges csúcsból, és sétáljunk a fában úgy, hogy soha nem fordulunk vissza azon az élen, amelyen érkeztünk. Mivel a fa körmentes, egy csúcsba sem érhetünk vissza (különben kört járnánk be), és mivel a fa véges, valahol el kell akadnunk. Ott, ahol elakadtunk, a csúcsnak az érkezési élen kívül nincs más éle: ez 1 fokú csúcs.

Második bizonyítás (leghosszabb út). Tekintsük a fa egyik leghosszabb útját, $u_0, u_1, \dots, u_k$; mivel a fa összefüggő és legalább 2 csúcsú, van éle, így $k \geq 1$. Állítjuk, hogy u_0 levél. Ha u_0 -nak u_1 -en kívül volna egy w szomszédja, akkor két eset lehetséges. Ha w nincs az úton, akkor a $w, u_0, u_1, \dots, u_k$ út hosszabb volna — ellentmondás. Ha $w = u_i$ valamilyen $i \geq 2$ -re, akkor az $u_0, u_1, \dots, u_i, u_0$ kör volna — ellentmondás a körmentességgel. ■

A második bizonyítás többet is ad: a leghosszabb út **mindkét** végpontja levél, és ezek különbözők ($k \geq 1$). Ugyanezt az első bizonyításból is kiolvashatjuk: ha az első elakadási pontból újra elindulunk, egy másik helyen kell újra elakadnunk.

Állítás. Minden legalább 2 csúcsú fának van legalább 2 levele.

22. A fák élszáma

Kérdés. Hány éle van egy n csúcsú fának?

A táblázatból sejthető a válasz: az n csúcsú fák mindegyikének $n - 1$ éle van.

Tétel. Minden n csúcsú fának pontosan $n - 1$ éle van.

Bizonyítás (teljes indukció n szerint). $n = 1$ -re a fának 0 éle van. Tegyük fel, hogy az állítás igaz az n csúcsú fákra, és legyen T egy $n + 1$ csúcsú fa. Az előző szakasz szerint T -nek van levele; **tépjük le** egy levelét, vagyis töröljük a levelet és a hozzá tartozó egyetlen élt. A kapott T' gráf n csúcsú, és fa:

- körmentes, mert T részgráfja, és T -ben nincs kör;
- összefüggő, mert bármely két T' -beli csúcs között T -ben vezető út nem haladhat át a letépett levélen (egy út belső csúcsának legalább 2 foka van az úton), tehát az út T' -ben is megvan.

Az indukciós feltevés szerint T' -nek $n - 1$ éle van, így az eredeti T -nek n . ■

A tétel szerint egy 1000 csúcsú fának 999 éle van — szemben egy 1000 csúcsú egyszerű gráffal, amelynek akár félmillió éle is lehet.

23. Részgráfok és feszítőfák

Definíció (részgráf). A G gráf **részgráfja** az a gráf, amelyet G -ből néhány csúcs és néhány él törlésével kapunk. (Egy csúcs törlésekor a rá illeszkedő éleket is törölni kell. Semmit sem törölni is szabad, tehát G önmagának is részgráfja.)

Két fontos speciális eset van:

- Ha **csak csúcsokat** törölünk (és velük együtt a belőlük kiinduló éleket), **feszített részgráfot** kapunk: a megmaradt csúcsok között az összes eredeti él megmarad.
- Ha **csak éleket** törölünk, **feszítő részgráfot** kapunk: minden csúcs megmarad.

Definíció (feszítőfa). A G gráf **feszítőfája** egy olyan feszítő részgráfja, amely fa.

Egy feszítőfa tehát G összes csúcsát összeköti, a lehető legkevesebb éllel. Nyilván csak összefüggő gráfnak lehet feszítőfája. Megfordítva:

Tétel. Minden összefüggő gráfnak van feszítőfája.

A bizonyításhoz egy egyszerű megfigyelésre van szükség.

Állítás. Ha G összefüggő gráf, és G egy tetszőleges körének tetszőleges élet töröljük, akkor a kapott gráf is összefüggő.

Bizonyítás. Legyen a törölt él $e = xy$, amely a C kör része. Bármely két csúcs között G -ben vezetett séta. Ha ez a séta nem használta az e élt, akkor a törlés után is megvan. Ha használta, akkor az e él helyett kerülhetünk a kör másik ívére: a C körön az x -ből y -ba az e él nélkül is el lehet jutni. Így bármely két csúcs között a törlés után is vezet séta. ■

A tétel bizonyítása (algorithmus). Legyen G összefüggő. Ismételjük a következő lépést:

1. **Van kör?** Ha nincs, a gráf összefüggő és körmentes — vagyis fa —, és **kész** vagyunk.
2. Ha van, egy tetszőleges kör tetszőleges élet töröljük. Az állítás szerint a gráf összefüggő marad. Térjünk vissza az 1. lépéshez.

Mivel minden lépésben egy élt törölünk, és véges sok él van, az eljárás véget ér. A végén kapott gráf összefüggő, körmentes, és G minden csúcsát tartalmazza (csak éleket töröltünk) — tehát G egy feszítőfája. ■

24. A fák ekvivalens jellemzései

A fát úgy definiáltuk, mint összefüggő, körmentes gráfot. Sok más, ezzel egyenértékű definíció is adható; ezek a fák alaptulajdonságai.

Tétel (a fák jellemzése). Egy n csúcsú G (egyszerű) gráfra a következő állítások ekvivalensek:

1. G fa (összefüggő és körmentes);
2. G **minimális összefüggő**: összefüggő, de bármely élet törölve már nem az;
3. G **maximális körmentes**: körmentes, de bármely új élt hozzávéve (két nem szomszédos csúcsát összekötve) kör keletkezik;
4. G összefüggő, és $n - 1$ éle van;
5. G körmentes, és $n - 1$ éle van;
6. G bármely két csúcsa között **pontosan egy** út vezet.

Hány bizonyítás kell? Hat állítás ekvivalenciájához elvben minden rendezett párra egy-egy implikáció kellene, ez $6 \cdot 5 = 30$ bizonyítás. Ennyi azonban fölösleges: ha az implikációkat egy olyan irányított gráf éleinek tekintjük, amelyben bármely állításból bármelyikbe el lehet jutni, az elég. Egy **csillag** (az 1. állításból mindegyikbe és mindegyikből az 1.-be) 10, egy **kör** ($1 \Rightarrow 2 \Rightarrow \dots \Rightarrow 6 \Rightarrow 1$) mindössze 6 bizonyítást igényel.

Az előadáson néhány példát néztünk meg; a többi házi feladat volt.

- $1 \Rightarrow 4$ és $1 \Rightarrow 5$: ez a 22. szakasz tétele (egy fának $n - 1$ éle van).
- $1 \Rightarrow 2$: legyen G fa, és töröljük egy $e = uv$ élet. Tegyük fel *indirekten*, hogy a gráf összefüggő maradt. Akkor vezetne egy út u és v között e nélkül, és ez az út az e éllel együtt az eredeti gráfban kört alkotna — ellentmondás. Tehát $G - e$ nem összefüggő.

Kiegészítés — a tétel teljes bizonyítása. A „csillag” stratégiát követjük: az előadáson látott $1 \Rightarrow 2$, $1 \Rightarrow 4$, $1 \Rightarrow 5$ mellé bebizonyítjuk az $1 \Rightarrow 3$, $1 \Rightarrow 6$ implikációt és a 2, 3, 4, 5, $6 \Rightarrow 1$ megfordításokat.

Segédállítás. Ha egy gráfban két csúcs között két különböző út vezet, akkor a gráfban

van kör.

Bizonyítás. Legyen $P = (u = p_0, p_1, \dots, p_k = v)$ és $Q = (u = q_0, q_1, \dots, q_l = v)$ két különböző út. Egyik sem lehet a másik valódi kezdőszelete, mert akkor a hosszabbik út kétszer haladna át v -n. Van tehát olyan i index, hogy $p_i = q_i$, de $p_{i+1} \neq q_{i+1}$. Legyen $j > i$ a legkisebb olyan index, amelyre p_j rajta van Q -nak a q_i utáni részén — ilyen van, mert $p_k = v = q_l$ —, mondjuk $p_j = q_m$, $m > i$. Ekkor

$$p_i, p_{i+1}, \dots, p_j = q_m, q_{m-1}, \dots, q_{i+1}, q_i = p_i$$

kör: a $p_{i+1}, \dots, p_{j-1}$ csúcsok j minimalitása miatt nincsenek rajta Q szóban forgó részén (a Q elején, a $q_0, \dots, q_i = p_0, \dots, p_i$ csúcsok között pedig azért nincsenek, mert P csúcsai különbözők), tehát a csúcsok — a kezdő- és végpont kivételével — különbözők. A hossza $(j - i) + (m - i) \geq 3$, mert $j - i = m - i = 1$ esetén $p_{i+1} = q_{i+1}$ volna. ■

$1 \Rightarrow 3$. Legyen G fa, és u, v két nem szomszédos csúcsa. Mivel G összefüggő, van köztük út; ehhez az új uv élt hozzávéve kör keletkezik.

$3 \Rightarrow 1$. Legyen G maximális körmentes; azt kell belátni, hogy összefüggő. Ha nem volna, legyen u és v két különböző komponensbeli csúcs; ezek nem szomszédosak. A feltétel szerint az uv élt hozzávételével kör keletkezik, és ennek a körnek tartalmaznia kell az uv élt (hiszen G körmentes). A kör többi része viszont egy u és v közötti út G -ben — ellentmondás azzal, hogy különböző komponensben vannak.

$2 \Rightarrow 1$. Legyen G minimális összefüggő; azt kell belátni, hogy körmentes. Ha volna benne kör, annak bármely élét törölve a gráf a 23. szakasz állítása szerint összefüggő maradna — ellentmondás a minimalitással.

$1 \Rightarrow 6$. Ha G fa, bármely két csúcsa között van út (összefüggő), és a segédállítás szerint nem lehet két különböző (körmentes).

$6 \Rightarrow 1$. Ha bármely két csúcs között van út, G összefüggő. Ha volna benne egy $v_0, v_1, \dots, v_k = v_0$ kör, akkor a v_0 és v_1 csúcs között két különböző út vezetne: a $v_0 v_1$ él és a kör többi része ($v_0, v_{k-1}, \dots, v_1$). Tehát G körmentes.

$4 \Rightarrow 1$. Legyen G összefüggő és $n - 1$ élű. A 23. szakasz tétele szerint van feszítőfája, T ; ennek is n csúcsa van, tehát a 22. szakasz szerint $n - 1$ éle. Mivel T éle G -nek is éle, és mindkettőnek $n - 1$ éle van, $T = G$, tehát G fa.

$5 \Rightarrow 1$. Legyen G körmentes és $n - 1$ élű; azt kell belátni, hogy összefüggő. Legyenek

a komponensei $K_1, \dots, K_c$, rendre $n_1, \dots, n_c$ csúccsal. Minden komponens összefüggő és körmentes, tehát fa, így K_i -nek $n_i - 1$ éle van. Összesen

$$|E(G)| = \sum_{i=1}^c (n_i - 1) = n - c.$$

Mivel $|E(G)| = n - 1$, ebből $c = 1$, vagyis G összefüggő. ■

25. Minimális összsúlyú feszítőfa

Feladat. Adott egy összefüggő G gráf, és minden $e \in E(G)$ élén egy $w(e) \geq 0$ súly (például az adott útszakasz megépítésének költsége). Keressünk **minimális összsúlyú feszítőfát**, vagyis olyan T feszítőfát, amelyre a $w(T) = \sum_{e \in E(T)} w(e)$ összsúly a lehető legkisebb!

Gyakorlati példa: néhány várost úgy szeretnénk úthálózattal összekötni, hogy bármelyikből bármelyikbe el lehessen jutni, és az építés a lehető legolcsóbb legyen. A felesleges utak (amelyek kört zárnak be) kidobhatók, tehát az optimális hálózat egy feszítőfa.

Mivel véges sok feszítőfa van, minimális összsúlyú biztosan létezik; a kérdés az, hogyan találjuk meg anélkül, hogy az összeset végignéznénk. Két természetes, **mohó** módszer kínálkozik: egy „optimista” és egy „pesszimista”. (Az optimista módszer **Kruskal-algoritmus** néven ismert.)

Az optimista algoritmus (Kruskal)

Lépés: építsük meg a(z egyik) **legolcsóbb** olyan élt, amely a már megépítettekkel **nem zár be kört**. Ismételjük, amíg lehet.

(Figyelem: nem egyszerűen a legolcsóbb élt építjük meg, hanem a legolcsóbbat a kört nem záró élek közül — a legolcsóbb él ugyanis bezárhat egy kört.)

Mikor áll le? Amikor nem tud tovább lépni, mert G minden további éle kört zárna be. Ekkor a megépített F élhalmaz:

- körmentes (ezt minden lépésben megőriztük);
- feszítő (minden csúcsot tartalmaz — az élek nélküli csúcsokat is a gráf részének tekintjük);

- összefüggő. Ha ugyanis nem volna az, akkor — mivel G összefüggő — volna G -nek olyan éle, amely F két különböző komponensét köti össze; ez az él nem zárna be kört, tehát az algoritmus még nem állt volna le.

F tehát feszítőfa, és a 22. szakasz szerint az algoritmus pontosan $n - 1$ lépés után áll le. (Így az is mondható: amikor $n - 1$ élünk van, megállunk, mert az 5. jellemzés szerint egy $n - 1$ élű körmentes gráf már fa.)

Tétel. Az optimista algoritmus minimális összsúlyú feszítőfát ad.

A pesszimista algoritmus

Lépés: töröljük G -ből a(z egyik) **legdrágább** olyan élt, amelynek törlése után a maradék gráf **összefüggő marad**. Ismételjük, amíg lehet.

Mikor áll le? Amikor egyik élt sem lehet úgy törölni, hogy a gráf összefüggő maradjon — ekkor a gráf minimális összefüggő, ami a 2. jellemzés szerint fa. Mivel csak éleket töröltünk, feszítőfa; és $n - 1$ éle maradt.

Tétel. A pesszimista algoritmus is minimális összsúlyú feszítőfát ad.

A két algoritmus eredménye **nem feltétlenül egyezik meg**: ha egyenlő súlyú élek is vannak, több minimális összsúlyú feszítőfa is lehet, és a két algoritmus különbözőket találhat. (Például egy háromszögben, amelynek mindhárom éle egységnyi súlyú, mindhárom kétélű feszítőfa minimális.) Az összsúlyuk persze egyenlő.

Példa. Legyenek a csúcsok a, b, c, d , az élek és súlyaik: ab : 1, bc : 2, ac : 3, cd : 4, bd : 5. Az optimista algoritmus megépíti az ab -t, majd a bc -t; az ac kört zárna, ezért kimarad; végül megépíti a cd -t. Az eredmény $\{ab, bc, cd\}$, összsúlya 7. A pesszimista algoritmus törli a bd -t (a d a c -n át továbbra is elérhető), a cd -t nem törölheti (a d elszakadna), az ac -t viszont igen (az a - b - c út megmarad); ezután már semmit sem törölhet. Az eredmény ugyanaz a fa.

Kiegészítés — az optimista algoritmus helyességének bizonyítása. Legyenek az algoritmus által megépített élek a kiválasztás sorrendjében $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$, és $T = \{e_1, \dots, e_{n-1}\}$. Tegyük fel, hogy T nem minimális összsúlyú. A minimális összsúlyú feszítőfák közül válasszunk egy olyan T^* -ot, amely az $e_1, e_2, \dots$ sorozatnak a lehető leghosszabb kezdőszelét tartalmazza: $e_1, \dots, e_{k-1} \in T^*$, de $e_k \notin T^*$. (Ha T^* mind az $n - 1$ élt tartalmazná, akkor $T^* = T$ volna, hiszen mindkettő $n - 1$ élű.)

Vegyük hozzá e_k -t a T^* fához. A 3. jellemzés (a $1 \Rightarrow 3$ irány) szerint így egy C kör keletkezik, amely tartalmazza e_k -t. A C körnek van olyan f éle, amely nincs T -ben (különben T -ben kör volna); $f \neq e_k$, tehát $f \in T^*$.

Állítás: $w(e_k) \leq w(f)$. Amikor az algoritmus a k -adik lépésben e_k -t választotta, az $e_1, \dots, e_{k-1}$ élek voltak megépítve. Ezekkel f nem zárt volna be kört, hiszen $\{e_1, \dots, e_{k-1}, f\} \subseteq T^*$, és T^* körmentes. Tehát f is választható lett volna, az algoritmus azonban a legolcsóbb választható élt vette, így $w(e_k) \leq w(f)$.

Legyen $T' = T^* + e_k - f$. Ez összefüggő (az f él a C kör éle volt, így a 23. szakasz állítása szerint törlése után összefüggő marad), és $n - 1$ éle van, tehát a 4. jellemzés szerint feszítőfa. Összsúlya $w(T') = w(T^*) + w(e_k) - w(f) \leq w(T^*)$, így T' is minimális összcsúlyú. Viszont T' tartalmazza $e_1, \dots, e_k$ -t, ami ellentmond T^* választásának. ■

Kiegészítés — a pesszimista algoritmus helyességének bizonyítása. Megmutatjuk, hogy az algoritmus futása során végig igaz a következő: *a pillanatnyi H gráf tartalmaz egy minimális összcsúlyú feszítőfát (G -ét).* Kezdetben ($H = G$) ez nyilvánvaló. Tegyük fel, hogy H tartalmazza a T^* minimális feszítőfát, és az algoritmus a H -ból az $e = uv$ élt törli. Ha $e \notin T^*$, akkor $H - e$ is tartalmazza T^* -ot. Ha $e \in T^*$:

- A $T^* - e$ gráf két komponensre esik (a 2. jellemzés szerint); legyen X az u -t, Y a v -t tartalmazó komponens csúcshalmaza.
- Mivel $H - e$ összefüggő (az algoritmus csak ilyen élt töröl), van benne u -ból v -be vezető út. Ez X -ből indul és Y -ban ér véget, tehát valahol átlép X -ből Y -ba: van egy $f \neq e$ éle, amelynek egyik vége X -ben, másik Y -ban van. Ez az út az e éllel együtt kört alkot H -ban, amelynek f is éle; így $H - f$ is összefüggő, vagyis f is törölhető lett volna. Az algoritmus a legdrágább törölhető élt választotta, ezért $w(f) \leq w(e)$.
- A $T' = T^* - e + f$ gráf összefüggő (az f él összeköti X -et és Y -t), $n - 1$ élű, tehát feszítőfa, és $w(T') \leq w(T^*)$, így minimális. Végül $T' \subseteq H - e$, hiszen $f \in H$ és $f \neq e$.

Az invariáns tehát megmarad. Az algoritmus végén H maga is feszítőfa, és tartalmaz egy minimális összcsúlyú T^* feszítőfát; mivel mindkettőnek $n - 1$ éle van, $H = T^*$. ■

26. Címkézett fák: a Cayley-tétel és a Prüfer-kód

Eddig a fákat izomorfia erejéig számoltuk: a 21. szakasz táblázata szerint például 3 különböző 5 csúcsú fa van. Most **címkézett** fákat számolunk.

Definíció. Egy n csúcsú **címkézett** (számozott) fa olyan fa, amelynek csúcshalmaza $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$. Két címkézett fát akkor tekintünk azonosnak, ha pontosan ugyanazok az éleik.

Számoljuk meg kis n -ekre!

- $n = 1, 2$: egyetlen címkézett fa van.
- $n = 3$: a fa egy 3 csúcsú út, és csak az számít, hogy melyik csúcs van középen: 3 fa. (Az 1–2–3 és a 3–2–1 út ugyanaz a fa.)
- $n = 4$: az út $\frac{4!}{2} = 12$ -féleképpen címkézhető (a $4!$ sorrendben minden utat kétszer, mindkét irányból számoltunk — tehénszabály); a csillag 4-féleképpen (csak a középső csúcs címkéje számít). Összesen 16.
- $n = 5$: út: $\frac{5!}{2} = 60$; villa: a 3 fokú csúcs 5-féle, a hozzá kapcsolódó két levél $\binom{4}{2} = 6$ -féle, a maradék két csúcs sorrendje a hosszabb ágon 2-féle, ez $5 \cdot 6 \cdot 2 = 60$; csillag: 5. Összesen 125.

A sorozat: 1, 1, 3, 16, 125 — vagyis $1^{-1}, 2^0, 3^1, 4^2, 5^3$.

Tétel (Cayley-tétel). Az n csúcsú címkézett fák száma n^{n-2} .

A bizonyítás ötlete a bijekció-elv: minden címkézett fához kölcsönösen egyértelműen hozzárendelünk egy sorozatot, a **Prüfer-kódját**, amely $n - 2$ hosszú, és minden tagja az $1, \dots, n$ számok valamelyike. Ilyen sorozatból az ismétléses variáció képlete szerint n^{n-2} van.

A Prüfer-kód

Kódolás. Legyen T egy $n \geq 2$ csúcsú címkézett fa. Ismételjük $n - 2$ -szer a következő lépést:

Keressük meg a fa **legkisebb sorszámú levelét**, **jegyezzük fel a szomszédját**, majd **tépjük le** a levelet (töröljük az élével együtt).

Minden lépés után ismét fát kapunk (a 22. szakasz bizonyítása szerint), amelynek eggyel kevesebb csúcsa van; és mivel legalább 2 csúcsú fának van levele, a lépés mindig végrehajtható. A feljegyzett $n - 2$ szám sorozata a fa **Prüfer-kódja**.

Példa. Legyen $n = 9$, és a fa élei:

$$\{1, 2\}, \quad \{1, 6\}, \quad \{1, 4\}, \quad \{1, 9\}, \quad \{3, 5\}, \quad \{3, 8\}, \quad \{3, 4\}, \quad \{4, 7\}.$$

A levelek kezdetben: 2, 5, 6, 7, 8, 9. Írjuk egy táblázat felső sorába, **mit** tépünk le, az alsóba, **hova** volt kötve:

levél (mit)	2	5	6	7	8	3	4	1
szomszéd (hova)	1	3	1	4	3	4	1	9

Lépésről lépésre: a legkisebb levél 2 (szomszédja 1); utána 5 (3); 6 (1); 7 (4); 8 (3) — ekkor a 3-asnak már csak a 4 a szomszédja, tehát levéllé vált, és a legkisebb levél a 3 (4); ezután a 4 válik levéllé (1). Az $n - 2 = 7$ lépés után a 1 és a 9 csúcs marad, a köztük futó éllel. A Prüfer-kód:

$$(1, 3, 1, 4, 3, 4, 1).$$

Megfigyelések:

- Ha az utolsó, 1–9 élt is felírjuk (dőlt betűvel a táblázat végén), a táblázat $n - 1$ oszlopa **éppen a fa éleit** adja.
- Az utolsó oszlop alsó eleme mindig n : a legnagyobb sorszámú csúcsot sosem tépjük le, hiszen amíg legalább 3 csúcs van, a fának legalább 2 levele van, és ezek közül a legkisebb nem a legnagyobb csúcs. Ezért az utolsó oszlopot nem kell feljegyezni.
- A kódban az 1 háromszor, a 3 és a 4 kétszer szerepel, a levelek (2, 5, 6, 7, 8, 9) egyszer sem. A fában $\deg(1) = 4$, $\deg(3) = \deg(4) = 3$, a leveleké 1.

Az utolsó megfigyelés általános érvényű:

Állítás. Ha a T címkézett fában az i csúcs fokszáma $\deg(i)$, akkor az i szám a T Prüfer-kódjában pontosan $\deg(i) - 1$ -szer szerepel.

Bizonyítás. Az i szám pontosan akkor kerül be a kódba, amikor egy **szomszédját** tépjük le. Kövessük az i csúcs $\deg(i)$ darab élet az eljárás során. Amíg i -nek legalább két éle van, i nem levél, így ha egy élet letépjük, akkor a másik végpontja a letépett levél, és i bekerül a kódba. Az i **utolsó** éle viszont nem ilyen: vagy i maga válik levéllé, és **őt** tépjük le (ekkor a szomszédja kerül a kódba, nem i), vagy ez az él az eljárás végén megmaradó él, amely nem kerül a kódba. Így i pontosan $\deg(i) - 1$ -szer szerepel. ■

Speciálisan: **a levelek pontosan azok a csúcsok, amelyek nem szerepelnek a kódban.**

Dekódolás. A kódból a fa visszaállítható. A legkisebb levél az első lépésben éppen a legkisebb olyan szám, amely **nem szerepel a kódban**; a szomszédja a kód első eleme. Ezután a kód első elemét elhagyjuk, a letépett levelet „elhasználtként” jelöljük, és ugyanígy folytatjuk: mindig a legkisebb olyan, még el nem használt szám a következő levél, amely a **hátralevő** kódban nem szerepel. Végül a két megmaradt, el nem használt csúcsot összekötjük.

A példában a $(1, 3, 1, 4, 3, 4, 1)$ kódból: a kódban nem szereplő legkisebb szám 2, tehát 2–1 él; a hátralevő kód $(3, 1, 4, 3, 4, 1)$, ebben nem szerepel, és még nem használt: 5, 6, 7, 8, 9, a legkisebb 5, tehát 5–3; majd 6–1, 7–4, 8–3; a hátralevő kód ekkor $(4, 1)$, amely-

ben a 3 már nem szerepel, tehát 3–4; végül 4–1, és a megmaradt 1, 9 csúcsot összekötjük. Visszakaptuk az eredeti fát.

Az előadáson a kódolás és a dekódolás alapján rögzítettük: **a számozott n csúcsú fák és az $n - 2$ hosszú Prüfer-kódok kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők egymásnak**; ebből a Cayley-tétel azonnal következik. Azt azonban nem bizonyítottuk, hogy a dekódolás **minden** sorozatból fát (összefüggő, körmentes gráfot) állít elő, és hogy a két eljárás valóban egymás inverze.

Kiegészítés — a Prüfer-megfeleltetés bijektivitása. Kényelmesebb általánosabban fogalmazni. Ha V egy legalább 2 elemű, pozitív egészekből álló véges halmaz, a V csúcshalmazú fák Prüfer-kódját ugyanúgy definiáljuk (legkisebb levél letépése, szomszéd feljegyzése, $|V| - 2$ -szer). A fenti állítás és bizonyítása szó szerint érvényes.

Tétel. Ha $|V| = m \geq 2$, akkor minden $(a_1, \dots, a_{m-2}) \in V^{m-2}$ sorozat pontosan egy V csúcshalmazú fának a Prüfer-kódja.

Bizonyítás (teljes indukció m szerint). $m = 2$ -re egyetlen fa van (egy él), és egyetlen 0 hosszú sorozat (az üres). Legyen $m \geq 3$, és tegyük fel, hogy az állítás $m - 1$ elemű csúcshalmazokra igaz.

Egyértelműség. Legyen T egy fa, amelynek kódja $(a_1, \dots, a_{m-2})$. Az állítás szerint T levelei pontosan a kódban nem szereplő elemek, így az első lépésben letépett levél $\ell = \min(V \setminus \{a_1, \dots, a_{m-2}\})$, és a szomszédja a_1 . A letépés után kapott $T - \ell$ fa csúcshalmaza $V \setminus \{\ell\}$, és a kódolás innen pontosan úgy folytatódik, mintha $T - \ell$ -et kódolnánk, tehát $T - \ell$ kódja $(a_2, \dots, a_{m-2})$. Az indukciós feltevés szerint $T - \ell$ -et ez a kód egyértelműen meghatározza, T pedig $T - \ell$ -ből az ℓ - a_1 él hozzávételével adódik. Tehát T egyértelmű.

Létezés. Legyen $(a_1, \dots, a_{m-2}) \in V^{m-2}$ tetszőleges, és $\ell = \min(V \setminus \{a_1, \dots, a_{m-2}\})$; ez létezik, mert a kód $m - 2 < m$ elemet sorol fel. Mivel ℓ nem szerepel a kódban, $(a_2, \dots, a_{m-2}) \in (V \setminus \{\ell\})^{m-3}$, így az indukciós feltevés szerint van olyan T' fa a $V \setminus \{\ell\}$ csúcshalmazon, amelynek ez a kódja. Legyen T az a gráf, amelyet T' -ből egy új ℓ - a_1 él hozzávételével kapunk ($a_1 \neq \ell$, tehát $a_1 \in V(T')$). T fa: összefüggő, és körmentes, mert az ℓ csúcs foka 1, így nem lehet kör része.

Megmutatjuk, hogy T kódja $(a_1, \dots, a_{m-2})$. Az állítás szerint T' levelei a $(a_2, \dots, a_{m-2})$ -ben nem szereplő csúcsok. A T fa egy ℓ -től különböző x levele T' -nek is levele, és $x \neq a_1$ (az a_1 foka T -ben eggyel nagyobb, mint T' -ben, tehát ha T -ben 1 volna, T' -ben 0 — ami egy legalább 2 csúcsú fában lehetetlen). Így x egyáltalán nem szerepel az $(a_1, \dots, a_{m-2})$ kódban, és $x \neq \ell$, tehát ℓ definíciója szerint $x > \ell$. Vagyis ℓ a T legkisebb levele: az első lépésben őt tépjük le, feljegyezzük a szomszédját, a_1 -et, és a T'

fa marad, amelynek kódja $(a_2, \dots, a_{m-2})$. ■

A tétel szerint a kódolás bijekció a V csúcsalmazú fák és a V^{m-2} halmaz között. $V = [n]$ esetén ez a Cayley-tétel: az n csúcsú címkézett fák száma $|[n]^{n-2}| = n^{n-2}$.

27. Fokszámsorozatok realizálása

Kérdés. Adottak a $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ nemnegatív egészek. Létezik-e olyan gráf, amelynek csúcsai $v_1, \dots, v_n$, és $\deg(v_k) = d_k$ minden k -ra? (Ha igen, azt mondjuk, hogy a gráf **realizálja** a fokszámsorozatot.)

A válasz attól függ, milyen gráfokat engedünk meg. Három esetet vizsgálunk, egyre szigorúbb feltételekkel.

I. típus: hurokélek és többszörös él is megengedettek

Állítás. Pontosán akkor létezik a $d_1, \dots, d_n$ fokszámsorozatú (hurokéleket és többszörös éleket is megengedő) gráf, ha $\sum_{k=1}^n d_k$ páros.

Bizonyítás. Ha létezik ilyen gráf, a kézfogási lemma szerint a fokszámok összege $2|E|$, tehát páros. Például a 3, 4, 4 sorozatot semmilyen gráf sem realizálja.

Megfordítva, tegyük fel, hogy az összeg páros. Építsük meg a gráfot három lépésben:

1. **Hurokélekkel elégítjük ki a fokszámigényeket, amennyire lehet:** a v_k csúcsra $\lfloor d_k/2 \rfloor$ hurokét teszünk. Mivel egy hurokél 2-vel növeli a fokszámot, ezután minden csúcs fokszáma d_k , ha d_k páros, és $d_k - 1$, ha d_k páratlan.
2. **Ami kimaradt:** a páratlan d_k -jú csúcsoknak még 1-1 él hiányzik. Mivel a d_k -k összege páros, páros sok páratlan d_k van.
3. **Ezeket a csúcsokat kettesével összekötjük egy-egy éllel.**

Az így kapott gráf fokszámsorozata éppen $d_1, \dots, d_n$. ■

II. típus: hurokél nem, többszörös él megengedett

Ha hurokél nem lehet, a feltétel szigorúbb: a legnagyobb fokú csúcs minden éle egy **másik** csúcsban végződik.

Állítás. Pontosán akkor létezik a $d_1 \leq \dots \leq d_n$ fokszámsorozatú, hurokélmentes (de többszörös éleket megengedő) gráf, ha $\sum_k d_k$ páros, és

$$d_n \leq d_1 + d_2 + \dots + d_{n-1}.$$

Bizonyítás. Szükségesség. A paritás a kézfogási lemmából következik. A v_n csúcs d_n élének mindegyike egy másik csúcsban végződik, és ott 1-gyel növeli a fokszámot, így $d_n \leq d_1 + \dots + d_{n-1}$.

Elégesség. Két esetet különböztetünk meg.

(A) *Egyenlőség:* $d_n = d_1 + \dots + d_{n-1}$. Kössük össze v_n -et minden v_k -val ($k < n$) d_k darab párhuzamos éllel. Mindenki pontosan annyi élt kap, amennyit „kér”, és v_n foka $d_1 + \dots + d_{n-1} = d_n$.

(B) *Szigorú egyenlőtlenség:* $d_n < d_1 + \dots + d_{n-1}$. A különbség $(d_1 + \dots + d_{n-1}) - d_n = \sum_k d_k - 2d_n$ páros, tehát legalább 2. Kössünk össze egy éllel két különböző, $v_1, \dots, v_{n-1}$ közötti csúcsot, amelyeknek még van kielégítetlen foksámigénye, és csökkentsük mindkettőjük igényét 1-gyel. Ezzel az $S = \sum_{k < n} (\text{hátralévő igény})$ összeget **2-vel csökkentettük**, d_n pedig változatlan maradt. Egyenlőek már? Ha igen, az (A) eset következik a hátralévő igényekkel; ha még nem, tovább csökkentünk. Mivel $S - d_n$ páros, és minden lépésben 2-vel csökken, egyszer pontosan 0 lesz.

Miért van mindig két alkalmas csúcs? Amíg $S > d_n$, legalább két $v_1, \dots, v_{n-1}$ közötti csúcsnak van pozitív hátralévő igénye: ha csak egynek, mondjuk v_i -nek volna, akkor S az ő hátralévő igénye volna, ami legfeljebb $d_i \leq d_n$ — ellentmondás. ■

28. Egyszerű gráfok foksámsorozatai

III. típus: egyszerű gráfok

A legérdekesebb (és legnehezebb) eset az, amikor sem hurokél, sem többszörös él nem lehet.

Kérdés. Mikor létezik a $d_1 \leq \dots \leq d_n$ foksámsorozatú **egyszerű** gráf?

A párosság és a $d_n \leq d_1 + \dots + d_{n-1}$ feltétel nyilván továbbra is szükséges, de már nem elég. Tekintsük az

$$1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 6, 6, 6$$

sorozatot! Az összeg 28 páros, és $6 \leq 22$, tehát a II. típusú gráf létezik. Egyszerű gráf azonban nem: a három 6-os fokú csúcs egymás között legfeljebb 2-2 foksámsorozatot tud kielégíteni (egy háromszöget alkothatnak), így mindegyiküktől legalább 4-4, összesen legalább 12 élnek kell átmennie a „túloldalra”, a kis fokú csúcsokhoz. A túloldal azonban összesen csak $1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 = 10$ élt tud fogadni.

Ez a gondolatmenet általánosítható. Tekintsük a k legnagyobb fokú csúcsot. Ezek egymás között — egyszerű gráfban — legfeljebb $\binom{k}{2}$ élt alkothatnak, ami a foksámösszegükből

legfeljebb $k(k-1)$ -et „nyel el”. A maradék $d_n + d_{n-1} + \dots + d_{n-k+1} - k(k-1)$ fokszámnak a kis fokú csúcsokhoz menő élekből kell kijönnie.

Tétel (szükséges feltétel). Ha létezik a $d_1 \leq \dots \leq d_n$ fokszámsorozatú egyszerű gráf, akkor minden $k = 1, \dots, n$ esetén

$$d_n + d_{n-1} + \dots + d_{n-k+1} - k(k-1) \leq d_1 + d_2 + \dots + d_{n-k}.$$

A fenti példában $k = 3$ -ra: $18 - 6 = 12 > 10$, tehát nincs ilyen egyszerű gráf.

Az előadáson elhangzott, hogy a megfordítás „majdnem” igaz, de kell még valami — ezt most nem néztük meg. A pontos feltételt az **Erdős–Gallai-tétel** adja meg. A különbség az, hogy egy kis fokú v_i csúcs nemcsak d_i -nél, hanem k -nál több élt sem fogadhat a k nagy fokú csúcstól (mindegyiktől legfeljebb egyet), ezért a jobb oldalon d_i helyett $\min(d_i, k)$ áll.

Tétel (Erdős–Gallai). A $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ nemnegatív egészekből álló sorozatot pontosan akkor realizálja egyszerű gráf, ha $\sum_k d_k$ páros, és minden $k = 1, \dots, n$ esetén

$$d_n + d_{n-1} + \dots + d_{n-k+1} \leq k(k-1) + \sum_{i=1}^{n-k} \min(d_i, k).$$

Kiegészítés — az Erdős–Gallai-tétel bizonyítása. A bizonyításban kényelmesebb **csökkenő** sorrendben indexelni: legyen $D_1 \geq D_2 \geq \dots \geq D_n$ (vagyis $D_i = d_{n+1-i}$). Jelölje

$$L_k(D) = \sum_{i=1}^k D_i, \quad R_k(D) = k(k-1) + \sum_{i=k+1}^n \min(D_i, k).$$

A feltétel: $\sum_i D_i$ páros, és $L_k(D) \leq R_k(D)$ minden k -ra. Az ilyen sorozatot röviden **EG-sorozatnak** nevezzük.

Szükségesség. Legyen G egy realizáció, $\deg(v_i) = D_i$, és $S = \{v_1, \dots, v_k\}$. Az $L_k(D)$ összeg az S -en belüli éleket kétszer, az S -ből kifelé menőket egyszer számolja. Az S -en belüli élek száma legfeljebb $\binom{k}{2}$, ez $k(k-1)$ -et ad. Egy $v_i \notin S$ csúcs legfeljebb D_i élt küldhet S -be, de mivel mindegyik S -beli csúcshoz legfeljebb egyet, legfeljebb k -t is; így legfeljebb $\min(D_i, k)$ -t. Ezért $L_k(D) \leq R_k(D)$.

Elégségesség. Teljes indukció a $\sum_i D_i$ összeg szerint. Ha az összeg 0, az üres (él nélküli) gráf megfelel. A 0 tagokat elhagyhatjuk (az R_k összegekhez nem járulnak hozzá,

a realizációhoz pedig utólag izolált csúcsokként hozzávehetők), tehát feltehetjük, hogy minden $D_i \geq 1$. A $k = 1$ feltétel szerint $D_1 \leq \sum_{i \geq 2} \min(D_i, 1) = n - 1$.

Legyen $m = D_1$, és t a legnagyobb olyan index, amelyre $D_1 = D_2 = \dots = D_t$; ha ez $t = n$ volna (minden tag egyenlő), legyen $t = n - 1$. Így $1 \leq t \leq n - 1$, $D_1 = \dots = D_t = m$, és vagy $D_t > D_{t+1}$, vagy $t = n - 1$. Képezzük az E sorozatot: $E_t = D_t - 1$, $E_n = D_n - 1$, a többi tag változatlan. Az E sorozat nemnegatív, csökkenő (a t -edik tag csökkentése nem rontja el a sorrendet, mert $D_t > D_{t+1}$ vagy $t + 1 = n$), és összege $\sum D_i - 2$, páros.

1. lépés: E is EG-sorozat. Három esetet vizsgálunk.

- $t \leq k \leq n - 1$. Ekkor $L_k(E) = L_k(D) - 1$. Az R_k összegben csak az $i = n$ tag változhat, legfeljebb 1-gyel, így $R_k(E) \geq R_k(D) - 1 \geq L_k(D) - 1 = L_k(E)$.
- $k = n$. $L_n(E) = L_n(D) - 2 \leq R_n(D) = n(n - 1) = R_n(E)$.
- $1 \leq k < t$. Ekkor $L_k(E) = L_k(D) = km$.
 - Ha $m \leq k - 1$: $km \leq k(k - 1) \leq R_k(E)$.
 - Ha $m = k$: elég, hogy $\sum_{i > k} \min(E_i, k) \geq k$. Ha $t \geq k + 2$, ezt már az $E_{k+1} = m = k$ tag biztosítja. Ha $t = k + 1$, az $E_t = k - 1$ tag $k - 1$ -et ad, és kell még legalább 1: ha van $t < i < n$ index, az $E_i = D_i \geq 1$ tag megadja; ha nincs, akkor $n = k + 2$, és az $E_n = D_n - 1$ tag kell, hogy pozitív legyen. Ha pedig $D_n = 1$ volna, a sorozat $(k, \dots, k, 1)$ lenne $k + 1$ darab k -val, összege $k(k + 1) + 1$ páratlan — ez kizárt.
 - Ha $m \geq k + 1$: az $E_t = m - 1 \geq k$ tag miatt $\min(E_t, k) = k = \min(D_t, k)$, tehát R_k -ban csak az $i = n$ tag változhat, és az is csak akkor (pontosan 1-gyel csökken), ha $D_n \leq k$. Ha $D_n > k$, akkor $R_k(E) = R_k(D) \geq L_k(E)$. Ha $D_n \leq k$, megmutatjuk, hogy $L_k(D) < R_k(D)$, és ekkor $L_k(E) = L_k(D) \leq R_k(D) - 1 = R_k(E)$.
Tegyük fel indirekten, hogy $L_k(D) = R_k(D)$. A $D_{k+1} = \dots = D_t = m \geq k + 1$ tagok egyenként k -t adnak $R_k(D)$ -hez, így

$$km = k(k - 1) + (t - k)k + \sum_{i > t} \min(D_i, k), \quad \text{azaz} \quad \sum_{i > t} \min(D_i, k) = k(m - t + 1).$$

Minden $i > t$ -re $\min(D_i, t) \leq \frac{t}{k} \min(D_i, k)$ (ha $D_i \leq k$, a bal oldal D_i , ha $D_i > k$, legfeljebb $t = \frac{t}{k} \cdot k$), és az $i = n$ indexre szigorú egyenlőtlenség áll, mert ott $\min(D_n, t) = D_n < \frac{t}{k} D_n$. Így

$$R_t(D) = t(t - 1) + \sum_{i > t} \min(D_i, t) < t(t - 1) + \frac{t}{k} \cdot k(m - t + 1) = tm = L_t(D),$$

ami ellentmond annak, hogy D EG-sorozat.

2. lépés: D realizálása. Az indukciós feltevés szerint van olyan G' egyszerű gráf, amelyben $\deg(v_i) = E_i$. Ha v_t és v_n nem szomszédos G' -ben, kössük össze őket: a kapott gráf D -t realizálja.

Ha szomszédosak, „cserélgetünk”. A v_t csúcsnak v_n -en kívül $E_t - 1 = m - 2$ szomszédja van, ami kevesebb, mint a v_t -n és v_n -en kívüli csúcsok száma, $n - 2$ (hiszen $m \leq n - 1$). Van tehát olyan $x \neq v_t, v_n$ csúcs, amely nem szomszédja v_t -nek; $x = v_i$ valamilyen $i \notin \{t, n\}$ indexszel, így $\deg_{G'}(x) = D_i \geq D_n$. A v_n csúcsnak $D_n - 1$ szomszédja van, köztük v_t , amely nem szomszédja x -nek; így x és v_n közös szomszédainak száma legfeljebb $D_n - 2$. Ezért x -nek a legalább D_n szomszédja között van olyan y , amely nem szomszédja v_n -nek, és $y \neq v_n$ (legfeljebb $D_n - 2$ közös szomszéd, és legfeljebb maga v_n esik ki). Mivel v_t nem szomszédja x -nek, $y \neq v_t$.

Töröljük az xy élt, és vegyük hozzá a $v_t x$ és $v_n y$ éleket (ezek eddig nem voltak élek). Az x és y foka nem változik, v_t és v_n foka 1-gyel nő. Az így kapott egyszerű gráf D -t realizálja. ■

A Havel–Hakimi-algoritmus

Az Erdős–Gallai-feltétel ellenőrzéséhez n egyenlőtlenséget kell megvizsgálni, és ha teljesülnek, a gráfot még meg is kell találni. Az előadáson egy egyszerű, mohó algoritmust is láttunk, amely mindkét kérdést egyszerre megoldja.

Havel–Hakimi-algoritmus. A fokszámigényeket folyamatosan frissítjük, és mindig **monoton növekvő** sorrendbe rendezzük.

1. Vegyük a legnagyobb igényű csúcsot, d_n -t, és kössük össze a **közvetlenül előtte álló** d_n darab csúccsal — vagyis a többiek közül a d_n legnagyobb igényűvel. Ezek igénye 1-gyel csökken, a v_n -é 0 lesz:

$$\dots, d_{n-d_n} - 1, \dots, d_{n-2} - 1, d_{n-1} - 1, d_n \rightarrow 0.$$

2. Rendezzük újra a megmaradt igényeket, és **ismételjük**: újra a legnagyobbat elégítjük ki a közvetlenül utána következőkkel.
3. Ha minden igény 0-ra csökkent, **kész**: megkaptuk a gráfot. Ha valamelyik lépés nem hajtható végre (nincs elég pozitív igényű csúcs, amellyel a legnagyobbat össze lehetne kötni), akkor **nincs ilyen egyszerű gráf**.

Példa. Futtassuk az algoritmust az 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 sorozatra! Minden sorban a legnagyobb igényt elégítjük ki a közvetlenül előtte állókkal, majd újrendezünk.

lépés	igények (növekvő sorrendben)	a legnagyobbat összekötjük...
0	1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3	a 3, 3, 2 igényűekkel
1	1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2	a 2, 2 igényűekkel
2	1, 1, 1, 1, 1, 1, 2	az 1, 1 igényűekkel
3	0, 0, 1, 1, 1, 1	az 1 igényűvel
4	0, 0, 0, 1, 1	az 1 igényűvel
5	0, 0, 0, 0	kész!

Az algoritmus lefutott, tehát van ilyen egyszerű gráf, és a lépésekben behúzott élek meg is adják.

Ellenpélda. Az 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 6, 6, 6 sorozatnál az első lépés után (6-ost összekötjük a 6, 6, 2, 2, 2, 1 igényű csúcsokkal) az igények rendezve 0, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 5. A következő 5-öst összekötte a 5, 1, 1, 1, 1 igényűekkel: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 4. Most a 4-es igényű csúcsot négy másikkal kellene összekötni, de csak két pozitív igényű csúcs maradt: az algoritmus elakad, **nincs ilyen egyszerű gráf** — összhangban azzal, amit korábban láttunk.

Az előadás összegzése szerint ez **jó algoritmus: pont akkor kerül bajba, amikor baj van.** Ezt a következő tétel mondja ki pontosan.

Tétel (Havel–Hakimi). Legyen $d_1 \leq \dots \leq d_n$, és tegyük fel, hogy $d_n \leq n - 1$. A sorozat pontosan akkor realizálható egyszerű gráffal, ha az a sorozat realizálható, amelyet úgy kapunk, hogy d_n -t elhagyjuk, és a $d_{n-1}, d_{n-2}, \dots, d_{n-d_n}$ tagokat 1-gyel csökkentjük. (Ha $d_n > n - 1$, a sorozat nem realizálható, hiszen egy csúcsnak legfeljebb $n - 1$ szomszédja lehet.)

Kiegészítés — a Havel–Hakimi-tétel bizonyítása. Legyen $S = \{v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_{n-d_n}\}$ a d_n darab legnagyobb igényű többi csúcs.

Ha a csökkentett sorozat realizálható, vegyünk egy realizációját a $v_1, \dots, v_{n-1}$ csúcsokon, adjunk hozzá egy új v_n csúcsot, és kössük össze az S halmaz elemeivel. Az S -beli csúcsok foka 1-gyel nő, v_n foka d_n : ez d realizációja.

Megfordítva, tegyük fel, hogy d realizálható. Elég megmutatni, hogy van olyan G realizáció, amelyben v_n szomszédai **pontosan** az S elemei, hiszen ekkor v_n -et törölve a csökkentett sorozat realizációját kapjuk. A d realizációi közül válasszunk egy olyan G -t, amelyben $|N(v_n) \cap S|$ a lehető legnagyobb ($N(v)$ a v szomszédainak halmaza). Tegyük fel indirekten, hogy $N(v_n) \neq S$. Mivel $|N(v_n)| = d_n = |S|$, van olyan

$v_a \in N(v_n) \setminus S$ és $v_b \in S \setminus N(v_n)$. Ekkor $a < b$ (az S -en kívüli, v_n -től különböző csúcsok indexe kisebb az S -beliekénél), így $d_a \leq d_b$.

Keresünk egy olyan w szomszédját v_b -nek, amely nem szomszédja v_a -nak, és $w \neq v_a$. A v_b szomszédai közül legfeljebb $d_a - 1$ tartozhat $N(v_a) \cup \{v_a\}$ -hoz: v_a szomszédai közül v_n nem szomszédja v_b -nek, és ha v_a és v_b szomszédos, akkor $v_b \in N(v_a)$ nem szomszédja önmagának, viszont $v_a \in N(v_b)$ — ez a két hatás kiegyenlíti egymást. Így v_b -nek legalább $d_b - (d_a - 1) \geq 1$ alkalmas w szomszédja van; $w \neq v_n$, mert v_n nem szomszédja v_b -nek.

Töröljük a $v_n v_a$ és $v_b w$ éleket, és vegyük hozzá a $v_n v_b$ és $v_a w$ éleket (ezek eddig nem voltak élek). Minden foksám változatlan, tehát ez is realizáció, és benne $|N(v_n) \cap S|$ eggyel nagyobb — ellentmondás G választásával. ■

Miért helyes ebből az algoritmus? A tétel szerint minden lépésben a sorozat pontosan akkor realizálható, ha a lépés után kapott rövidebb sorozat realizálható. Ha az algoritmus végigfut (minden igény 0), az utolsó sorozatot az él nélküli gráf realizálja, és visszafelé haladva mindegyiket. Ha elakad, mert a legnagyobb igény nagyobb a többi csúcs számánál, vagy egy igény negatívvá válna (vagyis nincs elég pozitív igényű csúcs), akkor az aktuális sorozat nem realizálható, így — a tétel szerint visszafelé haladva — az eredeti sem.

A III. rész összefoglalása

- **Gráf:** $G = (V, E)$; hurokél, többszörös él, **egyszerű gráf**. Izomorfia: éltartó bijekció a csúcshalmazok között. Egyszerű gráfban $|E| \leq \binom{n}{2}$.
- **Kézfogási lemma:** $\sum_v \deg(v) = 2|E|$.
- **Séta** (bármilyen ismétlődhet), **vonal** (az élek különbözők), **út** (a csúcsok különbözők), **kör** (zárt út). Ha van séta, van út is.
- **Összefüggőség:** a „van közöttük séta” reláció ekvivalenciareláció; az osztályai a komponensek.
- **Fa:** összefüggő, körmentes. Legalább 2 csúcs esetén van legalább 2 lelevele; n csúcsú fának $n - 1$ éle van. Ekvivalens jellemzések: minimális összefüggő; maximális körmentes; összefüggő és $n - 1$ élű; körmentes és $n - 1$ élű; bármely két csúcs között pontosan egy út.
- **Feszítőfa:** minden összefüggő gráfnak van (körök éleinek törlésével). **Minimális összsúlyú feszítőfa:** az optimista (Kruskal) és a pesszimista algoritmus is optimális.
- **Cayley-tétel:** az n csúcsú címkézett fák száma n^{n-2} . **Prüfer-kód:** legkisebb levél letétele, a szomszéd feljegyzése; az i csúcs $\deg(i) - 1$ -szer szerepel; bijekció a fák és $[n]^{n-2}$ között.

- **Fokszámsorozatok:** hurokélekkel: $\sum d_k$ páros; hurokél nélkül: még $d_n \leq \sum_{k < n} d_k$; egyszerű gráf: **Erdős–Gallai-feltétel**, illetve a **Havel–Hakimi-algoritmus**, amely pont akkor akad el, amikor nincs megfelelő gráf.