

Selected sample potentials (B = 0.1-1 cm^{-1}, completed runs)


case	id	V0_depth_cm1	B_cm1	V1/V0	V2/V0	target_depth	anisotropy
1A	1617	17.7	0.169	0.11	0.05	20	weakweak
1B	982	34.7	0.216	0.1	0.06	40	weakweak
2A	871	17.3	0.148	1.57	0.2	20	v1large
2B	1249	43.9	0.148	1.7	0.3	40	v1large
3A	1190	19.3	0.132	0.12	1.04	20	v2large
3B	1731	24.5	0.256	0.17	1.11	40	v2large


Case 1A: V1 & V2 weak (V0~20 cm^{-1}) pot1617: V0=17.7 cm^{-1}, B=0.169 cm^{-1}, V1/V0=0.11, V2/V0=0.05







Case 1B: V1 & V2 weak (V0~40 cm^{-1}) pot0982: V0=34.7 cm^{-1}, B=0.216 cm^{-1}, V1/V0=0.10, V2/V0=0.06







Case 2A: V1 large, V2 weak (V0~20 cm^{-1}) pot0871: V0=17.3 cm^{-1}, B=0.148 cm^{-1}, V1/V0=1.57, V2/V0=0.20







Case 2B: V1 large, V2 weak (V0~40 cm^{-1}) pot1249: V0=43.9 cm^{-1}, B=0.148 cm^{-1}, V1/V0=1.70, V2/V0=0.30





Case 3A: V1 weak, V2 large (V0~20 cm^{-1}) pot1190: V0=19.3 cm^{-1}, B=0.132 cm^{-1}, V1/V0=0.12, V2/V0=1.04





Case 3B: V1 weak, V2 large (V0~40 cm^{-1}) pot1731: V0=24.5 cm^{-1}, B=0.256 cm^{-1}, V1/V0=0.17, V2/V0=1.11

