

# 數論轉換介紹

**Number Theoretic Transform (NTT)**

**2025/04/09**

# 請 gpt 幫我生投影片

ChatGPT ▾

↑ 分享

你能夠直接產出odp格式的投影片給我嗎，大概5頁就好，我自己加到投影片中間

我會幫你製作 5 頁 ODP 格式的投影片，內容涵蓋：

1. **數論轉換基礎**（模運算與原根）
2. **NTT 的基本步驟**（簡單範例）
3. **NTT 與 FFT 的比較**（直覺理解）
4. **NTT 的應用場景**（密碼學、快速多項式運算）
5. **習題與練習**（手算與程式實作建議）

稍等一下，我馬上生成 ODP 投影片。



# 數論轉換補充投影片

補充基礎概念、範例與應用

# 數論轉換基礎

- - 模運算：  $a \equiv b \pmod{m}$
- - 原根的概念：找到一個數  $g$ ，使得  $g^k \pmod{m}$  遍歷所有非零元素
- - 選取適當的質數  $p$ ，使得  $p-1$  有較小的質因數

# NTT 的基本步驟

- 1. 選擇適當的模數  $p$  和原根  $g$
- 2. 建立 NTT 變換矩陣
- 3. 計算 NTT，類似 FFT 的蝶形運算
- 4. 進行逆變換來還原原始數據

# NTT 與 FFT 的比較

- - FFT 使用浮點數，NTT 使用整數模運算
- - NTT 不受浮點誤差影響，適用於精確計算
- - NTT 適用於密碼學與計算機代數

# NTT 的應用場景

- - 密碼學（如同態加密）
- - 多項式乘法加速
- - 競程（如大數計算與快速卷積）

# 習題與練習

- 1. 計算  $3^4 \bmod 7$  是多少？
- 2. 找到 7 的一個原根
- 3. 手算一個簡單的 NTT 變換
- 4. 嘗試用 Python/Octave 實作簡單的 NTT



# XIV. Number Theoretic Transform (NTT)

## • 14-A Definition

### Number Theoretic Transform and Its Inverse

$$F(k) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) \alpha^{nk} \pmod{M}, k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$f(n) = N^{-1} \sum_{k=0}^{N-1} F(k) \alpha^{-nk} \pmod{M}, n = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad \begin{matrix} NTT \\ f(n) \Leftrightarrow F(k) \\ INTT \end{matrix}$$

Note :

因為希望有 inverse

(1)  $M$  is a **prime number**,  $\pmod{M}$ : 是指除以  $M$  的餘數

(2)  $N$  is a factor of  $M-1$

(Note: when  $N \neq 1$ ,  $N$  must be relatively prime to  $M$ )

(3)  $N^{-1}$  is **an integer** that satisfies  $(N^{-1})N \pmod{M} = 1$

(When  $N = M-1$ ,  $N^{-1} = M-1$ ), it is also called the inverse of  $N \pmod{M}$

(4)  $\alpha$  is a root of unity of order  $N$

$$\alpha^N = 1 \pmod{M}$$

$$\alpha^k \neq 1 \pmod{M}, k = 1, 2, \dots, N - 1$$

When  $\alpha$  satisfies the above equations and  $N = M - 1$ , we call  $\alpha$  the “primitive root”.

$$\alpha^k \neq 1 \pmod{M} \quad \text{for } k = 1, 2, \dots, M - 2$$

$$\alpha^{M-1} = 1 \pmod{M}$$

沒有可以快速求出 primitive root 的方法  
>> 只能慢慢算

所以找 primitive root 來建立 transform  
才會只用一些比較小的數字

$\alpha^{-1}$  的求法與  $N^{-1}$  相似

$\alpha^{-1}$  is an integer that satisfies  $(\alpha^{-1})\alpha \pmod{M} = 1$

## Example 1:

$$M = 5 \quad \alpha = 2 \quad \alpha^1 = 2 \pmod{5} \quad \alpha^2 = 4 \pmod{5} \quad \alpha^3 = 3 \pmod{5} \quad \alpha^4 = 1 \pmod{5}$$

和 DFT 相同，都是 1

$2 \pmod{5}$   $3 \pmod{5}$

(1) When  $N = 4$  可以用 N 的因數做

在 5 的世界，最多可以做到四點的 length

(2) When  $N = 2$  ←

可以用比 N 小的數字做，primitive root 只是給一個上界  
(最多可以做到多少)

$$\begin{bmatrix} F[0] \\ F[1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f[0] \\ f[1] \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} F[0] \\ F[1] \\ F[2] \\ F[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f[0] \\ f[1] \\ f[2] \\ f[3] \end{bmatrix}$$

和 DFT 是相同的

- $N$ ：取幾次方以後 mod 完會 = 1

### Example 2:

$M = 7$  ,  $N = 6$  :  $\alpha$  cannot be 2 but can be 3.

$$\alpha = 2: \alpha^1 = 2 \pmod{7} \quad \alpha^2 = 4 \pmod{7} \quad \alpha^3 = 1 \pmod{7}$$

$$\alpha = 3: \alpha^1 = 3 \pmod{7} \quad \alpha^2 = 2 \pmod{7} \quad \alpha^3 = 6 \pmod{7}$$

$$\alpha^4 = 4 \pmod{7} \quad \alpha^5 = 5 \pmod{7} \quad \alpha^6 = 1 \pmod{7}$$

### Advantages of the NTT:

1. 使用整數，比較容易運算
2. 使用整數無誤差
3. 很多性質都跟 DFT 相同  
(幾乎完美的複製體)



### Disadvantages of the NTT:

1. 只能對整數做轉換
2. 不容易找到 root of unity
3. 較缺乏物理意義
  - (1) DFT 的 basis 是三角函數的波
  - (2) DFT 的特徵向量仍像是 Hermite-Gaussian 函數，這個性質讓 DFT 可以做 fractional，但是 NTT 特徵向量沒有這樣的性質

## • 14-B 關於餘數我們應該要知道的性質

(1)  $x \pmod{M}$  的值，必定為  $0 \sim M-1$  之間

(2)  $a + b \pmod{M} = \{a \pmod{M} + b \pmod{M}\} \pmod{M}$

例：  $78 + 123 \pmod{5} = 3 + 3 \pmod{5} = 1$

(Proof): If  $a = a_1M + a_2$  and  $b = b_1M + b_2$ , then

$$a + b = (a_1 + b_1)M + a_2 + b_2$$

(3)  $a \times b \pmod{M} = \{a \pmod{M} \times b \pmod{M}\} \pmod{M}$

例：  $78 \times 123 \pmod{5} = 3 \times 3 \pmod{5} = 4$

(Proof): If  $a = a_1M + a_2$  and  $b = b_1M + b_2$ , then

$$a \times b = (a_1 b_1 M + a_1 b_2 + a_2 b_1)M + a_2 b_2$$

(4) 給定  $a$ ，如何計算出  $a^{-1} \bmod M$ ?

答案：

1. 首先前面說  $M$  是質數，表示  $\gcd(a, M) = 1$
2. Bezout's Lemma 說 if  $\gcd(a, b) = d$ , 則存在  $s, t$  使得  $as + bt = d$
3. 所以存在  $as + Mt = 1$ ，兩邊  $\bmod M$  後，就可以得到  $s$  就是  $a$  的 inverse

至於怎麼求出  $s, t$ ，就是要使用 the Extended Euclidean Algorithm or Blankinship's Method，中文叫做輾轉相除法。

原理：

1. Euclidean Algorithm 的原理是若  $a = bq + r$  則  $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$
2. Extended Euclidean Algorithm 就是把求  $\gcd$  的過程紀錄下來然後一路反推

### ✓ Example 1.10.1

For our example, we will continue with the numbers used in [Example 1.8.1](#) from [Section 1.8](#). There we found that  $\gcd(803, 154) = 11$ . Bezout's Lemma guarantees that  $11 = 803s + 154t$  for some integers  $s, t$ . Let us determine a possible choice of  $s$  and  $t$ .

In [Example 1.8.1](#) we found the following:

$$803 = 154 \cdot 5 + 33$$

$$154 = 33 \cdot 4 + 22$$

$$33 = 22 \cdot 1 + 11$$

$$22 = 11 \cdot 2 + 0.$$

Rearranging and reordering all but the last of these equations, we get

$$11 = 33 - 22 \cdot 1$$

$$22 = 154 - 33 \cdot 4$$

$$33 = 803 - 154 \cdot 5$$

We now set about to find an expression of 11 as a linear combination of 803 and 154. Starting with the equation  $11 = 33 - 22 \cdot 1$ , we substitute  $22 = 154 - 33 \cdot 4$  (the next equation) to obtain

$$\begin{aligned} 11 &= 33 - (154 - 33 \cdot 4) \cdot 1 \\ &= 5 \cdot 33 - 1 \cdot 154. \end{aligned}$$

Now we will substitute for 33, using the equation  $33 = 803 - 154 \cdot 5$  above:

$$11 = 5 \cdot (803 - 154 \cdot 5) - 1 \cdot 154$$

and finally obtain

$$11 = 5 \cdot 803 - 26 \cdot 154.$$



請求出 47 在 101 的 inverse

①  $101 = 47 \times 2 + 7$

②  $47 = 7 \times 6 + 5$

③  $7 = 5 + 2$

④  $5 = 2 \times 2 + 1$

①  $5 - 2 \times 2 = 1, \therefore 5 = 2 \times 2 + 1$

②  $5 - (7 - 5) \times 2 = 1, \therefore 7 = 5 + 2$

③  $5 \times 3 - 7 \times 2 = 1$

④  $(47 - 7 \times 6) \times 3 - 7 \times 2 = 1, \therefore 47 = 7 \times 6 + 5$

⑤  $47 \times 3 - 7 \times 20 = 1$

⑥  $47 \times 3 - (101 - 47 \times 2) \times 20 = 1, \therefore 101 = 47 \times 2 + 7$

⑦  $47 \times 43 - 101 \times 20 = 1$  答案 43 即為所求

(5) 給定  $a$ ，如何計算出  $a^n \bmod M$ ?

動機：回憶一下 NTT 的定義



$$F(k) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) \alpha^{nk} \pmod{M}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$f(n) = N^{-1} \sum_{k=0}^{N-1} F(k) \alpha^{-nk} \pmod{M}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$f(n) \underset{INTT}{\overset{NTT}{\rightleftharpoons}} F(k)$$

答案：

1. 乍聽之下這是很蠢的問題，不就是先把  $a^n$  算出來，然後 mod M
2. 但是我們真的有辦法把  $a^n$  算出來嗎？當 a 和 n 都不小的時候，電腦會爆
3. 舉例：  $37^{89} \bmod 101$       ex:  $a^{16} = (a^8)^2 = ((a^4)^2)^2 = (((a^2)^2)^2)^2$   
 $(16)_{10} = (10000)_2$

所以實際上，我們先把指數分解成 binary

然後看到 0 就平方

看到 1 就平方後再乘上 37

```
z=37;n=89;N=101;
```

```
x=dec2bin(n); x = 1011001
```

```
t=1;
```

```
for k=1:length(x)    for k = 1:7
```

```
if x(k)=='0'
```

```
    t=mod(t.^2,N);
```

```
else
```

```
    t=mod((t.^2).*z,N);
```

```
endif
```

```
endfor
```

```
y=t;
```



答案的後續：

1. 看起來已經有個 happy ending 了，趕快來試試看  $37^{140548} \bmod 101$   
BUT!

還有一個更快的高招，費馬小定理

 Theorem 1.24.2: Fermat's Little Theorem

If  $p$  is prime and  $a$  is relatively prime to  $p$  then

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

範例：

Ex1:  $p=5, a=2, 2^4=16=1 \pmod{5}$

Ex2:  $p=13, a=3, 3^2=9, 3^3=27=1 \pmod{13}$  所以  $3^{12}=(3^3)^4=1^4=1 \pmod{13}$

費馬小定理說  $3^{12}$  是 1，不代表 3 的 1~11 次方之間不可能有  $\bmod 13$  同餘 1 的  
>> 代表 3 並非 primitive root

primitive root: 只有在 12 次方的時候才會同餘 1，在 12 次方之前都不會同餘 1

如何使用費馬小定理更快算出  $37^{140548} \bmod 101$  呢

首先我們知道  $37^{100} = 1 \bmod 101$

所以  $37^{140500} = 1 \bmod 101$

也就是說

別人還在想辦法把 140548 變成 2 進位

你卻只要算 48 的 2 進位就好



(6) 既然講到費馬小定理，就補充兩個數論的定理吧

1. 中國剩餘定理

2. Wilson 定理

### Theorem 1.23.1: Chinese Remainder Theorem

Let  $m_1, m_2, \dots, m_k$  be natural numbers such that each is greater than 1, and every pair of them is relatively prime. Let  $M = m_1 m_2 \cdots m_k$ , and let  $b_1, b_2, \dots, b_k$  be integers. The system of congruences

$$x \equiv b_1 \pmod{m_1};$$

$$x \equiv b_2 \pmod{m_2};$$

$$\vdots$$

$$x \equiv b_k \pmod{m_k};$$

has a unique solution in the set  $\{0, 1, 2, \dots, M - 1\}$ .

### Theorem 1.24.1: Wilson's Theorem

If  $p$  is a prime, then

$$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Q: 一個數介於 0~34 之間，被 5 除餘 2，被 7 除則餘 3

請問某數為多少

A: 分開處理，

甲：先找到一個數被 5 除餘 0，被 7 除餘 3

乙：再找一個數，被 5 除餘 2，被 7 除餘 0

兩者相加即為所求

甲如何達成？既然被 5 整除，叫它  $5K$  吧。又知道 5 在  $\text{mod } 7$  的 inverse 是 3 ( $3 \times 5 = 15 = 1 \text{ mod } 7$ )，所以如果要被 7 除餘 3 的話，就再乘以 3 即可，換句話說， $5 \times 3 \times 3 = 45$  就是 5 的倍數，且  $\text{mod } 7$  為 3

正規化，變成餘 1

但我們要餘 3，所以  
再乘 3

同理可以得到乙應該是  $3 \times 7 \times 2 = 42$  ( $3^{-1} = 7 \text{ mod } 5$ )

兩者相加為  $87 = 17 \text{ mod } 35$ ，所以答案是 17

## 另外一種解法

	0	1	2	3	4
0	0		7		
1		1		8	
2			2		9
3	10			3	
4		11			4
5	5		12		
6		6		13	





## 中國剩餘定理實戰

Q: 超過兩個數怎麼辦？一個數被 3 除餘 2，被 5 除餘 1，被 7 除餘 4，答案在 0~104

A: 一樣分開處理

$$35a+21b+15c=2 \pmod{3}$$

$$35a+21b+15c=1 \pmod{5}$$

$$35a+21b+15c=4 \pmod{7}$$

=>

$$2a=2$$

$$b=1$$

$$c=4$$

$$35 \times 1 + 21 \times 1 + 15 \times 4 = 116 = 11 \pmod{105} \text{，所以答案是 11}$$

## Wilson 定理，與它的用途

(中國剩餘定理的用途太廣，大家自己搜尋)

以  $p=11$  為例  $10!=10 \times 9 \times 8 \times \dots \times 1 = 10 = -1 \pmod{11}$

如何計算  $2^{-1}$

可以這樣想： $(p-2)! = 1$ ,  $(p-2) \times (p-3)! = 1$ , 所以  $(p-3)!$  就是  $-2$  的 inverse  
 所以  $2$  的 inverse 就是  $-(p-3)!$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
!	1	2	6	2	10	5	2	5	1	10
inv	1	-5							5	10

如何計算  $3^{-1}$

可以這樣想： $(p-2)! = 1$ ,  $(p-2) \times (p-3)! = 1$ ,  $(p-2) \times (p-3) \times (p-4)! = 1$

所以  $(p-3)$  的 inverse 就是  $(p-2) \times (p-4)!$

所以 3 的 inverse 就是  $-(p-2) \times (p-4)!$

如何計算  $4^{-1}$

$(p-2)(p-3)(p-4) \times (p-5)! = 1$ , 所以  $3! \times (p-5)!$  就是  $(p-4)$  的 inverse

....

簡言之，可以透過計算階層，利用  $O(N)$  的乘法，算出所有的 inverse

7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
!	1	2	6	2	10	5	2	5	1	10
inv	1	-5	-7				8	7	5	10

小結：

(1) 如果只求某個特定數的 inverse，請使用輾轉相除法

(2) 如果想求所有的 inverse，可使用 Wilson 定理

思考一下，輾轉相除法是  $O(?)$



另外，如果做 NTT，只需要乘法就好

那麼由於 mod  $M$  中，只有  $M^2$  個可能的加法， $M^2$  個可能的乘法

可事先將加法和乘法的結果存在記憶體當中

需要時再 “LUT”

LUT : lookup table

## • 14-C Properties of Number Theoretic Transforms

### P.1) Orthogonality Principle

$$S_N = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^{nk} \alpha^{-n\ell} = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^{n(k-\ell)} = N \cdot \delta_{k,\ell}$$

proof : for  $k = \ell$ ,  $S_N = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^0 = N$

for  $k \neq \ell$ ,  $(\alpha^{k-\ell} - 1) S_N = (\alpha^{k-\ell} - 1) \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^{n(k-\ell)} = \alpha^{N(k-\ell)} - 1 = 1 - 1 = 0$

$\because \alpha^{k-\ell} \neq 1 \quad \therefore S_N = 0$

### P.2) The NTT and INTT are exact inverse

proof :  $g(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F(k) \alpha^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left( \sum_{\ell=0}^{N-1} f(\ell) \alpha^{\ell k} \right) \alpha^{-nk}$

$$= \frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} f(\ell) \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^{(\ell-n)k} = \frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} f(\ell) \cdot N \delta_{\ell,n} = f(n)$$

### P.3) Symmetry

$$f(n) = f(N-n) \quad \overset{\text{NTT}}{\Leftrightarrow} \quad F(k) = F(N-k)$$

$$f(n) = -f(N-n) \quad \overset{\text{NTT}}{\Leftrightarrow} \quad F(k) = -F(N-k)$$

### P.4) INNT from NTT

$$f(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F(k) \alpha^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{(-k)=0}^{N-1} F(-k) \alpha^{nk} = \text{NTT of } \frac{1}{N} F(-k)$$

Algorithm for calculating the INNT from the NTT

(1)  $F(-k)$  : time reverse

$$F_0, F_1, F_2, \dots, F_{N-1} \xrightarrow[\text{reverse}]{\text{time}} F_0, F_{N-1}, \dots, F_2, F_1$$

(2) NTT[  $F(-k)$  ]

(3) 乘上  $N^{-1}$

## P.5) Shift Theorem

$$f(n + \ell) \leftrightarrow F(k) \alpha^{-\ell k}$$

$$f(n) \alpha^{n\ell} \leftrightarrow F(k + \ell)$$

## P.6) Parseval's Theorem

$$N \sum_{n=0}^{N-1} f(n) f(-n) = \sum_{k=0}^{N-1} F^2(k)$$

$$N \sum_{n=0}^{N-1} f(n)^2 = \sum_{k=0}^{N-1} F(k)F(-k)$$

## P.7) Linearity

$$a f(n) + b g(n) \leftrightarrow a F(k) + b G(k)$$

## P.8) Reflection

If  $\mathcal{A}$  then  $\mathcal{B}$  then

$$f(n) \leftrightarrow F(k) \qquad f(-n) \leftrightarrow F(-k)$$

$$f(-n) \leftrightarrow F(-k)$$

## ★ ★ P.9) Circular Convolution (the same as that of the DFT)<sup>32</sup>

If  $f(n) \leftrightarrow F(k)$

$g(n) \leftrightarrow G(k)$

then  $f(n) \otimes g(n) \leftrightarrow F(k)G(k)$

i.e.,  $f(n) \otimes g(n) = INTT \{ NTT[f(n)] NTT[g(n)] \}$

$f(n) \cdot g(n) \leftrightarrow \frac{1}{N} F(k) \otimes G(k)$

(Proof):  $INNT(NNT(f[n])NNT(g[n])) = N^{-1} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^{-nk} F(k)G(k)$

$$= N^{-1} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^{-nk} \sum_{m=0}^{N-1} f[m] \alpha^{mk} \sum_{q=0}^{N-1} g[q] \alpha^{qk}$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{q=0}^{N-1} f[m]g[q] N^{-1} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^{-nk} \alpha^{mk} \alpha^{qk}$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{q=0}^{N-1} f[m]g[q] \delta[ ((m+q-n))_N ]$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{q=0}^{N-1} f[m]g[ ((n-m))_N ] = f[n] \otimes g[n]$$

We apply the fact that

$$\sum_{k=0}^{N-1} \alpha^{nk} = \begin{cases} 1 & \text{if } n \text{ is a multiple of } N \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

When  $q = ((n-m))_N$   
 $m+q-n$  is a multiple of  $N$



## • 14-D Complex Number Theoretic Transform (CNT)<sup>33</sup>

→ 可以找稍微小一點的數字，就能有比較大的 length

The integer field  $Z_M$  can be extended to complex integer field

If the following equation does not have a sol. in  $Z_M$

$$x^2 = -1 \pmod{M} \text{ 無解}$$

This means  $(-1)$  does not have a square root

質數分兩種， $4k+1$  和  $4k+3$  的

When  $M = 4k + 1$ , there is a solution for  $x^2 = -1 \pmod{M}$ .

When  $M = 4k + 3$ , there is no solution for  $x^2 = -1 \pmod{M}$ .

For example, when  $M = 13$ ,  $8^2 = -1 \pmod{13}$ .

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 3, \quad 2^5 = 6, \quad 2^6 = 12 = -1,$$

$$2^7 = 11, \quad 2^8 = 9, \quad 2^9 = 5, \quad 2^{10} = 10, \quad 2^{11} = 7, \quad 2^{12} = 1$$

把 1~12 的平方都寫出來，  
直接找  $x^2 = -1 \pmod{M}$  的解

When  $M = 11$ , there is no solution for  $x^2 = -1 \pmod{M}$ .

$$M = 4k + 3$$

If there is no solution for  $x^2 = -1 \pmod{M}$ , we can define an imaginary number  $i$  such that

$$i^2 = -1 \pmod{M}$$

ex:  $M = 7 = 4 * 1 + 3$

>> 會有 48 個數字可用 ( $7 * 7$  扣掉 0)

>> 在小小的  $M$  ( $M = 7$ ) 就可以做長度為 48 的 NTT

Then, “ $i$ ” will play a similar role over finite field  $Z_M$  such that plays over the complex field.

$$(a + i b) \pm (c + i d) = (a \pm c) + i (b \pm d)$$

$$(a + i b) \cdot (c + i d) = ac + i^2 bd + i bc + i ad$$

$$= (ac - bd) + i (bc + ad)$$

## • 14-E Legendre sequence and Gauss sum

Legendre sequence 只有 0, 1, -1 三種數字，長度為  $p$ ，開頭一定是 0，  
接下來如果是平方數則為 1，不是平方數就是 -1

ChatGPT ▾



MU



Legendre序列 (Legendre sequence) 和高斯和 (Gauss sum) 是數論和數字信號處理中的重要概念，兩者之間有一定的關聯。

### Legendre序列

Legendre序列是基於Legendre符號定義的一個二進制序列。給定一個奇素數 $p$ ，Legendre符號 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 定義如下：

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & \text{如果 } a \equiv 0 \pmod{p} \\ 1 & \text{如果 } a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩餘} \\ -1 & \text{如果 } a \text{ 不是模 } p \text{ 的二次剩餘} \end{cases}$$

Legendre序列 $\{a_n\}$ 是由Legendre符號生成的，定義如下：

$$a_n = \left(\frac{n}{p}\right) \text{ 對於 } n = 0, 1, 2, \dots, p-1$$

這個序列長度為 $p$ ，且其中的值是-1和1。



[https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic\\_Gauss\\_sum](https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_Gauss_sum)

## 高斯和

高斯和是一類複雜數值和，定義為：

$$G(\chi) = \sum_{n=0}^{p-1} \chi(n) e^{2\pi i n/p}$$

其中 $\chi$ 是一個模 $p$ 的狄利克雷特徵 (Dirichlet character)，特別是當 $\chi$ 是Legendre符號時，高斯和稱為Legendre高斯和。

對於Legendre符號，對應的高斯和記為 $G\left(\left(\frac{\cdot}{p}\right)\right)$ ，即：

$$G = \sum_{n=0}^{p-1} \left(\frac{n}{p}\right) e^{2\pi i n/p}$$

## 關聯

Legendre序列和高斯和之間的關聯在於，Legendre序列的結構和性質對應於高斯和的性質。具體而言，Legendre高斯和的模長度為：

$$|G| = \sqrt{p}$$

這是一個重要的結果，因為它揭示了Legendre符號生成的二進制序列的自相關性質。Legendre序列在很多應用中具有良好的自相關性質，這使得它們在數字通訊和密碼學中具有重要應用。

Let  $M = 11$ ,  $N = 5$ , primitive root  $g = 2$ ,  $\alpha = g^2 = 4$

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 5 & 9 & 3 \\ 1 & 5 & 3 & 4 & 9 \\ 1 & 9 & 4 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 9 & 5 & 4 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

是平方數放 1  
 $1 = 1^2 \pmod{5}$   
 2  
 3  
 $4 = 2^2 \pmod{5}$

比較一下， $Fx$  和  $\text{fft}(x)$  有何相似

$$Fx = [0 \ 4 \ 7 \ 7 \ 4]$$

$1 \times 0 + 4 \times 1 + 5 \times (-1) + 9 \times (-1) + 3 \times 1 = 0 + 4 - 5 - 9 + 3 = -7 \equiv 4 \pmod{11}$

注意在 mod 11 中 4 的平方就是 5

換句話說 4 就是 根號 5  $4^2 = 16 \equiv 5 \pmod{11}$

```
>> fft([0 1 -1 -1 1]')
ans =

    0
 2.2361
-2.2361
-2.2361
 2.2361

>> |
```

## • 14-F Impulse train and Ramanujan's sum


假設長度  $N$  有一個因數  $d$ ，則 Impulse train 為

An 1D impulse train  $\Pi_{N,d}$  is

$$\Pi_{N,d}(n) = \begin{cases} 1 & n = md, \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

with  $d|N$ . Alternatively, we can write

$$\Pi_{N,d}(n) = \sum_{m=0}^{\frac{N}{d}-1} \delta(n - md).$$



time domain 是 impulse train，frequency domain 也會是 impulse train

範例： [1 0 0 1 0 0] 為  $N=6, d=3$  的 impulse train

[1 0 1 0 1 0] 為  $N=6, d=2$  的 impulse train

注意： [1 0 0 0 0 0] 為  $N=6, d=6$  的 impulse train

[1 1 1 1 1 1] 為  $N=6, d=1$  的 impulse train

Impulse train 的性質：做完轉換後變成 weighted impulse train

範例：

[1 0 0 1 0 0] 做 DFT 之後，變成 [2 0 2 0 2 0]

[1 1 1 1 1 1] 做 DFT 之後，變成 [6 0 0 0 0 0]

注意從  $N, d$  的 impulse train，變成  $N, N/d$  的

請大家想想看

這個性質在 NTT 中會不會成立呢

M=13 為例做一個 6 點的 NTT

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 12 & 9 & 10 \\ 1 & 3 & 9 & 1 & 3 & 9 \\ 1 & 12 & 1 & 12 & 1 & 12 \\ 1 & 9 & 3 & 1 & 9 & 3 \\ 1 & 10 & 9 & 12 & 3 & 4 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

比較一下， $Fx$  和  $\text{fft}(x)$  有何相似， $Fy$  和  $\text{fft}(y)$  呢？



## Ramanujan's sum

# Ramanujan's sum

🌐 12 languages ▼

Article [Talk](#)

[Read](#) [Edit](#) [View history](#) [Tools](#) ▼

From Wikipedia, the free encyclopedia

*Not to be confused with [Ramanujan summation](#).*

In [number theory](#), **Ramanujan's sum**, usually denoted  $c_q(n)$ , is a function of two positive integer variables  $q$  and  $n$  defined by the formula

$$c_q(n) = \sum_{\substack{1 \leq a \leq q \\ (a,q)=1}} e^{2\pi i \frac{a}{q} n},$$

where  $(a, q) = 1$  means that  $a$  only takes on values [coprime](#) to  $q$ .

## Ramanujan's sum

### What is Ramanujan's Sum

Let signal length  $N = 12$

Time Domain

$$\begin{aligned}
 n &= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \\
 x_{12}(n) &= [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] \\
 x_6(n) &= [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] \\
 x_4(n) &= [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] \\
 x_3(n) &= [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] \\
 x_2(n) &= [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] \\
 x_1(n) &= [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
 \end{aligned}$$

After DFT( Ramanujan's Sum)

$$\begin{aligned}
 k &= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \\
 \hat{x}_{12}(k) &= [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] \\
 \hat{x}_6(k) &= [1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1] \\
 \hat{x}_4(k) &= [2, -1, -1, 2, -1, -1, 2, -1, -1, 2, -1, -1] \\
 \hat{x}_3(k) &= [2, 0, -2, 0, 2, 0, -2, 0, 2, 0, -2, 0] \\
 \hat{x}_2(k) &= [2, 1, -1, -2, -1, 1, 2, 1, -1, -2, -1, 1] \\
 \hat{x}_1(k) &= [4, 0, 2, 0, -2, 0, -4, 0, -2, 0, 2, 0]
 \end{aligned}$$

簡單說：Ramanujan's sum 可以看作把特定的 0-1 sequence 去做 DFT

這個特定的 0-1 sequence 我叫 gcd-delta function

gcd-delta

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Impulse train

gcd-delta

independent

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

=

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

一定有一個 linear combination 可以讓 impulse train 轉換成互相獨立

6 點時因為 6 有四個因數：1, 2, 3, 6  
所以有四個 impulse train

做 fourier transform

Ramanujan's sum

兩邊去做 DFT

impulse train 做完 DFT 就會變成  
weighted impulse train

Ramanujan's sum

Weighted  
Impulse train


Take DFT at both side in eq. (15),

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

It shows Ramanujan's sum can be easily calculate by impulse train, without DFT.

好處：因為這兩個矩陣都是整數，所以 ramanujan's sum 這個矩陣也會都是整數

最後結論，大家可以把 DFT 的地方換成 NTT，結論還是一樣



- **14-G Applications of the NTT**

NTT 適合作 convolution

但是有不少的限制

新的應用： encryption ( 密碼學 )

CDMA

## References:

- (1) R. C. Agavard and C. S. Burrus, "Number theoretic transforms to implement fast digital convolution," *Proc. IEEE*, vol. 63, no. 4, pp. 550-560, Apr. 1975.
- (2) T. S. Reed & T. K. Truoay, "The use of finite field to compute convolution," *IEEE Trans. Info. Theory*, vol. IT-21, pp.208-213, March 1975
- (3) E. Vegh and L. M. Leibowitz, "Fast complex convolution in finite rings," *IEEE Trans ASSP*, vol. 24, no. 4, pp. 343-344, Aug. 1976.
- (4) J. H. McClellan and C. M. Rader, *Number Theory in Digital Signal Processing*, Prentice-Hall, New Jersey, 1979.
- (5) 華羅庚, "數論導引," 凡異出版社, 1997。
- (6) S. -C. Pei and K. -W. Chang, "Two Dimensional Efficient Multiplier-Less Structures of Möbius Function for Ramanujan Filter Banks," in *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 68, pp. 5079-5091, 2020, doi: 10.1109/TSP.2020.3021245.
- (7) [https://math.libretexts.org/Bookshelves/Combinatorics\\_and\\_Discrete\\_Mathematics/Elementary\\_Number\\_Theory\\_\(Barrus\\_and\\_Clark\)/01%3A\\_Chapters](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Combinatorics_and_Discrete_Mathematics/Elementary_Number_Theory_(Barrus_and_Clark)/01%3A_Chapters)  
1.8 、 1.9 、 1.10 、 1.13 、 1.14 、 1.23 、 1.24 、 1.26