



2019 版

南 卷 汇

大一下高数期末试题汇总

南洋书院学生会制作

目录

2018 年高等数学（下）期末试题.....	1
2018 年高等数学（下）期末答案.....	6
2017 年高等数学（下）期末试题.....	8
2017 年高等数学（下）期末答案.....	14
2016 年高等数学（下）期末试题.....	18
2016 年高等数学（下）期末答案.....	23
2015 年高等数学（下）期末试题.....	25
2015 年高等数学（下）期末答案.....	29
2014 年高等数学（下）期末试题.....	33
2014 年高等数学（下）期末答案.....	35

2018 年高数 (下) 期末

一、单项选择题 (共 5 道小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x, y)$ 在 $P(x_0, y_0)$ 处的某个邻域内有定义, 则下列说法正确的是 ().

A 若 $f(x, y)$ 在点 P 处的偏导数存在, 则 $f(x, y)$ 在该点一定可微;

B 若 $f(x, y)$ 在点 P 处连续, 则 $f(x, y)$ 在该点的偏导数一定存在;

C 若 $f(x, y)$ 在点 P 处有极限, 则 $f(x, y)$ 在该点一定连续;

D 若 $f(x, y)$ 在点 P 处可微, 则 $f(x, y)$ 在该点连续且偏导数一定存在.

2. 若 $f(x, y)$ 在 $D: a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 上有二阶连续偏导数, 则 $\iint_D \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} dx dy = ()$.

A $f(a, d) - f(b, d) - f(b, c) + f(a, c)$ B $f(b, d) - f(a, d) - f(b, c) + f(a, c)$

C $f(a, d) - f(b, d) - f(a, c) + f(b, c)$ D $f(b, d) - f(a, d) - f(a, c) + f(b, c)$

3. 若 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $I = \oint_L (x+1)^2 ds = ()$.

A $\frac{28}{3}\pi$ B 8π

C $\frac{19}{3}\pi$ D 12π

4. 微分方程 $y'' + 3y' + 2y = (ax + b)e^{-x}$ 的特解形式为 ().

A $y = Axe^{-x}$ B $y = (Ax + B)e^{-x}$ C $y = (Ax + B)xe^{-x}$ D $y = Ax^2e^{-x}$

5. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(2) = ()$.

A $2f(2)$, B $f(2)$, C $-f(2)$, D 0.

二、计算题 (共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分)

1. 求曲面 $e^{-z+xy}=3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面方程和法线方程.

2. 求密度为1的抛物体 $V: x^2 + y^2 \leq z \leq 1$ 绕 z 轴的转动惯量.

3. 设 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$, 计算 $\int \int_{(S)} (x + y + z) dS$.

4. 计算 $I = \int_L (y^2 + \sin^2(x + y)) dx + (x^2 - \cos^2(x + y)) dy$, 其中 L 为曲线 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 上从点 $A(1, 0)$ 到点 $B(0, 1)$ 的一段弧.

5. 计算积分 $I = \oint_C z dx + x dy + y dz$, 其中 C 为 $x + y + z = 1$ 被三个坐标面所截的三角形的边界, 方向与三角形上侧的法向量构成右手法则.

6. 设 $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 计算 $\text{div}[\text{grad } f(x, y, z)]$ 和 $\text{rot}[\text{grad } f(x, y, z)]$.

7. 已知 $y_1 = x, y_2 = x + e^x, y_3 = 1 + x + e^x$ 是 $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = Q(x)$ 的解, 试求此方程的通解.

8. 计算 $I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dy$.

三、(9分) 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性，偏导数的存在性及可微性。

四、(9分) 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上求一点 P ，使得函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在点 P 沿方向 $n = (1, -1, 0)$ 的方向导数最大，并求此方向导数的最大值。

五、(9分) 计算 $I = \oint_{(s)} (x - y + z) dy \wedge dz + (y - z + x) dz \wedge dx + (z^2 - x + y) dx \wedge dy$ ，其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与 $x^2 + y^2 + (z - R)^2 = R^2$ 所围立体表面的外侧。

六、(9分)求微分方程 $x''+2x'+2x=te^{-t}\cos t$ 的通解.

七、(9分)设 L 是不经过点 $(2,0),(-2,0)$ 的分段光滑的简单正向闭曲线，试就 L 的不同情形计算曲线积分

$$I=\oint_L\left[\frac{y}{(2-x^2)+y^2}+\frac{y}{(2+x^2)+y^2}\right]dx+\left[\frac{2-x}{(2-x^2)+y^2}-\frac{2+x}{(2+x^2)+y^2}\right]dy.$$

2018 年高数 (下) 期末答案

一、1.D 2.B 3.A 4.C 5.B

二、1. $(e^z - 1)dz + xdy + ydx = 0$, 将点 $(2, 1, 0)$ 代入, $dx = -2dy$, 法向量 $n = (1, 2, 0)$. (3分)

切平面方程为 $x - 2 + 2(y - 1) = 0$ 即 $x + 2y = 4$. (4分) 法线方程为 $x - 2 = \frac{y - 1}{2} = \frac{z}{0}$ (5分)

$$2. I_x = \iiint_{(V)} (x^2 + y^2) dV = \int_0^1 dz \int_{x^2 + y^2 \leq z^2} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} \rho^3 d\rho = \frac{\pi}{6} \quad (5分)$$

$$3. \iint_{(S)} (x + y + z) dS = \iint_{(S)} z dS = \int_{x^2 + y^2 \leq 4} \int_{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}^2 \frac{2}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} dx dy = 8\pi \quad (5分)$$

4. 补直线 $BA: y = 1 - x$, x 从 0 到 1, 直线 BA 与 L 围成的区域为 D .

$$I = \int_L + \int_{AB} - \int_{BA} = \iint_D 2(x - y) dx dy - \int_0^1 ((1 - x)^2 + \sin^2 1 - x^2 + \cos^2 1) dx = -1 \quad (5分)$$

5. 记 S 为平面 $x + y + z = 1$ 被三个坐标面所截的三角形, 由 Stokes 公式,

$$I = \iint_{(S)} dy \wedge dz + dz \wedge dx + dx \wedge dy = \sqrt{3} \iint_{(S)} dS = \frac{3}{2}. \quad (5分)$$

$$6. \text{grad } f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} (2x, 2y, 2z), \quad (2分) \quad \text{div}[\text{grad } f(x, y, z)] = \frac{2}{x^2 + y^2 + z^2}. \quad (4分)$$

$$\text{rot}[\text{grad } f(x, y, z)] = 0. \quad (5分)$$

$$7. y = C_1(y_3 - y_2) + C_2(y_2 - y_1) + y_1 = C_1 + C_2 e^x + x. \quad (5分)$$

$$8. I = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} \frac{xy}{\sqrt{1 + y^3}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{y^2}{\sqrt{1 + y^3}} = \frac{1}{6} \cdot 2\sqrt{1 + y^3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}(\sqrt{2} - 1). \quad (5分)$$

$$\text{三、} \left| xy \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{\pi}{2} |xy|, \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} xy \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0, f(x, y) \text{ 在 } (0, 0) \text{ 处连续, } (3分)$$

$$f_x(0, 0) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, 0) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0,$$

所以函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微. (9 分)

$$\text{四、} \text{ 设 } P(x, y, z), \nabla u = (2x, 2y, 2z), e_n = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_p = \nabla u \cdot e_n \Big|_p = \sqrt{2}(x, y). \quad (4分)$$

$$\text{设 } L = \sqrt{2}(x - y) + \lambda(2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1), \text{ 得 } L_x = 0, L_y = 0, L_z = 0, \quad (6分)$$

$$\text{得 } x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}, z = 0. u = x^2 + y^2 + z^2 \text{ 在 } P\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right) \text{ 方向导数最大, } \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_p = \sqrt{2}. \quad (9分)$$

五、记S所围区域为V，则有高斯公式

$$\begin{aligned} I &= 2 \int \int \int_{(V)} (1+z) dx dy dz \quad (4\text{分}) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi (1+z) (R^2 - (z-R)^2) dz + 2 \int \int \int_{(V)} \pi (1+z) (R^2 - z^2) dz \quad (6\text{分}) \\ &= \frac{5\pi}{12} (2+R) R^3. \quad (9\text{分}) \end{aligned}$$

六、特征根为 $-1 \pm i$ ，所以考虑 $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = te^{(-1+i)t}$ 的实部解，设该特解为

$$x^* = t(at+b)e^{(-1+i)t}, \quad (5\text{分}) \text{ 代入得 } a = -\frac{1}{4}, b = -\frac{1}{2} \quad (7\text{分})$$

$$\text{所以原方程的特解为 } x^* = \left(\frac{1}{4} t^2 \sin t - \frac{1}{2} t \cos t \right) e^{-t}. \quad (9\text{分})$$

$$\text{七、记 } I_1 = \oint_L \frac{y}{(2-x)^2 + y^2} dy + \frac{2-x}{(2-x)^2 + y^2} dy, I_2 = \oint_L \frac{y}{(2+x)^2 + y^2} dx + \frac{2+x}{(2+x)^2 + y^2} dy, \text{ 则 } I = I_1 + I_2,$$

$$\text{对 } I_1, I_2, \text{ 计算得 } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

(1) 若闭曲线L所围区域不包含点 $(2, 0), (-2, 0)$ ，则 $I_1 = I_2 = 0$ ，因此 $I = 0$. (3分)

(2) 若闭曲线L所围区域包含点 $(2, 0), (-2, 0)$ ，则分别作以这两个点为圆心，以 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$

$$\text{为半径的圆 } C_1, C_2, \text{ 则 } I_1 = \frac{1}{\varepsilon_1^2} \oint_{C_1} y dx + (2-x) dy = -\frac{2}{\varepsilon_1^2} \iint_{(2-x)^2 + y^2 \leq \varepsilon_1^2} dx dy = -2\pi \text{ 同理 } I_2 = -2\pi,$$

因此 $I = -4\pi$. (6分)

(3) 若点 $(2, 0), (-2, 0)$ 中一个在闭曲线L所围区域内部，一个在外部时， $I = -2\pi$. 9'

2017 下学期末高数

一、计算下列各题（每题 6 分，共 60 分）

1. 求 $u = 4x^2 + y^2 + z^2$ 在 $M = (1, 0, 2)$ 处的梯度和最大方向导数.

2. 求微分方程 $y''' - y'' + 2y' - 2y = 0$ 的通解.

3. 设 $u = f(t), t = \varphi(xy, x)$ 其中 f, φ 具有连续的二阶导数和偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

4. 求曲线 $\begin{cases} x=t \\ y=-t^2 \\ z=t^3 \end{cases}$ 与平面 $x+2y+z=4$ 的切线方程.

5. 求 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 - 9x$ 的所有极值.

6. 计算累次积分 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 x^2 e^{-y^2} dy$.

7. 计算二重积分 $I = \iint_D (xy + |y|) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$.

8. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x^3}{r^3} dy \wedge dx + \frac{y^3}{r^3} dx \wedge dy + \frac{z^3}{r^3} dz \wedge dy$ 其中

$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

9. 求第一类曲线积分 $I = \int_L \sqrt{2y^2 + z^2} ds$, 其中 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x - y = 0 \end{cases}$.

10. 求双曲抛物面 (马鞍面) $z = xy$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 所截下那部分的面积.

三、(本题 8 分) 讨论 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$

的偏导数存在性、可微性及偏导数的连续性.

~~二、(本题 8 分)~~ 计算第二型曲线积分 $I = \int_L \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy$, 其中 L 是

$A(-a, 0)$ 经上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (y \geq 0)$, 到点 $B(a, 0)$ 的弧段.

四、(本题 8 分) 求微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x \sin x$ 满足 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的特解.

五、(本题 8 分) 学习高等数学 I 的学生做 (1), 其余的学生做 (2)

(1) 求解微分方程组 $\frac{d\vec{x}}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \vec{x}$;

(2) 设曲线积分 $\int_{(C)} [f''(x) + 9f(x) + 2x^2 - 5x + 1] y dx$ 与路径无关, 求 $f(x)$

六、(本题 8 分) 计算曲线积分 $\int_{(C)} (y^2+z^2) dx + (x^2+z^2) dy + (x^2+y^2) dz$, 其中曲线(C) 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线, 其方向为从 oz 轴正向看进去为逆时针方向 ($z \geq 0$)

2017 年高数下期末参考答案

一.

$$1. \operatorname{grad} u \Big|_M = (8x, 2y, 2z) \Big|_M = (8, 0, 4) \quad (3 \text{ 分}) \quad \vec{c} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}} \right) \quad (4 \text{ 分})$$

$$\|\operatorname{grad} u\| = 4\sqrt{5} \quad (6 \text{ 分})$$

$$2. \text{特征方程为: } \lambda^3 - \lambda^2 + 2\lambda - 2 = 0 \quad (2 \text{ 分}) \quad (\lambda - 1)(\lambda^2 + 2) = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{故通解为: } y = C_1 e^x + C_2 \cos \sqrt{2}x + C_3 \sin \sqrt{2}x \quad (6 \text{ 分})$$

$$3. \frac{\partial u}{\partial x} = f'(t)[\varphi_1(xy, x)y + \varphi_2(xy, x)] \quad (3 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = f''(t)\varphi_1(xy, x)x[\varphi_1 y + \varphi_2] + f'(t)[\varphi_1 + y\varphi_{11} + \varphi_{21}x] \quad (6 \text{ 分})$$

$$4. \vec{\tau} = (1, -2t, 3t^2) \quad (1 \text{ 分}) \quad \vec{n} = (1, 2, 1) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\because \vec{\tau} \cdot \vec{n} = 0 \therefore 1 - 4t + 3t^2 = 0 \therefore t = 1 \text{ 或 } t = \frac{1}{3} \quad (4 \text{ 分})$$

$$t = 1 \text{ 时, 切线方程为: } \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{3} \quad (5 \text{ 分})$$

$$t = \frac{1}{3} \text{ 时, 切线方程为: } \frac{x-\frac{1}{3}}{1} = \frac{y+\frac{1}{9}}{-2} = \frac{z-\frac{1}{27}}{\frac{1}{3}} \quad (6 \text{ 分})$$

$$5. \begin{cases} f_x = 3x^2 + 6x - 9 = 0 \\ f_y = -3y^2 + 6y = 0 \end{cases} \text{驻点为: } M_1(1, 0), M_2(1, 2), M_3(-3, 0), M_4(-3, 2) \quad (3 \text{ 分})$$

$$f_{xx} = 6x + 6, f_{xy} = 0, f_{yy} = -6y + 6 \quad (4 \text{ 分}) \quad M_2, M_3 \text{ 不是极值点, 极小值 } f(M_1) = -5$$

$$\text{极大值 } f(M_4) = 31 \quad (6 \text{ 分})$$

$$6. I = \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx = \int_0^1 e^{-y^2} \frac{y^3}{3} dy = \frac{1}{6}(1 - 2e^{-1}) \quad (6 \text{ 分})$$

$$7. \text{由对称性 } \iint_D xy d\sigma = 0 \quad (2 \text{ 分}) \quad \iint_D |y| d\sigma = 4 \iint_{D_1} y d\sigma, \quad D_1 \text{ 是 } D \text{ 在第一象限的部}$$

$$\text{分} \quad (3 \text{ 分}) \quad \text{原式} = 4 \iint_{D_1} y d\sigma = 4 \int_0^1 y dy \int_0^{1-y} dx = 4 \int_0^1 y(1-y) dy = \frac{2}{3} \quad (6 \text{ 分})$$

)

$$8. I = \frac{1}{a^3} \iiint_{\Sigma} x^3 dy \lambda dz + y^3 dz \lambda dy + z^3 dx dy = \frac{3}{\varphi^3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{3}{a^3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^a r^2 \cdot r^2 \sin \theta dr = \frac{12}{5} \pi a^2 \quad (6 \text{ 分})$$

$$9. I = \int_C \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} ds = \int_C a ds = 2\pi a^2$$

$$10. \xi = \iint_{\Sigma} ds = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \delta_x^2 + \delta_y^2} dxdy = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + y^2 + x^2} dxdy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \sqrt{1 + r^2} r dr = \frac{2\pi}{3} \left[(1 + R^2)^{\frac{3}{2}} - 1 \right] \quad (6 \text{ 分})$$

二.

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2}}{x} = 0 \quad \text{同理 } f_y(0,0) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{\Delta \delta f(0,0) \Delta x - f_y(0,0) \Delta y}{\rho} = \rho \sin \frac{1}{\rho^2} \rightarrow 0 (\rho \rightarrow 0) \quad (6 \text{ 分})$$

$$f_x(x,y) = 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cdot \frac{1}{x^2 + y^2} \quad x \rightarrow 0, y \rightarrow 0 \quad \text{极限不存在} \quad (8 \text{ 分})$$

三.

$$\therefore \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial \rho}{\partial y} \quad (4 \text{ 分}) \quad \therefore \quad \text{与路径无关, 从而}$$

$$I = \frac{1}{a^2} \int (x - y) dx + (x + y) dy = \frac{1}{a^2} \int_{\pi}^l a^2 d\theta = -\pi \quad (8 \text{ 分})$$

四.

$$\text{方程特征根为 } 1+i \text{ 和 } 1-i \text{ 齐次通解为 } y = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x) \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{设 } y^* = A x e^{(1+i)x} \text{ 代入得特解为 } y = -\frac{1}{2} x e^x \cos x \text{ 由初值条件得 } C_1 = 1, C_2 = \frac{1}{2} \text{ 所求}$$

$$\text{特解为 } y = e^x \left(\cos x + \frac{1}{2} \sin x \right) - \frac{1}{2} x e^x \cos x \quad (8 \text{ 分})$$

五.

$$(1) \text{ 特征方程 } |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 2 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)^2(\lambda+1) = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{对特征值 } -1, (A+I)\vec{r} = 0 \text{ 得 } \vec{r} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{对特征值 } 2, (A-2I) = \begin{bmatrix} 3 & -3 & -3 \\ -4 & 4 & 4 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \vec{r}_0^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{r}_0^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\vec{r}_1^{(1)} = (A-2I)\vec{r}_0^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{r}_1^{(2)} = (A-2I)\vec{r}_0^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{通解为 } \vec{x}(t) = C_1 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ 1-t \end{bmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ 1-t \end{bmatrix} + C_3 e^{-t} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

(2)

$$2f''(x) = \frac{\partial \theta}{\partial \rho} = \frac{\partial \rho}{\partial y} = f''(x) + 9f(x) + 2x^2 - 5x + 1 \quad (2 \text{ 分}) \text{ 设}$$

$$y = f(x), \quad y'' - 9 = 2x^2 - 5x + 1, \lambda^2 - 9 = 0, \lambda = \pm 3 \quad \text{特解设为 } y^* = ax^2 + bx + c \quad (6$$

$$\text{分}) \text{ 代入得: } a = -\frac{2}{9}, b = \frac{5}{9}, c = -\frac{13}{81}, f(x) = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-3x} - \frac{2}{9}x^2 + \frac{5}{9}x - \frac{13}{81} \quad (8 \text{ 分})$$

六.

$$\text{球面上点 } (x, y, z) \text{ 处单位法向量为 } \vec{e}_\eta = \left(\frac{x-2}{2}, \frac{y}{2}, \frac{z}{2} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{原式} = 2 \iint_{\Sigma} (y-z) dy \wedge dz + (z-x) dz \wedge dx + (x-y) dx \wedge dy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 2 \iint_{\Sigma} \left[(y-z) \cdot \frac{x-2}{2} + (z-x) \frac{y}{2} + (x-y) \frac{z}{2} \right] ds = 2 \iint_{\Sigma} (z-y) d\xi \quad (6 \text{ 分})$$

其中上半球面位于圆柱面内且关于 xoy 面对称, 故 $\iint_{\Sigma} y ds = 0$

$$\iint_{\Sigma} z d\xi = \iint_{x^2+y^2 \leq 2x} \sqrt{1 + \frac{(2-x)^2 + y^2}{4x - x^2 - y^2}} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 2x} 2 dx dy = 2\pi, \text{ 故原式} = 4\pi \quad (8 \text{ 分})$$

南洋书院学生

2016 年高数 (下) 期末

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = x^2 + y + 1, \frac{\partial f}{\partial y} = ax + y^2 + 2$, 则 $a =$ _____。
2. 设三元函数 $f(x, y, z) = \int_0^{x+y+z} \cos(t^2) dt$, 则 $df|_{(1,0,-1)} =$ _____。
3. 设 $f(x) = \int_x^1 e^{\frac{x^2}{2}} dy$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____。
4. 函数 $z = 3x + 4y$ 在条件 $x^2 + y^2 = 1$ 下的最大值为 _____。
5. 微分方程 $xydy + (y - \sin x)dx = 0$ 满足 $y|_{x=\pi} = 1$ 的特解 $y =$ _____。

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 不可微, 则必有 ()。
- (A) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 不连续
- (B) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数不存在
- (C) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数至少有一个不连续
- (D) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 沿某个方向的方向导数不存在
2. 设函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 若 $f(x, y)$ 在 D 的边界上恒为零, 且满足等式 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + 2\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = -f(x, y)$, 则 $f(x, y)$ 在 D 上 ()。
- (A) 存在非零的最大值
- (B) 存在非零的最小值
- (C) 只在边界上取得最大值和最小值
- (D) 能在边界上取得最大值和最小值
3. 设 $I_1 = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} e^{xyz} dv, I_2 = \iiint_{|x| \leq 1, |y| \leq 1, |z| \leq 1} e^{xyz} dv, I_3 = \iiint_{|x|+|y|+|z| \leq 1} e^{xyz} dv$, 则 ()。
- (A) $I_3 < I_1 < I_2$
- (B) $I_1 < I_2 < I_3$
- (C) $I_2 < I_3 < I_1$
- (D) $I_1 < I_3 < I_2$
4. 质点在变力 $\vec{F} = \{P(x, y), 0\}$ 的作用下沿平面有向曲线 L 移动, 则该力所做的功为 ()。
- (A) 0
- (B) $\int_L P(x, y) dx$
- (C) $\int_L P(x, y) dy$
- (D) $\int_L P(x, y) ds$
5. 设 L 是曲线 $x^2 + y^2 = a^2$, 则曲线积分 $\int_L (x + y)^2 ds$ 为 ()。
- (A) a^2
- (B) a^3
- (C) $2\pi a^3$
- (D) πa^4

三、简答题 (每小题 7 分, 共 28 分)

1. 设函数 $z = f(xy, \sin y)$, 其中 f 具有二阶连续的偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

2. 求曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 12 \\ z = x \end{cases}$ 在点 $(1, \sqrt{3}, 1)$ 处的切线与法平面方程

3. 求 $\iint_D \frac{x \cos y}{y} dx dy$ ，其中 D 是由曲线 $y = x^2 (x \geq 0)$ 和直线 $x = 0, y = 4$ 围成的平面区域

4. 求 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dv$, 其中 Ω 是由曲面 $z^2 = x^2 + y^2, z=1$ 与 $z=2$ 所围的区域

四、(10 分) 求函数 $f(x, y) = 2x^2 - 3xy + 2y^2 - x + 2y$ 的极值

五、(10 分) 计算曲线积分 $\int_L (y + \frac{e^y}{x})dx + e^y \ln x dy$ ，其中 L 为平面曲线 $x = 1 + \sqrt{2y - y^2}$ 上从点 $(1,0)$ 到点 $(2,1)$ 的一段有向弧段

六、(8 分) 学习高等数学 I 的同学做(1), 学习高等数学 II 的同学做(2)

(1) 求解微分方程组 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的通解，其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(2) 求方程 $y'' + 2y' + y = 2xe^{-x}$ 的通解

七、(8 分) 设三元函数 P, Q, R 在单连通区域 Ω 内有一阶连续偏导数, Γ 是 Ω 内的简单曲线

1. 写出曲线积分 $I = \int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$ 与路径无关的一个充分条件;
2. 计算积分 $I = \int_{\Gamma} (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$, 其中 $\Gamma: x = a \cos t, y = a \sin t, z = t$ 上从点 $(a, 0, 0)$ 到点 $(-a, 0, \pi)$ 的一段.

参考答案

一、1. 1 2. $df|_{(1,0,-1)} = dx + dy + dz$ 3. $\sqrt{e} - 1$ 4. 5 5. $y = \frac{\pi - 1 - \cos x}{x}$

二、(C)(D)(A)(B)(C)

三、1. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = y f_1'(xy, \sin y)$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_1'(xy, \sin y) + y [x f_{11}''(xy, \sin y) + \cos y \cdot f_{12}''(xy, \sin y)]$$

2. 解: 曲线在点 $(1, \sqrt{3}, 1)$ 处的切线的方向矢量为 $\{1, -\sqrt{3}, 1\}$,

切线方程 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-\sqrt{3}}{-\sqrt{3}} = \frac{z-1}{1}$, 法平面方程 $x - \sqrt{3}y + z + 1 = 0$

3. 解: 设 Ω_1, Ω_2 是曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 分别和平面 $z=1, z=2$ 所围的立体,

$$\iiint_{\Omega_1} \sqrt{x^2 + y^2} dv = \iint_{\substack{r \in [0,1] \\ \theta \in [0,2\pi]}} r dr d\theta \int_r^1 r dz = \iint r^2 (1-r) dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r^2 - r^3) dr = \frac{1}{6} \pi$$

$$\iiint_{\Omega_2} \sqrt{x^2 + y^2} dv = \iint_{\substack{r \in [0,2] \\ \theta \in [0,2\pi]}} r dr d\theta \int_r^2 r dz = \iint r^2 (2-r) dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (2r^2 - r^3) dr = \frac{8}{3} \pi$$

$$\therefore \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dv = \iiint_{\Omega_2} \sqrt{x^2 + y^2} dv - \iiint_{\Omega_1} \sqrt{x^2 + y^2} dv = \frac{5}{2} \pi$$

四、解: 先求驻点 $\begin{cases} f_x(x, y) = 4x - 3y - 1 = 0 \\ f_y(x, y) = -3x + 4y + 2 = 0 \end{cases}$ 解得 $x = -\frac{2}{7}, y = -\frac{5}{7}$

再计算在点 $(-\frac{2}{7}, -\frac{5}{7})$ 处的二阶导数: $A = f_{xx} = 4, B = f_{xy} = -3, C = f_{yy} = 4,$

由于 $AC - B^2 > 0, A > 0$, 所以函数在点 $(-\frac{2}{7}, -\frac{5}{7})$ 处取得极小值 $-\frac{4}{7}$

五、解: 记 L_1 为从点 $(2, 1)$ 到点 $(1, 1)$ 的有向线段, L_2 为从点 $(1, 1)$ 到点 $(1, 0)$ 的有向线段, 则利用格林公式可得

$$\oint_{L_1+L_2} (y + \frac{e^y}{x}) dx + e^y \ln x dy = \iint_D (\frac{e^y}{x} - 1 - \frac{e^y}{x}) dx dy = -\frac{1}{4} \pi, \text{ 又}$$

$$\int_{L_1} (y + \frac{e^y}{x}) dx + e^y \ln x dy = \int_2^1 (1 + \frac{e}{x}) dx = -1 - e \ln 2, \int_{L_2} (y + \frac{e^y}{x}) dx + e^y \ln x dy = \int_1^0 0 dx = 0$$

$$\text{故} \int_L (y + \frac{e^y}{x}) dx + e^y \ln x dy = -\frac{\pi}{4} + 1 + e \ln 2$$

六、(1) $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2$

$$(2I - A)x = 0, \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \quad x_1 = x_2 \quad \vec{r}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(-I - A)x = 0, x_1 + x_2 + x_3 = 0 \quad \vec{r}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{r}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}(t) = C_1 \vec{r}_1 e^{2t} + C_2 \vec{r}_2 e^{-t} + C_3 \vec{r}_3 e^{-t}$$

(2) 解: 对应齐次方程 $y'' + 2y' + y = 0$ 的通解为 $C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}$

设非齐次方程的一个特解为 $y^* = x^2 e^{-x}(ax + b)$, 代入验证解得 $a = \frac{1}{3}, b = 0$

所以通解为 $C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + \frac{1}{3} x^3 e^{-x}$

七、解: 1. $I = \int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$ 与路径无关的充分条件是以下三个条件之一:

(a) 任何封闭曲线 C 上的积分 $\oint_C Pdx + Qdy + Rdz \equiv 0$

(b) 存在三元函数 $u(x, y, z)$, 使得 $du = Pdx + Qdy + Rdz$

(c) $\text{rot } \vec{A} = \vec{0}$, 其中 $\vec{A} = \{P, Q, R\}$

2. 积分 $I = \int_{\Gamma} (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$ 与路径无关, 故

$$I = \int_{(a,0,0)}^{(-a,0,\pi)} (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz = \int_{(a,0,0)}^{(-a,0,\pi)} d(xy + yz + zx) = (xy + yz + zx) \Big|_{(a,0,0)}^{(-a,0,\pi)} = -\pi a$$

八、解: $\frac{\partial P}{\partial x} = (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} - 3x^2(x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2} \quad \therefore \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$

$$\begin{aligned} I &= \left(\iint_{\Sigma_{\text{上}}} + \iint_{\Sigma_{\text{下}}} + \iint_{\Sigma_{z=0\text{下}}} \right) + \iint_{\Sigma_{\text{上}}} + \iint_{\Sigma_{z=0\text{上}}} = \iiint_{\Omega} 0 dv + \frac{1}{\varepsilon^3} \iint_{\Sigma_{\text{上}}} x dy dz + y dz dx + z dx dy + 0 \\ &= 0 + \frac{1}{\varepsilon^3} \left(\iiint_{\Omega} 3 dv + 0 \right) = \frac{3}{\varepsilon^3} \cdot \frac{2}{3} \pi \varepsilon^3 = 2\pi \end{aligned}$$

2015 年高数下期末试题

一、 选择题

1. 设 $f(x, y) = \frac{2x^2}{x^2 + y^2}$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的二重极限 ()
- (A) 等于 0 (B) 等于 1 (C) 等于 2 (D) 不存在
2. 设曲面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$, 取上侧, S_1 为 S 位于第一卦限部分, 则有 ()
- (A) $\iint_S x dS = 4 \iint_{S_1} x dS$ (B) $\iint_S y dS = 4 \iint_{S_1} y dS$
- (C) $\iint_S x dy dz = 4 \iint_{S_1} x dy dz$ (D) $\iint_S y dy dz = 4 \iint_{S_1} y dy dz$
3. 设曲线 $C: x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向, 则 $\int_C (y + \frac{y^3}{6}) dx + (2x - \frac{x^3}{3}) dy =$ ()
- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{3\pi}{8}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{5\pi}{8}$
4. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点沿方向 $l = (1, \sqrt{3})$ 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(0,0)} =$ ()
- (A) 0 (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{3\sqrt{3}}{8}$ (D) 3

二、 填空题

5. 设 $f(x, y) = x^2 y - \sin(x^2 - y^2)$, 则 $\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(1,1)} =$
6. 空间曲线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$ 在点 $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{7}{4})$ 处的切线与 Ox 的夹角 $\alpha =$
7. 二次积分 $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y} dy =$

8. 设空间曲线 C 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = \frac{3R}{2} \end{cases}$ ，其中常数 $R > 0$ ，则 $\int_C y ds =$

三、

9. 设函数 $f(u, v)$ 具有一阶连续偏导数， $z = \int_0^{xy} f(e^t, t) dt$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

10. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^z - 2x + yz = e$ 在 $(0, 0, 1)$ 点的某邻域内确定的隐函数，求全微分 $dz|_{(0,0)}$

四、求解下列微分方程

11. 学工科分析者 (1)，其余作 (2)

(1) 求解微分方程组：
$$\frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & - \end{pmatrix} x$$

(2) 求一个以四个函数 $y_1 = e^x$, $y_2 = 2xe^x$, $y_3 = \cos 2x$, $y_4 = 3\sin 2x$ 为特解的齐次线性微分方程，并求该方程的通解。

12. 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 2xe^{2x}$ 的通解

13. $I = \iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

14.

Σ 是旋转抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$, 取上侧, 计算第二类曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dy dz + 3(z^2 - 1) dx dy$

15. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有连续的导数, L 是由点 $A(3, \frac{2}{3})$ 到点 $B(1, 2)$ 的直线段,

求 $\int_L \left[\frac{x}{y^2} - xf(xy) \right] dy - \left[\frac{1}{y} + yf(xy) \right] dx$

六、应用题

16. 在曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 位于第一卦限部分上求一点 P , 使得 P 点的切平面与三个坐标面围成的四面体的体积最小, 并求此最小体积

七、证明题

17. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

证明: 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微

18. 设函数 $f(x, y)$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有二阶连续的偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)}$

证明: $I = \iint_D (x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}) dx dy = \frac{P}{2e}$

2015 年高等数学期末考试参考答案

一、选择题 (每小题 3 分, 共 12 分)

(1)D (2)C (3)D (4)B

二、填空题 (每小题 3 分, 共 12 分)

(5) 1 (6) $\frac{\pi}{3}$ (7) $1-\cos 1$ (8) $\frac{\pi R^2}{2}$

三 (每小题 7 分, 共 14 分)

9. 解 根据变上限积分求导法则及链式法则有: $\frac{\partial z}{\partial x} = yf(e^{xy} + xy)$, (4 分)

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f(e^{xy}, xy) + xy[f_u(e^{xy}, xy) + f_v(e^{xy}, xy)]. \quad (7 \text{ 分})$$

10. 解 方程两端取全微分得:

$$e^z dz - 2dx + ydz = 0 \text{ 即 } (e^z + y)dz - 2dx + zdy = 0. \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{令 } x=0, y=0, \text{ 由 } z=z(0,0)=1 \text{ 得到 } dz|_{(0,0)} = \frac{2dx-dy}{e}. \quad (7 \text{ 分})$$

四、求解下列微分方程 (每小题 7 分, 共 14 分)

$$11. (1) |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 \\ -2 & \lambda-1 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2(\lambda+1) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\lambda = -1: r_1 = (-3, 4, 2)^T, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 2: (A - 2E)^2 = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -3 \\ -4 & 4 & 4 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$r_0^{(1)} = (1, 1, 0)^T \quad r_0^{(2)} = (1, 0, 1)^T \quad (5 \text{ 分})$$

$$x_2 = e^{2t}[r_0^{(1)} + tr_0^{(1)}] = e^{2t}(1, 1+t, -t)^T; \quad x_3 = e^{2t}[r_0^{(2)} + tr_1^{(2)}] = e^{2t}(1, t, 1-t)^T$$

$$x = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1+t \\ -t \end{pmatrix} + C_3 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ 1-t \end{pmatrix} \quad (7 \text{ 分})$$

$$(2) (\lambda-1)^2(\lambda^2+4)=0 \quad \lambda^4-2\lambda^3+5\lambda^2-8\lambda+4=0$$

$$y^{(4)} - 2y^{(3)} + 5y'' - 8y' + 4y = 0$$

$$y = e^x [C_1 + C_2 x] + C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x$$

12. 解 由特征方程 $r^2 - 5r + 6 = 0$ 得特征根 $r_1 = 2, r_2 = 3$ (2 分)

从而原方程对应的齐次方程的通解 $Y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$ (4 分).

设 $y^* = x(ax + b)e^{2x}$ 是原方程的特解, 代入方程得 $-2ax + 2a - b = 2x$, 对比系数得

$$a = -1, b = -2$$

故 $y^* = -x(x + 2)e^{2x}$. (6 分) 从而原方程的通解 $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} - x(x + 2)e^{2x}$

(7 分)

五、计算下列积分 (每小题 9 分, 共 27 分)

13. 解 记 D_1 为 D 位于第一象限部分的闭区域, 根据对称性有

$$I = 2 \iint_{D_1} \sqrt{|y - x^2|} dx dy$$

$$\text{于是 } I = 2 \int_0^1 dx \int_0^1 \sqrt{|y - x^2|} dy = 2 \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \sqrt{x^2 - y} dy + 2 \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 \sqrt{y - x^2} dy$$

(4 分)

$$= \frac{4}{3} \int_0^1 x^3 dx + \frac{4}{3} \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx \quad (8 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{\pi}{4} \quad (9 \text{ 分})$$

14. 解一 添加平面 $\Sigma_0: z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 1)$, 取下侧, 其与 Σ 围成空间

有界闭区域 Ω , 由 Gauss 公式有

$$I = \left(\iint_{\Sigma \cup \Sigma_0} - \iint_{\Sigma_0} \right) 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy$$

$$= 6 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dx dy dz - \iint_{\Sigma_0} 3(z^2 - 1) dx dy$$

$$= 6 \int_0^1 dz \iint_{x^2 + y^2 \leq 1-z} (x^2 + y^2 + z) dx dy + 3 \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (0^2 - 1) dx dy$$

$$= 12\pi \int_0^1 dz \int_0^{\sqrt{1-z}} r^2 \cdot r dr + 6\pi \int_0^1 z(1-z) dz - 3\pi$$

$$= 3\pi \int_0^1 (1-z)^2 dz + \pi - 3\pi = -\pi$$

(9 分)

解二 由于 $z_x = -2x$, $z_y = -2y$ 故根据合一投影法得

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (2x^3 \cdot (2x) + 2y^3 \cdot (2y) + 3[(1-x^2-y^2)^2 - 1]) dx dy$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 4((x^4 + y^4) + 3[(x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 + y^2)]) dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 [4r^4(\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) + 3(r^4 - 2r^2)] r dr$$

$$= 4 \int_0^{2\pi} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta \int_0^1 r^5 dr + 6\pi \int_0^1 (r^5 - 2r^2) dr$$

$$= \frac{2}{3} \int_0^{2\pi} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta - 2\pi = -\pi$$

$$15. \quad \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{x}{y^2} - xf(xy) \right] = \frac{1}{y^2} - f(xy) - xyf'(xy) = \frac{\partial}{\partial y} \left[-\frac{1}{y} + yf(xy) \right]$$

$$\text{原式} = \int_{(3, \frac{2}{3})}^{(1, 2)} \left[\frac{x}{y^2} - xf(xy) \right] dy + \left[-\frac{1}{y} + yf(xy) \right] dx$$

$$= -\left[\frac{x}{y} + F(xy) \right]_{(3, \frac{2}{3})}^{(1, 2)} = 4$$

六、应用题 (本题共 9 分)

16. 解 设 $P(x, y, z)$ 其中 $x > 0, y > 0, z > 0$ 则曲面在 P 点的切平面方程为:

$$2xX + 2yY + Z = 8 - z \text{ 即 } \frac{X}{\frac{8-z}{2x}} + \frac{Y}{\frac{8-z}{2y}} + \frac{Z}{8-z} = 1$$

此切平面与坐标面所围成的四面体的体积 $V = \frac{(8-z)^3}{24xy}$ 令

$$L(x, y, z, \lambda) = 3\ln(8-z) - \ln x - \ln y + \lambda(x^2 + y^2 + z - 4)$$

由

得唯一驻点 $(1, 1, 2)$ 因为最小体积必存在, 故点 $P(1, 1, 2)$ 为所求, 此时 $V_{\min} = 9$

七、证明题 (每小题 6 分, 共 12 分)

17 证 由于 $f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0$ 类似有 $f_y(0,0) = 0$. (3 分)

记 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, 因为

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\Delta f = [f_x(0,0)\Delta x + f_y(0,0)\Delta y]}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(\Delta x + \Delta y) - f(0,0)}{\rho}$$

(5 分)

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x \Delta y|}{(\Delta x^2 + \Delta y^2)^{3/2}} \sin(\Delta x^2 + \Delta y^2) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x \Delta y|}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0$$

所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微, 且 $df|_{(0,0)} = 0$

18. 解 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 记 $L: x^2 + y^2 = r^2$, 取逆时针方向, 其围

成的有界闭区域为 D_r , 则据 Green 公式有 (3 分)

$$I = \int r dr \int (r \cos \theta f_x + r \sin \theta f_y) d\theta = \int r \left[\oint_L -f_y dx + f_x dy \right] dr$$

$$= \int_0^1 r \left[\iint_{D_r} (f_{xx} + f_{yy}) dxdy \right] dr = \int_0^1 \left[\iint_{D_r} e^{-(x^2+y^2)} dxdy \right] dr$$

$$\int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r e^{-\rho^2} \rho d\rho \right) r dr = \int_0^1 \pi (1 - e^{-r^2}) r dr = \frac{\pi}{2e}$$

2014 年高数 (下) 期末 (A)

整理人: 蒋晶

一. 计算下列各题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. 在曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 上求一点, 使曲面在该点处的切平面平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 。
2. 设 f 是连续函数, 交换积分次序: $\int_{-6}^2 dx \int_{\frac{1}{4}x^2-1}^{2-x} f(x, y) dy$ 。
3. 求微分方程 $\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = e^{-2t}$ 的通解。
4. 已知曲线 $L: y = x^2$ ($0 \leq x \leq 1$) 上任意一点处的线密度在数值上与该点的横坐标相同, 求曲线的质量。
5. 学习工科分析者作 (1), 其余作 (2)
 - (1) 验证微分方程组 $\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 t & \frac{1}{2} \sin 2t - 1 \\ \frac{1}{2} \sin 2t & \sin^2 t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 的通解为 $\vec{x} = c_1 \begin{pmatrix} e^t \cos t \\ e^t \sin t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}, t \in R$ 。
 - (2) 验证 $y_1 = e^x, y_2 = e^x \ln|x|$ 是微分方程 $x\ddot{y} - (2x-1)\dot{y} + (x-1)y = 0$ 的解, 并求其通解。
6. 计算三重积分 $\iiint_V z dv$, 其中 V 是由不等式 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 确定的空间区域。
7. 求向量场 $\vec{A} = \{z+x, x, z^2+3y\}$ 穿过曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 下侧的通量。
8. 计算第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 + y^2 dS$, 其中 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 介于 $0 \leq z \leq 1$ 之间的部分。
9. 计算第二型线积分 $\int_L ye^{y^2} dx + (xe^{y^2} + 2xy^2 e^{y^2}) dy$, 其中 L 为 $y = \sqrt[3]{x}$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $A(1, 1)$ 的曲线段。
10. 求 $\text{div}[\text{grad}(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})]$

二. (8 分) 学习工科分析者作 (1), 其余作 (2)

- (1) 求线性微分方程组 $\frac{d\vec{x}}{dt} = A\vec{x}$ 其中 $A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 4 & -7 & 4 \\ -1 & 4 & 8 \end{pmatrix}$
- (2) 已知函数 $y = e^{2x} + (x+1)e^x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $\ddot{y} + a\dot{y} +$

$by = ce^x$ 的一个特解，使确定常数 a, b, c ，并求该方程的通解。

三. (8分) 设 $y = f(x, t)$ ，而 t 是由方程 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的 x, y 的函数，其中 f, F 都具有二阶连续偏导数，求 $\frac{dy}{dx}$ 。

四. (8分) 计算 $\iint_{(D)} x[1 + y\sin^2(x^2 + y^2)]d\sigma$ ，其中 (D) 是由 $y = x^3, y = 1, x = -1$ 所围成的区域。

五. (8分) 设函数 $\varphi(y), \Psi(y)$ 具有连续导数，对平面内的任意分段光滑简单闭曲线 C ，有曲线积分 $\oint_C 2[x\varphi(y) + \Psi(y)]dx + [x^2\Psi(y) + 2xy^2 + 2x\varphi(y)]dy = 0$

(1) 求满足条件 $\varphi(0) = -2, \Psi(0) = 0$ 的函数 $\varphi(y), \Psi(y)$ ；

(2) 计算 $\int_{(1,1)}^{(0,0)} 2[x\varphi(y) + \Psi(y)]dx + [x^2\Psi(y) + 2xy^2 + 2x\varphi(y)]dy$

六. (8分) 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$,

(1) 计算 $A = \iint_D |xy - 1|dxdy$ ；

(2) 设 $f(x, y)$ 在 D 上连续，且 $\iint_D f(x, y)dxdy = 0, \iint_D xyf(x, y)dxdy = 1$ ，证明存在 $(\xi, \eta) \in D$ ，使 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{4}$ 。

2014 高数（下）期末

一、

$$1、\text{解： } f_x(x, y) = \frac{1}{1+x^{\frac{2}{y}}} \cdot x^{\frac{1}{y}} \cdot \left(\frac{1}{xy}\right)$$

$$\therefore f_x(x_{11}) = \frac{x}{1+x^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$2、\text{解： } dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

$$= \left[e^x \ln |\sin(x-2y)| + \frac{\cos(x-2y)}{\sin(x-2y)} \cdot e^x \right] dx + e^x \cdot \frac{-2\cos(x-2y)}{\sin(x-2y)} dy$$

$$\therefore dz \Big|_{\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)} = 0$$

$$3、\text{解： } \text{grad}(\dot{u}) = (2y, 2x, -2z)$$

$$\therefore \text{grad}(u) \Big|_{(2, -1, 1)} = (-2, 4, -2)$$

$$\text{故方向导数最大值} = 2\sqrt{6}$$

$$4、\text{解： 法向量： } (2x, 4y, 2z)$$

$$\text{在点 } \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \text{ 时， } \vec{n} = (1, 2, 1)$$

$$\text{故 平面： } (x-1) + 2(y-2) + z-1 = 0$$

$$\text{切线： } \frac{x-\frac{1}{2}}{1} = \frac{y-\frac{1}{2}}{2} = \frac{z-\frac{1}{2}}{1}$$

$$5、\text{解： 切向量： } (1, 6t, 3t^2)$$

$$\text{令 } t=0 \Rightarrow (1, 6, 3)$$

$$\text{故切线: } \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{6} = \frac{z-1}{3}$$

$$\text{法平面: } (x-1) + 6(y-3) + 3(z-1) = 0$$

$$6、\text{解: } F_1 \cdot \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{z^2} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \right) = 0 \Rightarrow x \frac{\partial z}{\partial x} = z$$

$$F_2 \cdot \left(\frac{1}{z} - \frac{y}{z^2} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0 \Rightarrow y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = z$$

$$\text{原式} = 2z$$

$$7、\text{解: } \begin{cases} f_x = 3x^2 + 3y = 0 \\ f_y = 3y^2 + 3x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \end{cases}$$

$$\text{又 } f_{xx} = 6x \quad f_{yy} = 6y \quad f_{xy} = 3$$

在点(0,0)处, 有

$$\text{海森矩阵 } H_1 = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = -9 < 0, \text{ 故不是极值}$$

$$\text{在点}(-1,-1)\text{处, } H_2 = \begin{bmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix} = 27 > 0, \text{ 故为极大值}$$

$$\therefore f_{\text{极大}} = 1$$

$$8、\text{解: 原积分} = \int_{-1}^0 dy \cdot \int_{-1}^1 f(x, y) dy + \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} f(x, y) dy$$

$$9、\text{解: 原积分} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^a r \cdot \sin r dr$$

$$= \pi \cdot \left[x \left(\frac{\sin x - \cos x}{2} \right) \right]_0^a$$

$$= \frac{\pi a}{2} \cdot \frac{\sin a - \cos a}{2}$$

$$10、\text{解: } \frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{l}} = \begin{bmatrix} \cos y, -x \sin y, 0 \\ y \left[e^x (\sin xz + z \cos x) \right], e^x \sin xz, xye^x \cos xz \end{bmatrix}$$

二、解: $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xyf_1 - y^2 f_2 \frac{1}{x^2} + g(x^2 + y^2) + x \cdot g' \cdot 2x$

$$= 2xyf_1 - \frac{y^2}{x^2} f_2 + g(x^2 + y^2) + 2x^2 g'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2xf_1 + 2xy \left(f_{11} \cdot x^2 + f_{12} \cdot \frac{2y}{x} \right) - \frac{y^2}{x^2} \left(f_{21} \cdot x^2 + f_{22} \frac{2y}{x} \right) - \frac{2y}{x^2} \cdot f_2 + 2yg' + 2x^2 g'' \cdot 2y$$

$$= 2xf_1 + 2x^3 f_{11} + 4y^2 f_{12} - y^2 f_{21} - \frac{2y^3}{x^3} f_{22} - \frac{2y}{x^2} f_2 + 2yg' + 4x^2 yg''$$

三、解: $f_x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0$$

同理, $f_y = 0$, 故偏导存在
但

$$f_x(x, y) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} (0) \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_x(x, y)$ 不存在, 故 $f_x(x, y)$ 不连续。

同理, $f_y(x, y)$ 也不连续,

但 $\lim_{\delta x^2 + \delta y^2 \rightarrow 0} \frac{f(\delta x, \delta y) - f(0, 0) - f_x \delta x - f_y \delta y}{\sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}}$

$$= \lim_{\delta x^2 + \delta y^2 \rightarrow 0} \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2} \cdot \sin \frac{1}{\delta x^2 + \delta y^2} = 0$$

即可微, 证毕

四、解: \because 投影为长方形, 欲使体积最大, 则有一底面必在 xOy 平面上。

又其是六面体, 使底面一顶点在原点即可。

设 $P(m, n)$ 为 xoy 上 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 上一动点

则 六面体体积

$$\begin{aligned}
 v &= \int_0^m dx \int_0^n dy \int_0^{c(1-\frac{x}{a}-\frac{y}{b})} dz \\
 &= \int_0^m dx \int_0^n cdz - cn \cdot \int_0^m \frac{x}{a} dx - cm \cdot \int_0^n \frac{y}{b} dy \\
 &= mnc - \frac{nc}{2} \cdot \frac{m^2}{a} - \frac{mc}{2} \cdot \frac{n^2}{b} \\
 &= mnc \left[1 - \frac{m}{2a} - \frac{n}{2b} \right] \\
 &= mnc \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{m}{a} + \frac{n}{b} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} mnc = \frac{abc}{2} \frac{m}{a} \frac{n}{b} \leq \frac{abc}{2} \cdot \left(\frac{\frac{m}{a} + \frac{n}{b}}{2} \right)^2 = abc
 \end{aligned}$$

当仅当 $\frac{m}{a} = \frac{n}{b} = \frac{1}{2}$

即 $m = \frac{a}{2}, n = \frac{b}{2}$ 成立, $v_{\max} = \frac{abc}{8}$

五、证: $\because F(x, y) = s(\sqrt{x^2 + y^2})$

不妨设 $F(x, y) = h(x^2 + y^2)$

有 $h(x^2 + y^2) = f(x)g(y)$

$$\therefore \frac{\partial h}{\partial x} = f'(x)g(y) = h'[x^2 + y^2] \cdot 2x$$

$$\frac{\partial h}{\partial y} = f(x)g'(y) = h'(x^2 + y^2) \cdot 2y$$

$$\text{则, } \frac{f'(x)}{f(x)} \cdot \frac{g(y)}{g'(y)} = \frac{x}{y}$$

$$\text{即 } \frac{f'(x)}{xf(x)} = \frac{g'(y)}{yg(y)}, \quad \varphi(x) \equiv \varphi(y)$$

$$\text{当仅当 } \varphi(x) \equiv \varphi(y) = c \quad \boxed{6}$$

$$\therefore f'(x) = cxf(x)$$

$$\text{即 } e^{-\frac{1}{2}cx^2} \cdot f'(x) - \left(x \cdot e^{-\frac{1}{2}cx^2} f(x) \right)' = 0, \quad \left[e^{-\frac{1}{2}cx^2} \cdot f(x) \right]' = 0$$

$$\therefore e^{-\frac{1}{2}cx^2} \cdot f(x) \equiv c$$

$$\text{即 } f(x) = c \cdot e^{\frac{1}{2}cx^2}$$

$$\text{同理 } g(y) = c_2 e^{\frac{1}{2}cy^2}$$

$$\therefore h(x^2 + y^2) = c_1 c_2 e^{\frac{c}{2}(x^2 + y^2)} = \bar{c} \cdot e^{c(x^2 + y^2)}$$



更多精彩，尽在南洋书院学生会微信公众
号的南卷汇专栏，欢迎通过公众号提供题目或
反馈错题信息，南卷汇需要您的支持。