



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第五章 线性空间与欧氏空间

第二节：欧氏空间的基本概念

董荣
数学与统计学院



作业:
习题5.2

(A) 3, 5, 7(2), 8, 12, 14, 17

(B) 1



第二节：欧氏空间

1. 内积及其基本性质
2. 范数和夹角
3. 标准正交基及其基本性质
4. Gram-Schmidt正交化方法



定义5.2.1 (内积和欧氏空间) 设 V 是一个实线性空间, 如果对于 V 中任意两个向量 α, β 都指定了一个实数与之对应, 这个实数记为 $\langle \alpha, \beta \rangle$, 并且满足以下条件

(1) 对称性: $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$

(2) 可加性: $\langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle$

(3) 齐次性: $\langle k\alpha, \beta \rangle = k\langle \alpha, \beta \rangle$

(4) 非负性: $\langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0$, 而且 $\langle \alpha, \alpha \rangle = 0 \iff \alpha = 0$

内积公理

其中, α, β, γ 是 V 中任意向量, k 是任意实数, 则称实数 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 为 α, β 的内积, 称定义了内积的实线性空间 V 为实内积空间或欧几里得空间, 简称为欧氏空间。



内积公理

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{ 对称性: } \langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle \\ (2) \text{ 可加性: } \langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle \\ (3) \text{ 齐次性: } \langle k\alpha, \beta \rangle = k\langle \alpha, \beta \rangle \\ (4) \text{ 非负性: } \langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0, \text{ 而且 } \langle \alpha, \alpha \rangle = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0 \end{array} \right.$$

例1: 在线性空间 R^n 中, 对于向量

$$\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T, \beta = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$$

如果规定

$$\langle \alpha, \beta \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = \alpha^T \beta$$

验证它是 R^n 的一个内积. R^n 按此内积, 便构成一个欧氏空间.

R^n 的标准内积

证明思路:

$$(1) \langle \beta, \alpha \rangle = \beta^T \alpha = (\beta^T \alpha)^T = \alpha^T \beta = \langle \alpha, \beta \rangle$$

余下3条利用转置和平方和的性质可验证成立



内积公理

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{ 对称性: } \langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle \\ (2) \text{ 可加性: } \langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle \\ (3) \text{ 齐次性: } \langle k\alpha, \beta \rangle = k\langle \alpha, \beta \rangle \\ (4) \text{ 非负性: } \langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0, \text{ 而且 } \langle \alpha, \alpha \rangle = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0 \end{array} \right.$$

例2: 在线性空间 $R^{n \times n}$ 中, 对于矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}, B = (b_{ij})_{n \times n}$

如果规定 $\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij} \longrightarrow R^{n \times n}$ 的标准内积

则可验证它满足内积公理, $R^{n \times n}$ 按此内积构成一个欧氏空间.

例3: $C[a, b]$ 按照

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx, \quad \forall f(x), g(x) \in C[a, b]$$

构成欧氏空间.

$\longrightarrow C[a, b]$ 的标准内积





注：1. 同一线性空间中，可以定义不同的内积，从而构成不同的欧氏空间。

例：在线性空间 R^n 中，对于向量 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, \dots, b_n)^T$ ，可以定义如下内积

$$\langle \alpha, \beta \rangle = w_1 a_1 b_1 + w_2 a_2 b_2 + \dots + w_n a_n b_n$$

其中 w_1, \dots, w_n 是 n 个正常数。

例：在线性空间 $C[a, b]$ 中，对于 $f_1, f_2 \in C[a, b]$ ，可以定义如下内积

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \int_a^b f_1(x) f_2(x) p(x) dx$$

其中 $p(x) > 0$ 是大于零的连续函数

注：2. 讲欧氏空间，一定是指欧氏空间 V 连同定义在 V 上的某个内积。





内积公理

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{ 对称性: } \langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle \\ (2) \text{ 可加性: } \langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle \\ (3) \text{ 齐次性: } \langle k\alpha, \beta \rangle = k\langle \alpha, \beta \rangle \\ (4) \text{ 非负性: } \langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0, \text{ 而且 } \langle \alpha, \alpha \rangle = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0 \end{array} \right.$$

由性质 (1) (2) (3) 我们可以知道下面的性质:

$$\langle k\alpha + \ell\beta, \gamma \rangle = k\langle \alpha, \gamma \rangle + \ell\langle \beta, \gamma \rangle$$

$$\langle \gamma, k\alpha + \ell\beta \rangle = k\langle \gamma, \alpha \rangle + \ell\langle \gamma, \beta \rangle$$

若 α_i, β_j 是欧氏空间 V 中的任意向量, k_i, ℓ_j 是任意实数 ($i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n$), 则有

$$\left\langle \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i, \sum_{j=1}^n \ell_j \beta_j \right\rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n k_i \ell_j \langle \alpha_i, \beta_j \rangle$$

$$= [k_1 \quad \cdots \quad k_m] \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell_1 \\ \vdots \\ \ell_n \end{bmatrix}$$

其中的实数 $c_{ij} = \langle \alpha_i, \beta_j \rangle (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n)$.





定理5.2.1 (柯西-施瓦茨不等式) 设 V 是一个欧氏空间.则 $\forall \alpha, \beta \in V$, 成立

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle} \sqrt{\langle \beta, \beta \rangle}$$

其中等号成立的充要条件是 α 与 β 线性相关

证: 如果 α, β 线性无关, 则 $\forall t \in R$, 有: $t\alpha + \beta \neq 0$. 由内积公理(4), 有

$$\langle t\alpha + \beta, t\alpha + \beta \rangle > 0$$

即
$$\langle \alpha, \alpha \rangle t^2 + 2\langle \alpha, \beta \rangle t + \langle \beta, \beta \rangle > 0$$

故有
$$\Delta = 4\langle \alpha, \beta \rangle^2 - 4\langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle < 0$$

即
$$|\langle \alpha, \beta \rangle| < \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle} \sqrt{\langle \beta, \beta \rangle}$$

若 α, β 线性相关, 不妨设有 $\alpha = k\beta$ (k 为实常数), 则有

$$\begin{aligned} |\langle \alpha, \beta \rangle| &= |\langle k\beta, \beta \rangle| = |k\langle \beta, \beta \rangle| = \sqrt{k^2 \langle \beta, \beta \rangle} \sqrt{\langle \beta, \beta \rangle} = \sqrt{\langle k\beta, k\beta \rangle} \sqrt{\langle \beta, \beta \rangle} \\ &= \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle} \sqrt{\langle \beta, \beta \rangle} \end{aligned}$$





定理5.2.1 (柯西 – 施瓦茨不等式) 设 V 是一个欧氏空间.则 $\forall \alpha, \beta \in V$, 成立

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle} \sqrt{\langle \beta, \beta \rangle}$$

其中等号成立的充要条件是 α 与 β 线性相关

• 对于 R^n 来说, 设 $\alpha = [a_1, \dots, a_n]^T, \beta = [b_1, \dots, b_n]^T$

柯西不等式就是

$$|a_1 b_1 + \dots + a_n b_n| \leq \sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2} \sqrt{b_1^2 + \dots + b_n^2}$$

• 对于 $C[a, b]$ 来说, 柯西不等式就是

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \left[\int_a^b f^2(x)dx \right]^{\frac{1}{2}} \left[\int_a^b g^2(x)dx \right]^{\frac{1}{2}}$$





第二节：欧氏空间

1. 内积及其基本性质
2. 范数和夹角
3. 标准正交基及其基本性质
4. Gram-Schmidt正交化方法



在几何空间中，向量 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$ 的长度为

$$\|\alpha\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$$

定义5.2.2（向量的范数） 在欧氏空间 V 中，称非负实数 $\sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$ 为向量的范数（或长度），记为 $\|\alpha\|$ ，即

$$\|\alpha\| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$$

注：按范数的定义，Cauchy-Schwarz不等式可写为

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$$

范数的基本性质：

$$(1) \|\alpha\| \geq 0, \text{ 且 } \|\alpha\| = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$$

$$(2) \|k\alpha\| = |k| \|\alpha\| \quad (k \in R)$$

$$(3) \|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$$





范数的基本性质: (1) $\|\alpha\| \geq 0$, 且 $\|\alpha\| = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$; (2) $\|k\alpha\| = |k|\|\alpha\|$ ($k \in R$)

$$(3) \|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$$

证: (3) $\|\alpha + \beta\|^2 = \langle \alpha + \beta, \alpha + \beta \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle + 2\langle \alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \beta \rangle$

$$\leq \|\alpha\|^2 + 2|\langle \alpha, \beta \rangle| + \|\beta\|^2$$
$$\leq \|\alpha\|^2 + 2\|\alpha\|\|\beta\| + \|\beta\|^2 = (\|\alpha\| + \|\beta\|)^2 \quad \text{两边开方, 得性质 (3)}$$

零向量: 范数为零的向量

单位向量: 范数为1的向量

非零向量单位化: $\alpha \neq 0$, 则 $\frac{1}{\|\alpha\|}\alpha$ 为单位向量

例: $\alpha = (1, 2, 2)^T$, 单位化得: $\alpha^0 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)^T = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})^T$





在几何空间中，向量 α, β 的内积定义为 $\langle \alpha, \beta \rangle = \|\alpha\| \|\beta\| \cos \varphi$
两向量的夹角 φ 为

$$\varphi = \arccos \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \|\beta\|} \quad (0 \leq \varphi \leq \pi)$$

上述定义能否直接推广到一般的欧氏空间中？

Cauchy-Schwarz不等式
 $|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$



$$\left| \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \|\beta\|} \right| \leq 1$$





定义5.2.3 (非零向量的夹角) 在欧氏空间中, 规定两个**非零向量** α, β 的夹角 φ 为

$$\varphi = \arccos \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \|\beta\|} \quad (0 \leq \varphi \leq \pi)$$

- 若 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0, \langle \alpha, \beta \rangle = 0$, 则 $\phi = \arccos 0 = \frac{\pi}{2}$. 即 $\alpha \perp \beta$
- 若 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$, 则称 α 与 β **正交**(或垂直), 记为 $\alpha \perp \beta$
- 由于 $\langle 0, \beta \rangle = \langle 0\alpha, \beta \rangle = 0\langle \alpha, \beta \rangle = 0$, 故零向量与任何向量正交.
- 当 $\alpha \perp \beta$, 则 $\|\alpha + \beta\|^2 = \langle \alpha + \beta, \alpha + \beta \rangle = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$ **勾股定理**
- m 个向量两两正交, 则 $\|\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m\|^2 = \|\alpha_1\|^2 + \|\alpha_2\|^2 + \cdots + \|\alpha_m\|^2$



定义5.2.4 (距离) $\forall \alpha, \beta \in V$, 称 $\|\alpha - \beta\|$ 为 α 与 β 的距离,
记为 $d(\alpha, \beta)$, 即

$$d(\alpha, \beta) = \|\alpha - \beta\|$$

距离的基本性质:

(1) 对称性 : $d(\alpha, \beta) = d(\beta, \alpha)$

(2) 非负性 : $d(\alpha, \beta) \geq 0$, 且 $d(\alpha, \beta) = 0 \Leftrightarrow \alpha = \beta$

(3) 三角不等式 : $d(\alpha, \beta) \leq d(\alpha, \gamma) + d(\gamma, \beta)$

证: (3) $d(\alpha, \beta) = \|\alpha - \beta\| = \|(\alpha - \gamma) + (\gamma - \beta)\|$

$$\leq \|\alpha - \gamma\| + \|\gamma - \beta\| = d(\alpha, \gamma) + d(\gamma, \beta)$$





第二节：欧氏空间

1. 内积及其基本性质
2. 范数和夹角
3. 标准正交基及其基本性质
4. Gram-Schmidt正交化方法



定义5.2.5（正交向量组与正交单位向量组）

对于欧氏空间 V 的一个向量组，如果其中**不含零向量**，且其中的向量**两两正交**，则称它为一个**正交向量组**。

如果一个正交向量组中的每个向量都是**单位向量**，则称它为一个**正交单位向量组**（或**标准正交向量组**，或**正交规范向量组**）。

例：

在 R^3 中 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是一个正交向量组



定理5.2.2 正交向量组必是线性无关向量组

证: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是一正交向量组, 即

$$\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle = 0 \quad (\forall i, j \in \{1, 2, \dots, m\}, \text{且} i \neq j)$$

$$\text{设 } k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$$

用 α_1 与上式两端作内积:

$$\langle \alpha_1, k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \rangle = \langle \alpha_1, 0 \rangle = 0$$

$$\Rightarrow k_1 \langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle + k_2 \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle + \dots + k_m \langle \alpha_1, \alpha_m \rangle = 0$$

$$\Rightarrow k_1 \langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle = 0 \quad \Rightarrow k_1 \|\alpha_1\|^2 = 0 \Rightarrow k_1 = 0$$

同理有 $k_2 = \dots = k_m = 0$ 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关



定义5.2.6 (正交基与标准正交基) 在 n 维欧氏空间 V 中, 由 n 个向量组成的**正交向量组**称为 V 的**正交基**, 由 n 个向量组成的**正交单位向量组**称为 V 的**标准正交基** (或**规范正交基**) .

定理5.2.3 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的一个**标准正交基**, α, β 是 V 中任意的向量, 设

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n, \quad \beta = y_1 \alpha_1 + \dots + y_n \alpha_n$$

则

$$(1) x_i = \langle \alpha, \alpha_i \rangle (i = 1, \dots, n), \text{ 即 } \alpha = \langle \alpha, \alpha_1 \rangle \alpha_1 + \dots + \langle \alpha, \alpha_n \rangle \alpha_n$$

$$(2) \langle \alpha, \beta \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

$$(3) \|\alpha\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

$$(4) d(\alpha, \beta) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

证: (1) $\langle \alpha, \alpha_i \rangle = \langle x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n, \alpha_i \rangle = x_1 \langle \alpha_1, \alpha_i \rangle + \dots + x_n \langle \alpha_n, \alpha_i \rangle = x_i \langle \alpha_i, \alpha_i \rangle = x_i$

$$(2) \langle \alpha, \beta \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i, \sum_{j=1}^n y_j \alpha_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle \alpha_i, \alpha_j \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i \langle \alpha_i, \alpha_i \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

定理5.2.3说明**任何一个 n 维欧氏空间 V 与 \mathbf{R}^n 同构**





定理5.2.3 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的一个**标准正交基**, α, β 是 V 中任意的向量,

设 $\alpha = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n$, $\beta = y_1\alpha_1 + \dots + y_n\alpha_n$, 则

(1) $x_i = \langle \alpha, \alpha_i \rangle (i = 1, \dots, n)$, 即 $\alpha = \langle \alpha, \alpha_1 \rangle \alpha_1 + \dots + \langle \alpha, \alpha_n \rangle \alpha_n$

(2) $\langle \alpha, \beta \rangle = x_1y_1 + \dots + x_ny_n$

(3) $\|\alpha\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$

(4) $d(\alpha, \beta) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$

例: 在 R^3 中, 求 $\alpha = (1, 2, 3)^T$ 在标准正交基 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^T, \alpha_3 = (0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^T$

下的坐标.

解: 由于 $\langle \alpha_1, \alpha \rangle = 1, \langle \alpha_2, \alpha \rangle = \frac{5}{\sqrt{2}}, \langle \alpha_3, \alpha \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}},$

故 α 在该基下的坐标为 $(1, \frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^T$, 即

$$\alpha = \alpha_1 + \frac{5}{\sqrt{2}}\alpha_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_3$$





第二节：欧氏空间

1. 内积及其基本性质
2. 范数和夹角
3. 标准正交基及其基本性质
4. **Gram-Schmidt正交化方法**



定理5.2.4: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的一个基, 若令

$$\beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2,$$

.....

$$\beta_n = \alpha_n - \frac{\langle \alpha_n, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_n, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 - \dots - \frac{\langle \alpha_n, \beta_{n-1} \rangle}{\langle \beta_{n-1}, \beta_{n-1} \rangle} \beta_{n-1},$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是一组正交基。

若再令 $e_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|}, i = 1, 2, \dots, n$

就得到了 V 的标准正交基 e_1, e_2, \dots, e_n .

Gram-Schmidt
(格拉姆-施密特)
正交化方法

注: 该方法也适应于把欧式空间任一个线性无关的向量组变为正交单位向量组.



证：数学归纳法

当 $n = 2$ 时,

$$\begin{aligned}\langle \beta_1, \beta_2 \rangle &= \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \langle \beta_1, \beta_1 \rangle \\ &= \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle - \langle \alpha_2, \alpha_1 \rangle = 0,\end{aligned}$$

假设 $n = m$ 时, β_1, \dots, β_m 两两正交, 看 $n = m + 1$, 令 $l = 1, \dots, m$,

$$\begin{aligned}\langle \beta_{m+1}, \beta_l \rangle &= \langle \alpha_{m+1} - \frac{\langle \alpha_{m+1}, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_{m+1}, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 - \dots - \frac{\langle \alpha_{m+1}, \beta_m \rangle}{\langle \beta_m, \beta_m \rangle} \beta_m, \beta_l \rangle \\ &= \langle \alpha_{m+1}, \beta_l \rangle - \frac{\langle \alpha_{m+1}, \beta_l \rangle}{\langle \beta_l, \beta_l \rangle} \langle \beta_l, \beta_l \rangle = 0,\end{aligned}$$

则 $\beta_1, \dots, \beta_{m+1}$ 两两正交。综上, β_1, \dots, β_n 是正交向量组。

又由于正交向量组线性无关, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是一组正交基。





例：用Gram-Schmidt正交化方法把向量组 $\alpha_1 = [1, 0, 1, 0]^T$,
 $\alpha_2 = [0, 1, 2, 2]^T$, $\alpha_3 = [-1, 0, 0, 3]^T$ 化成正交单位向量组.

解：可以验证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

先正交化

$$\text{令 } \beta_1 = \alpha_1 = [1, 0, 1, 0]^T, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = [-1, 1, 1, 2]^T,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 = \left[\frac{1}{2}, -1, -\frac{1}{2}, 1 \right]^T$$

再单位化

$$e_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right]^T, e_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \left[-\frac{1}{\sqrt{7}}, \frac{1}{\sqrt{7}}, \frac{1}{\sqrt{7}}, \frac{2}{\sqrt{7}} \right]^T$$

$$e_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \left[\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{2}{\sqrt{10}}, -\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{2}{\sqrt{10}} \right]^T \text{ 为所求正交单位向量组}$$