



Consejos para el paciente con reflujo ácido

Si el ESFINTER ESOFÁGICO INFERIOR presenta en forma persistente un tono bajo (hipotonía), puede conducir a Enfermedad por Reflujo Gastro-Esofágico, una condición en la que el reflujo ácido daña el revestimiento del esófago, pudiendo llegar hasta la rinofaringe, dañando laringe e incluso puede producir problemas en la raíz dental (periodonto).

¿Cuáles son los síntomas del reflujo gastroesofágico?

1.- ARDOR O QUEMAZÓN EVIDENTE. («pirosis» en términos médicos), que asciende desde el estómago hacia la garganta, es el principal síntoma del RGE. Es posible que se asocie al paso de alimentos ácidos o amargos desde el estómago a la boca. lo que causa síntomas como acidez, regurgitación y dolor en el pecho (retroesternal).

2.- REGURGITACIÓN FARINGOLARÍNGEA. En algunos casos, existe ausencia de estos síntomas (Al pasar por detrás de la lengua) dañando la mucosa faríngea y el repliegue inter-aritenóideo, produciendo síntomas predominantes son respiratorios: como afonía o carraspera (por irritación de la laringe por el ácido refluído) o incluso asma o dificultad respiratoria (por aspiración del ácido a la vía respiratoria).

Generalmente empeora tras las comidas, especialmente con los alimentos que favorecen la relajación del esfínter o con excesos dietéticos. En muchos casos también empeora durante el descanso nocturno o cuando se flexiona el tronco.

Tratamiento del reflujo ácido

La regulación del tono del EEI es un parámetro importante para mantener la salud gastrointestinal y prevenir el reflujo ácido. Su regulación involucra tres pilares fundamentales que se potencian entre sí:

1. Cambio de hábitos
2. Régimen alimentario
3. Medicamentos



1.- CAMBIO DE HÁBITOS

1. Perder peso en caso de obesidad.
2. Eliminar o reducir el consumo de tabaco y alcohol.
3. No usar prendas ajustadas.
4. Evite agacharse o hacer ejercicio inmediatamente después de comer.
5. Reducir el estrés.
6. Elevar la cabecera de la cama unos 10 cm. Es importante NO colocar almohadas, que sólo consiguen flexionar el cuello. Se trata de conseguir una inclinación de todo el tronco, por eso se aconsejan camas articuladas o colocar tacos de madera en las patas delanteras de la cama.
7. Evitar acostarse antes de haber pasado 2 o 3 horas de la ingesta.

2.- CAMBIO DE RÉGIMEN

- Evitar las comidas y las bebidas que favorecen la relajación del EEI, incluyendo grasas (especialmente fritos), pimienta y especias, chocolate, alcohol, café, frutos cítricos, tomate y productos mentolados.

Alimentos que disminuyen el tono del EEI y tienen un efecto irritante sobre la mucosa gástrica:

Grasas	Fritos	Salsas	Café Té	Chocolate
Menta	Bebidas cola	Alcohol	Bebidas con gas	Picantes
Frutos secos	Cebolla	Zumos	Ácidos	Cítricos
Ajo	Tabaco	Tomate	Sazones	

3.- Medicamentos

Estos serán indicados por su médico en la medida que estos sean necesarios