



RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE PLACA DENTOBACTERIANA

ALIMENTOS DESACONSEJADOS U OCASIONALES PARA PREVENIR LA APARICIÓN PLACA BACTERIANA

Se recomienda llevar una dieta equilibrada, modificando las fuentes y cantidades de carbohidratos fermentables. Paralelamente a la dieta llevar a cabo prácticas correctas en la higiene bucal, y con un cepillo adecuado.

Azúcar (blanca, rubia), chicles con azúcar, golosinas, caramelos, dulces, pasteles, patatas fritas y otros snacks de textura similar, galletería, bollería, cereales de desayuno azucarados o con chocolate, barritas de cereales/energéticas, frutas secas, chocolates, helados, miel, turrones, zumos tanto naturales como comerciales, néctares, mermeladas, frutas en almíbar, batidos, yogures azucarados o del tipo yogures cremosos con dulce de leche o chocolate, leche condensada, crema de cacahuete, mousse, flanes, natas, licores, bebidas isotónicas azucaradas, refrescos, cerveza, vino (dulce sobre todo) y bebidas alcohólicas en general.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE PLACA DENTOBACTERIANA

1.- Todas las frutas (frescas, deshidratadas y en enlatadas) son cariogénicas, aunque las frutas con alto contenido acuoso lo son menos (sandía, melón, etc.)

2.- Si ha de ingerir alguno de los alimentos desaconsejados, incluso las frutas, es mejor tomarlas en las comidas y no fuera de ellas. Y, sobre todo, al principio de estas y no al final. Consumir alimentos anticariogénicos o cariostáticos para los tentempiés.

3.- Masticar chicle sin azúcar con xilitol a ser posible tras comer o beber productos cariogénicos por la secreción salivar que estos promueven. Este proceso favorece la neutralización de la acidez por lo que queda minimizado el riesgo de caries.

4.- La mezcla de lácteos con alimentos cariogénicos brinda cierta protección contra estos últimos. Los quesos (en especial el queso tipo Cheddar) tienen propiedades anticariogénicas: estimulan la aparición de saliva alcalina que acelera la eliminación de alimentos adheridos a la superficie de los dientes. Además, debido a su contenido en calcio y fósforo, aminoran la acidificación en la boca.

5.- Consumir queso 10 minutos antes o después de la comida rica en carbohidratos fermentables puede aminorar el potencial cariogénico del carbohidrato. Los productos lácteos a pesar de ser ricos en lactosa (carbohidrato fermentable) son ricos en calcio, lo que unido a su naturaleza alcalina puede ejercer un efecto positivo, en la reducción del potencial cariogénico del alimento.

6.- Almendras, margarinas, semillas, etcétera tampoco son cariogénicos

7.- Evitar los tentempiés frecuentes: reducir el número de ingestas que se realizan en un día. 8.- La frecuencia con la que se come es igual al número de oportunidades para la producción de ácidos en la cavidad bucal. Ídem con el picoteo fuera de las ingestas

principales. Por lo tanto, una dieta con menos ingestas reduce la capacidad cariogénica mucho más que las dietas que incluyen de 5 a 6 comidas.

9.- A partir de los 5 a 15 minutos después de comer un alimento rico en carbohidratos fermentable se produce un aumento de la acidez. Esta acidez bucal puede durar hasta 20-30 minutos.

10.- El consumo de galletas u otros alimentos cariogénicos en una sola ingesta es menos cariogénicos que consumir esas mismas galletas varias veces durante todo el día.

11.- Evitar tomar bebidas con gas a sorbos durante un tiempo prolongado.

12.- Evitar mantener caramelos, pastillas mentoladas azucaradas para el aliento o caramelos duros en la boca durante mucho tiempo.

13.- Los fármacos masticables o líquidos y los complementos vitamínicos, como la vitamina C masticable o el jarabe antitusígeno, suelen contener azúcares y potenciar el riesgo de caries.

La relación causal entre la sacarosa y la caries dental es bien conocida. Los alimentos enriquecidos con sacarosa, fructosa u otros azúcares también pueden ser cariogénicos debido a estos azúcares añadidos y por ello deben ser evitados (ejemplo: jamón serrano en rodajas envasado al vacío).