


§5. Вариационные задачи с подвижными границами

Рассмотрим гладкую кривую, по которой "бегает" один из концов исследуемой кривой (другой конец закреплен)



Исследуем следующий функционал:

$$(1) J[y] = \int_a^{x_2} F(x, y, y') dx \rightarrow \text{extr?}$$

Функции $F(x, y, y')$ и $\phi(x_2)$ заданы.

(2):

$$\begin{cases} y(a) = A \\ y(x_2) = \phi(x_2) \\ y \in C^1([a; b]) \\ x_2 \in [a; b] \end{cases}$$

Т1 (Необходимое условие экстремума функционала с подвижной правой границей)

Пусть выполнены следующие условия:

1. $y(x) \in C^2([a; b])$
2. $y(x)$ реализует слабый или сильный экстремум функционала (1) при условии (2);
3. $F(x, y, p)$ имеет непрерывные частные производные до второго порядка включительно;
4. $\phi(x) \in C^1([a; b])$.

Тогда $y(x)$ удовлетворяет уравнению Эйлера $F'_y - \frac{d}{dx} F'_p = 0$ с дополнительными условиями (2), а на правом конце выполняется условие трансверсальности (УТ).

$$(F - (y' - \phi'(x))F'_p) |_{x=x_2} = 0$$


Δ :

(б/д)

□

Замечание: УТ накладывает ограничения на угол пересечения экстремали и кривой $y = \phi(x)$.

Аналогично можно рассмотреть задачу с фиксированным правым концом и с "бегающим" левым:



Здесь получаем:

$$(3) J[y] = \int_{x_1}^b F(x, y, y') dx \rightarrow \text{extr?}$$

(4):

$$\begin{cases} y(x_1) = \phi(x_1) \\ y(b) = B \\ y \in C^1([a; b]) \\ x_1 \in [a; b] \end{cases}$$

T2 (Необходимое условие экстремума функционала с подвижной левой границей)

Пусть выполнены условия:

1. $y(x) \in C^2([a; b])$;
2. $y(x)$ реализует слабый или сильный экстремум функционала (3) при условиях (4);
3. $F(x, y, p)$ имеет непрерывные частные производные до второго порядка включительно;
4. $\psi(x) \in C^1([a; b])$.

Тогда $y(x)$ удовлетворяет уравнению Эйлера $F'_y - \frac{d}{dx} F'_p = 0$ с дополнительными условиями (4), а на левом конце выполняется условие трансверсальности:


$$(F - (y' - \psi'(x))F'_p) |_{x=x_1} = 0$$

Δ :

(б/д)

□

Также можем рассмотреть задачу о функционале с двумя подвижными концами:



$$(5) J[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y') dx \rightarrow \text{extr?}$$

(6):

$$\begin{cases} y(x_1) = \psi(x_1) \\ y(x_2) = \phi(x_2) \\ y \in C^1([a; b]) \\ x_1, x_2 \in [a; b] \end{cases}$$

T3 (Необходимое условие экстремума функционала с двумя подвижными границами)

Пусть выполнены следующие условия:

1. $y(x) \in C^2([a; b])$;
2. $y(x)$ реализует слабый или сильный экстремум функционала (5) при условиях (6);
3. $F(x, y, p)$ имеет непрерывные частные производные до второго порядка включительно;
4. $\psi(x), \phi(x) \in C^1([a; b])$;

Тогда: $y(x)$ удовлетворяет уравнению Эйлера: $F'_y - \frac{d}{dx} F'_p = 0$ с дополнительными условиями (2), а на левом конце выполняется условие трансверсальности:

$$(F - (y; -\phi'(x))F'_p) |_{x=x_2} = 0$$


$$(F - (y; -\psi'(x))F'_p) |_{x=x_1} = 0$$

Δ:

(б/д)

□

Пример: (Найти $\min \rho(y = x^2, y = x - 5)$)



$$\rho = J[y] = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$y(x_1) = x_1^2$$

$$y(x_2) = x_2 - 5$$

из §3. знаем, что для $F = F(p)$ экстремальями будут являться прямые линии:

$$y = C_1 x + C_2 \implies y' = C_1$$

Находим C_1, C_2 из граничных условий и условий трансверсальности:

ГУ:

$$\begin{cases} C_1 x_1 + C_2 = x_1^2 \\ C_1 x_2 + C_2 = x_2 - 5 \end{cases}$$

УТ:

$$\begin{cases} \sqrt{1 + C_1^2} - (C_1 - 2x_1) \cdot \frac{C_1}{\sqrt{1 + C_1^2}} = 0 \\ \sqrt{1 + C_1^2} - (C_1 - 1) \cdot \frac{C_1}{\sqrt{1 + C_1^2}} = 0 \end{cases}$$

Домножив оба равенства на $\sqrt{1 + C_1^2}$, получим:

$$\begin{cases} 1 + C_1^2 - C_1^2 + 2x_1 C_1 = 0 \\ 1 + C_1^2 - C_1^2 + C_1 = 0 \end{cases}$$

Откуда получаем:

$$\begin{cases} C_1 = -1 \\ x_1 = 1/2 \end{cases}$$

Теперь воспользуемся граничными условиями:

$$\begin{cases} -1/2 + C_2 = 1/4 \implies C_2 = 3/4, \\ -x_2 + C_2 = x_2 - 5 \implies 2x_2 = C_2 + 5 \implies x_2 = 23/8. \end{cases}$$

Получили следующую экстремаль:

$$y = 3/4 - x \text{ (по физическому смыслу реализует минимум)}$$

$$\rho_{\min} = J\left[\frac{3}{4} - x\right] = \int_{1/2}^{23/8} \sqrt{1 + (-1)^2} dx = \sqrt{2}\left(\frac{23}{8} - \frac{1}{2}\right) = \frac{19\sqrt{2}}{8}$$

§6. Условный экстремум.

Рассмотрим функционал от двух кривых:

$$(1) J[y, z] = \int_a^b F(x, y, z, y', z') dx \rightarrow \text{extr?}$$

(2): Считаем, что $y(x), z(x) \in C^1([a; b])$, а функция $F(x, y, z, p, q)$ задана.

$$\begin{cases} y(a) = A_1 \\ y(b) = B_1 \\ z(a) = A_2 \\ z(b) = B_2 \end{cases}$$

(+) Дополнительное условие:

(A) либо $\Phi(x, y, z, y', z') = 0$ (неголономная связь)

(B) либо $\Phi(x, y, z) = 0$ (голономная связь)

Замечание: Голономная связь накладывает ограничения на геометрические параметры системы, неголономная же также ограничивает и кинематические свойства системы (x, y, z - координаты, y', z' - скорости).

Т1 (Необходимые условия экстремума функционала с неголономной связью)

Пусть выполнены следующие условия:

1. Функции $y(x), z(x) \in C^2([a; b])$;
2. Пара $(y(x), z(x))$ реализует слабый или сильный экстремум функционала (1) при условии (2) и со связью (A);
3. $F(x, y, z, p, q), \Phi(x, y, z, y', z')$ имеет непрерывные частные производные до второго порядка включительно;
4. $\Phi'_p \neq 0 \vee \Phi'_q \neq 0$.

Тогда \exists непрерывно-дифференцируемая функция $\lambda(x)$: пара $(y(x), z(x))$ удовлетворяет системе уравнений Эйлера для функционала:

$\tilde{J}[y, z] = \int_a^b (F(x, y, z, y', z') + \lambda(x) \cdot \Phi(x, y, z, y', z')) dx$, то есть:

$$\begin{cases} F'_y + \lambda \Phi'_y - \frac{d}{dx}(F'_p + \lambda \Phi'_p) = 0 \\ F'_z + \lambda \Phi'_z - \frac{d}{dx}(F'_q + \lambda \Phi'_q) = 0 \end{cases}$$

с дополнительными условиями:

$$\begin{cases} y(a) = A_1 \\ y(b) = B_1 \\ z(a) = A_2 \\ z(b) = B_2 \\ \Phi(x, y, z, y', z') = 0 \end{cases}$$

Δ :

(б/д)

□

Замечание: Все рассматриваемые условия - необходимые, достаточные условия вытекают либо из физического смысла, либо из геометрического смысла задачи.

В случае голономной связи, во-первых $\Phi'_p \equiv 0$ и $\Phi'_q \equiv 0$ (не выполнены условия прошлой I); во-вторых, краевые условия является зависимым, так как:

$$\Phi(a, A_1, A_2) = 0, \Phi(b, B_1, B_2) = 0$$

В связи с этим имеем следующую теорему:

I2 (Необходимые условия экстремума функционала с голономной связью)

Пусть выполнены следующие условия:

1. $y(x), z(x) \in C^2([a; b]);$
2. Пара $(y(x), z(x))$ реализует слабый или сильный экстремум функционала (1) при условии (2) и со связью (B);
3. $F(x, y, z, p, q)$ непрерывна с частными производными до второго порядка включительно;
4. $\Phi(x, y, z)$ непрерывна с частными производными первого порядка;
5. $\Phi'_y \neq 0 \vee \Phi'_z \neq 0$.

Тогда \exists непрерывная функция $\lambda(x)$: пара $(y(x), z(x))$ удовлетворяет системе уравнений Эйлера для функционала:

$$\hat{J}[y, z] = \int_a^b (F(x, y, z, y', z') + \lambda(x)\Phi(x, y, z)) dx, \text{ то есть:}$$

$$\begin{cases} F'_y + \lambda\Phi'_y - \frac{d}{dx}F'_p = 0 \\ F'_z + \lambda\Phi'_z - \frac{d}{dx}F'_q = 0 \end{cases}$$

с дополнительными условиями:

$$\begin{cases} y(a) = A_1 \\ y(b) = B_1 \\ \Phi(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

причем автоматически:

$$\begin{cases} z(a) = A_2 \\ z(b) = B_2, \end{cases}$$

где A_2, B_2 удовлетворяют условиям: $\Phi(a, A_1, A_2) = 0, \Phi(b, B_1, B_2) = 0$

Δ :


(б/д)

□

Пример: (Нахождение геодезических линий)

$$\Phi(x, y, z) = 0$$

Тогда нужно найти:



$$\min J[y, z] = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2 + (z')^2} dx$$

$$y(a) = A_1, y(b) = B_1$$

$$z(a) = A_2, z(b) = B_2$$

$$\Phi(x, z, z') = 0$$

$$\Phi(a, A_1, A_2) = 0$$

$$\Phi(b, B_1, B_2) = 0$$

При этом, мы считаем, что линия минимальной длины может быть параметризована:

$$x \in [a; b]$$

$$\begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

Пример: (Изопараметрическая задача)

$$J_1[y, z] = \int_a^b F(x, y, y') dx \rightarrow \text{extr?}$$

$$y(a) = A_1, y(b) = B_1$$

С дополнительными условиями:

$$J_2[y] = \int_a^b G(x, y, y') dx = l = \text{const}$$

$$J_2 = \int_a^b \sqrt{q + (y')^2} dx = l$$

$$\text{Рассмотрим } z(x) = \int_a^x G(x, y, y') dx$$

$$\text{Тогда: } z(a) = 0, z(b) = l, z'(x) = G(x, y, y')$$

Рассмотрим задачу поиска экстремума:

$$J[y, z] = \int_a^b F(x, y, y') dx$$

$$y(a) = A_1, y(b) = B_1, z(a) = 0, z(b) = l$$

Из того, что связь неголономная:


$$z'(x) - G(x, y, y') = 0$$

Применим I о неголономной связи:

$$\tilde{J}[y, z] = \int_a^b (F(x, y, y') + \lambda(x)(z'(x) - G(x, y, y'))) dx \Rightarrow$$

$$\begin{cases} F'_y + \frac{d}{dx}(\lambda G'_p) = 0 \\ -\frac{d}{dx}\lambda(x) = 0 \Rightarrow \lambda = \text{const} \end{cases}$$

Хорошим примером изопериметрической задачи является задача Дидоны:



$$\max J[y] = \int_{-a}^a y \, dx$$

$$y(a) = y(-a) = A$$

$$J_2[y] = \int_{-a}^a \sqrt{q + (y')^2} \, dx = 2l > 2a$$

$$z(x) = \int_{-a}^x \sqrt{1 + (y')^2} \, dx \implies z(-a) = 0, z(a) = 2l$$

$$z'(x) = \sqrt{1 + (y')^2} \implies z' - \sqrt{1 + (y')^2} = 0 \text{ - неголономная связь}$$

To be continued...