

§2. Множества на комплексной плоскости.

\mathbb{C} как множество упорядоченных пар совпадает с \mathbb{R}^2

Точки $M_1(x_1, y_1); M_2(x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$

$$\rho(M_1, M_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$z_1 = x_1 + y_1 i, z_2 = x_2 + y_2 i \in \mathbb{C}$$

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \text{dist}(z_1, z_2)$$

$U_\delta(z_0) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < \delta\}$ - дельта-окрестность

$\delta > 0, z_0 \in \mathbb{C}$

$\dot{U}_\delta(z_0) = U_\delta(z_0) \setminus \{z_0\} = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z - z_0| < \delta\}$ - проколота дельта-окрестность

Опр.1 Точка $z_0 \in E \subset \mathbb{C}$ называется внутренней точкой множества E , если

$$\exists \delta > 0 \ U_\delta(z_0) \subset E$$

Множество E называется открытым, если все его точки - внутренние.

Окрестностью точки z_0 $U(z_0)$ называется любое открытое множество, содержащее точку z_0

Окрестностью множества $E \subset \mathbb{C}$ называется любое открытое множество, содержащее E .

Лемма 1 (О числе Лебега). Пусть $m \in \mathbb{N}$, $K \subset \mathbb{R}^m$, K - ограничено и замкнутое в \mathbb{R}^m :

$K \subset \bigcup V_j$, где $j \in J$, V_j - открытое множество \mathbb{R}^m , J - множество индексов

Тогда $\exists d > 0: \forall Q \subset K \ (diam Q < d \implies \exists j_0 \in J \ Q \subset V_{j_0})$

d - число Лебега.

Δ :

Предположим противное $\forall n \in \mathbb{N} \exists Q_n \subset K \ diam Q_n < \frac{1}{n}$, а Q_n не содержится целиком ни в одном V_j ($Q_n \neq \emptyset$)

Рассмотрим точку $M_n \in Q_n \rightarrow \{M_n\} \subset K$ - ограниченное и замкнутое.

$$\implies \{M_n\}_{n \in \mathbb{N}} - \text{огр.} \implies \exists \{M_{n_k}\} \exists M_0 \in \mathbb{R}^m \ M_{n_k} \rightarrow M_0 \in K, k \rightarrow \infty$$

$$\implies \exists j_0 \in J (M_0 \in V_{j_0} \implies \exists \delta > 0 \ U_\delta(M_0) \subset V_{j_0})$$

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall k > N \ (diam Q_{n_k} < \frac{\delta}{2} \wedge \rho(M_0, M_{n_k}) < \frac{\delta}{2})$$

Рассмотрим $\forall M \in Q_{n_k}$ справедливо

$$\rho(M, M_0) \leq \rho(M, M_{n_k}) + \rho(M_{n_k}, M_0) < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta$$

Т.е. $Q_{n_k} \subset U_\delta(M_0) \subset V_{j_0}$

Противоречие.

□

Лемма 2 (Гейне-Бореля)

Пусть $K \subset \mathbb{R}^m$, K - ограниченное, замкнутое множество в \mathbb{R}^m и $K \subset \bigcup V_j$, где V_j -

открытое множество в \mathbb{R}^m

Тогда $\exists \{j_1, \dots, j_n\} \subset J \quad K \subset \bigcup_{k=1}^n V_{j_k}$

Δ :

Пусть $d > 0$ из Леммы 1. K - ограниченное множество.

Π - куб в \mathbb{R}^m со сторонами, параллельными осям координат и равными a .

$\frac{a}{N} \leq \frac{d}{2\sqrt{m}}, n = N^m$ частичных кубиков.

$\bigcup_{k=1}^n \Pi_k = \Pi, \text{diam} \Pi_k \leq \frac{d}{2}; K \subset \Pi, Q_k = K \cap \Pi_k \implies K = \bigcup_{k=1}^n Q_k$

$\forall k = 1, \dots, n \quad (\text{diam} Q_k \leq \text{diam} \Pi_k \leq \frac{d}{2} < d)$

$\forall k = 1, \dots, n \quad \exists V_{j_k} \supset Q_k \implies K = \bigcup_{k=1}^n Q_k \subset \bigcup_{k=1}^n V_{j_k}$

□

Опр.2

Пусть $K \subset \mathbb{R}^m, \{V_j\}_{j \in J}$ - система открытых множеств в \mathbb{R}^m называется (открытым) покрытием множества K , если $K \subset \bigcup V_j$

Компактом K в \mathbb{R}^m называется множество, из любого покрытия которого открытыми множествами V_j можно выбрать (извлечь) конечное подпокрытие, т.е. $\exists \{j_1, \dots, j_n\} \subset J \quad K \subset \bigcup_{k=1}^n V_{j_k}$

Т1 (Критерий компактности в \mathbb{R}^m)

Пусть $K \subset \mathbb{R}^m, m \in \mathbb{N}$ (K - компакт в \mathbb{R}^m) \iff (K - ограничено и замкнуто в \mathbb{R}^m)

Δ :

\Leftarrow смотри Лемму Гейне-Бореля

$\implies \forall M \in K \quad U_\delta(M), \text{ где } \delta = 1, U_1(M)$

$K \subset \bigcup_{M \in K} U_1(M) \implies \exists \{M_1, \dots, M_n\} \subset K$:

$K \subset \bigcup_{k=1}^n U_1(M_k)$ - ограниченное множество, как объединение конечного числа ограниченных множеств

Докажем замкнутость $K = \bar{K} \iff (\mathbb{R}^m \setminus K - \text{открыто})$

$\forall M_0 \in (\mathbb{R}^m \setminus K) \quad \exists U(M_0) \subset (\mathbb{R}^m \setminus K) \quad (U(M_0) \cap K \neq \emptyset)$

$\forall M \in K$ рассмотрим $V_M = \{P \in \mathbb{R}^m \mid \rho(P, M) < \frac{1}{2}\rho(M, M_0)\}$ - открытое множество

$K \subset \bigcup_{M \in K} V_M \implies \exists M_1, \dots, M_n \in K: K \subset \bigcup_{k=1}^n V_{M_k} = W$

точка $M_0 \in \overline{V_{M_k}} \implies (\mathbb{R}^m \setminus W) - \text{открытое, как дополнение к замкнутому}$

$\implies \exists U_\delta(M_0) \subset (\mathbb{R}^m \setminus W) \quad U_\delta(M_0) \cap K \neq \emptyset$

□

§3. Последовательности и ряды комплексных чисел. Расширенная комплексная плоскость.

$\forall n \in \mathbb{N} \rightarrow z_n \in \mathbb{C}, \{z_n\}_{n=1}^\infty, \{z_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{z_n\}$

$z_n = x_n + iy_n, \{x_n\}, \{y_n\}$

Опр.1

Пусть $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $z_0 \in \mathbb{C}$. Говорят, что $\{z_n\}$ стремится к z_0 при $n \rightarrow \infty$, если

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \implies |z_n - z_0| < \epsilon)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0; z_n \rightarrow z_0, n \rightarrow \infty$$

$$M_0(x_0, y_0), M_n(x_n, y_n), \rho(M_n, M_0) = |z_n - z_0|$$

$$(z_n \rightarrow z_0, n \rightarrow \infty) \iff (\rho(M_n, M_0) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty) \iff (x_n \rightarrow x_0 \wedge y_n \rightarrow y_0, n \rightarrow \infty)$$

$$\max(|x_n - x_0|, |y_n - y_0|) \leq |z_n - z_0| \leq |x_n - x_0| + |y_n - y_0|$$

Арифметические свойства.

$$z_n \rightarrow z_0, w_n \rightarrow w_0, n \rightarrow \infty$$

$$1. \exists \lim_{n \rightarrow \infty} (z_n + w_n) = z_0 + w_0; \forall \alpha \in \mathbb{C} \exists \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha \cdot z_n)$$

$$2. \exists \lim_{n \rightarrow \infty} (z_n \cdot w_n) = z_0 \cdot w_0$$

$$3. \text{ Если } \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} w_n \neq 0, \text{ то } \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{w_n} = \frac{z_0}{w_0}$$

Опр.2

$\{z_n\}$ называется ограниченной, если $\exists c > 0 \forall n \in \mathbb{N} |z_n| \leq c$

Т1 (Больцано-Вейерштрасса)

Если последовательность комплексных чисел $\{z_n\}$ ограничена, то из нее можно извлечь сходящуюся подпоследовательность.

Опр.3

$\{z_n\} \subset \mathbb{C}$ называется фундаментальной, если $\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, p \in \mathbb{N}$

$$(n \geq N \implies |z_{n+p} - z_n| < \epsilon)$$